

2023 年临床执业医师历年考试真题（二）

1、有关糖尿病的诊断对的是 C

A、空腹血糖升高是最重要的诊断指标

B、空腹血糖正常可排除糖尿病

C、两次 OGTT 仍不能诊断时应作第 3 次

D、糖耐量减低是糖尿病的一种亚型

E、尿糖阴性可排除糖尿病

2、治疗心室停止的首选药物是 E

A、胺碘酮

B、利多卡因

C、多巴酚丁胺

D、肌苷

E、肾上腺素

3、协助诊断肾挫伤，首要的检查是 D

A、血肌酐

B、尿常规

C、静脉尿路造影

D、腹部 CT 平扫

E、血细胞比容

4、对肱骨外上髁炎有诊断意义的检查是 **A**

A、Mills 征

B、Thomas 征

C、Spurling 试验

D、Dugas 征

E、“4”字试验

5、肱骨髁上骨折后出现手指不能内收、外展，夹纸试验阳性，最也许损伤的神经是 **B**

A、腋神经

B、正中神经

C、桡神经

D、肌皮神经

E、尺神经

6、骨折愈合过程中，属于血肿机化演进期体现的是 **B**

A、多出现软骨内化骨

B、出现无菌性炎症反应

C、可形成环形骨痂

D、可形成内骨痂、外骨痂

E、出现膜内化骨

7、诊断支气管扩张首选的检查是 **B**

A、胸部超声

B、胸部高辨别 CT

C、支气管造影

D、胸部 X 线片

E、胸部磁共振

8、胫骨中下段多段闭合性骨折功能复位后发生骨不愈合，最也许得原因是 **A**

A、骨折端血液供应差

B、未用增进骨折愈合药物

C、未到达解剖复位

D、功能锻炼不够

E、骨折端软组织嵌入

9、恶性高血压的病理特性是 **E**

A、肾毛细血管纤维性坏死

B、大、中动脉粥样硬化

C、微血管炎

D、肾脏纤维化

E、肾小动脉纤维样坏死

10、老年人无痛性肉眼血尿，首先应考虑 A

A、泌尿系肿瘤

B、泌尿系畸形

C、泌尿系感染

D、泌尿系结石

E、泌尿系结核

11、目前用于判断慢性阻塞性肺疾病严重程度的肺功能指标是 A

A、FEV1 占预测比例

B、FVC 占估计值比例

C、RV/TLC(残总比)

D、MVV 占预测值比例

E、FEV1/FVC(一秒率)

12、鹿角形结石引起泌尿道的病理生理变化，最严重的后果是 C

- A、尿路梗阻
- B、尿路感染
- C、尿路上皮恶性变
- D、肾积水
- E、尿毒症

13、骨关节炎镇痛治疗首选 E

- A、口服阿司匹林
- B、口服氨基葡萄糖
- C、关节内注射透明质酸钠
- D、关节内注射激素
- E、口服对乙酰氨基酚

14、右心衰竭时水肿形成的机制是 C

- A、血浆胶体渗透压减少
- B、小动脉壁通透性增高
- C、毛细血管内静水压升高
- D、粘多糖在组织间隙内沉积
- E、淋巴液回流受阻

15、中央型肺癌伴纵膈肺门多发淋巴结肿大最常见于 **A**

A、鳞癌

B、大细胞癌

C、小细胞癌

D、腺癌

E、类癌

16、急性呼吸窘迫综合症所致顽固性低氧血症的最重要机制是 **A**

A、限制性通气功能障碍

B、**功能障碍

C、通气/血流比例失调

D、分流率增长

E、呼吸功增长

17、病毒性心肌病确诊有赖于 **C**

A、血肠道病毒核酸阳性

B、血清柯萨奇 B 组病毒 IgG1:640

C、心肌组织内病毒的检出 D、血 C 反应蛋白水平增高

E、血清柯萨奇 B 组病毒 IgM1:320

18、下列有关急进性肾小球肾炎的描述，对的是 **A**

- A、II型多伴循环免疫复合物阳性
- B、III型多伴血清抗肾小球基底膜抗体阳性
- C、病理变化特性为系膜细胞重度增生
- D、光镜下变化时分型的重要根据
- E、I型多伴血清抗中性粒细胞包浆抗体阳性

19、可选择放射性核素治疗的疾病是 **C**

- A、肾上腺皮质功能减退症
- B、原发性甲状腺旁腺功能亢进症
- C、原发性甲状腺功能亢进症
- D、原发性甲状腺功能减退症
- E、特发性中枢性尿崩症

20、有关气道高反应性(AHR)的描述对的是 **A**

- A、AHR 是哮喘发病的重要神经机制
- B、气道炎症是导致 AHR 的重要机制
- C、AHR 检测阳性者可诊断支气管哮喘
- D、肺泡巨噬细胞激活后可减少 AHR
- E、AHR 不受遗传因素的影响

21、急性肺水肿膜特异性的临床体现为 C

A、肺动脉瓣区第二心音亢进

B、心尖区收缩期杂音

C、咳大量粉红色泡沫痰

D、左肺底湿罗音

E、气促、发绀

22、Allen 试验重要用于检查 E

A、手部肌腱损伤状况

B、手指末端血运状况

C、神经损伤后的恢复状况

D、手部神经损伤程度

E、桡尺动脉的畅通和互相吻合状况

23、左心衰患者合并右心衰竭后，也许减轻左心衰竭时的临床体现的是 B

A、恶心

B、喘憋

C、肝肿大

D、颈静脉充盈

E、下肢水肿

24、支气管哮喘患者发作时禁用的药物是 **A**

- A、吗啡
- B、氨茶碱
- C、泼尼松
- D、肾上腺素
- E、沙丁胺醇

25、前列腺癌筛查最常用的措施是 **E**

- A、盆腔 CT
- B、盆腔 MRI
- C、前列腺特异性抗原检测
- D、前列腺穿刺
- E、直肠指检

26、仅对细胞外碱性环境的结核菌有杀菌作用的药物是 **E**

- A、乙胺丁醇
- B、利福平
- C、异烟肼
- D、吡嗪酰胺
- E、链霉素

27、前列腺增生患者最重要的症状是 B

A、尿潴留

B、排尿困难

C、尿失禁

D、无痛性肉眼血尿

E、尿频、尿急、尿痛

28、前列腺癌(T₁、T₂期)的最佳治疗措施是 C1b2

A、应用促黄体释放激素类似物(LHRH-A)缓释剂

B、睾丸切除

C、根治性前列腺切除

D、抗雄激素治疗

E、化疗

29、常用的心理评估措施不包括： C

A 观测法

B 调查法

C 试验法

D 会谈法

E 测验法

30、在环境污染物质，一次污染物是指：**B**

A 从污染物排入环境后，理化性质发生了变化的污染物

B 从污染物直接排入环境后，理化性质未发生变化的污染物

C 从污染物排入环境后，其毒性增大的污染物

D 多种污染源同步排出的同一类污染物

E 多种环境介质中都存在同一类污染物

31、体内脂肪大量动员时，肝内乙酰 CoA 重要生成的物质是：**B**

A、葡萄糖

B、酮体

C、胆固醇

D、脂肪酸

E、二氧化碳和水

32、佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应，其免疫病理基础也许是：**D**

A、I 型超敏反应

B、II 型超敏反应

C、III 型超敏反应

D、IV 型超敏反应

E、rthus 反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638056077040006047>