

临床护士应知应会及三基理论知识复习题（含参考答案）

1、申报的护理新业务、新技术、新用具项目应根据实际需要具有（ ）

- A、先进性
- B、科学性
- C、有效性
- D、安全性
- E、以上均是

答案：E

2、穿无菌手术衣,戴无菌手套后,无菌区的范围包括（ ）

- A、.整个胸、腹、背部和双上肢
- B、腰部以上的前胸、后背及双上肢
- C、肩以下、腰以上及双上肢
- D、肩以下、腹以上及双上肢
- E、头以下、腰以上及双上肢

答案：C

3、血源性病原体职业暴露的防护措施,不正确的是（ ）

- A、洗手
- B、安全注射
- C、做好标准预防
- D、直接解触患者血液体液、护手上有伤口时需戴手套、口罩、护目镜及穿隔离衣等
- E、正确处理医疗废物

答案：D

4、黄某,女,26岁。低热、腹泻3个月,糊样大便,无脓血。近1周阵发性脐周疼痛。身体评估:右下腹触及4cmx5cm包块,质中等,轻触痛,肠鸣音亢进。红细胞沉降率67mm/h,PPD试验强阳性。最可能的诊断是（ ）

- A、肠结核
- B、盲肠癌
- C、右侧卵巢囊肿
- D、阑尾炎
- E、阑尾周围脓肿

答案：A

5、患者男、37岁。因胆石症入院行胆囊切除术、胆总管切开术,术中放置T管。护士向患者家属解释时。应说明使用T管的首要目的是

- A、将胆汁进入十二指肠的量减至最少
- B、引流胆汁和减压
- C、阻止胆汁进入腹膜腔
- D、促进伤口引流
- E、提供冲洗超道的途径

答案：B

6、新冠病毒经呼吸道飞沫直径一般在()密闭场所、长时间暴露、高浓度的环境中存在气溶胶()传播的可能。

- A、 $2-5\mu\text{m}>5\mu\text{m}$
- B、 $5-10\mu\text{m}<5\mu\text{m}$
- C、 $5-10\mu\text{m}>5\mu\text{m}$
- D、 $2-5\mu\text{m}<5\mu\text{m}$
- E、 $2-5\mu\text{m}>4\mu\text{m}$

答案：C

7、处理医嘱流程不包括()

- A、执行治疗处置
- B、主办护士口头通知责任护士执行医嘱
- C、治疗、处置用物准备
- D、医师下达医嘱
- E、护士确认医嘱

答案：B

8、为提高菌血症血培养阳性率,抽血时间最好选择在

- A、发热最高峰时
- B、寒战高热时
- C、寒战开始前
- D、使用抗生素后
- E、寒战结束时

答案：B

9、产妇,30岁,于22:00顺利分娩一男婴,至次晨6:00未排尿,主诉下腹胀痛难忍,查体发现膀胱过度膨胀,对该产妇护理措施错误的是

- A、立即施行手术
- B、让其听流水声
- C、协助其坐起排尿
- D、用手轻轻按摩下腹部
- E、用温水冲洗会阴

答案：A

10、肺血栓栓塞症发生后,病人常即刻出现()

- A、咳嗽
- B、咯血
- C、胸痛
- D、呼吸困难
- E、烦躁不安

答案：D

11、为防止逆行感染,应指导患者尿袋高度低于_____水平?()

- A、耻骨联合
- B、坐骨结节
- C、膝关节
- D、髂前上棘

答案：A

12、输血前,需经几人查对无误后,方可输入[]

- A、四人
- B、两人
- C、一人
- D、随便几人
- E、三人

答案：B

13、甲状腺术后并发甲状腺危象多发生于术后::

- A、8-12 小时
- B、12-36 小时
- C、36-72 小时
- D、4-5 天
- E、6-7 天

答案：B

14、阑尾切除术后早期下床活动的目的是预防()

- A、盆腔脓肿
- B、肠粘连
- C、膈下脓肿
- D、切口感染
- E、内出血

答案：B

15、除非紧急情况,利尿剂的应用时间一般不选用()

- A、上午
- B、中午
- C、晚上
- D、早晨
- E、下午

答案: C

16、某病人在冬季用煤炉取暖时,出现头痛、头晕、无力、胸闷、心悸、恶心等症状。现场抢救时首要措施是()

- A、给予口对口人工呼吸
- B、高压氧吸入
- C、立即将病人搬到室外空气新鲜处
- D、给与止痛药
- E、给予物理降温

答案: C

17、秦某,男,70岁,诊断2型糖尿病15年。因“双足多处皮下蜂窝织炎”入院,皮肤无溃烂。实验室检查:空腹血糖7.3mmol/L,肝肾功能正常。对该病人应给予的最佳治疗措施是()

- A、饮食疗法+胰岛素
- B、饮食疗法+运动疗法
- C、饮食疗法+阿卡波糖
- D、饮食疗法+二甲双肌
- E、饮食疗法+格列本脉

答案: A

18、患者女,55岁。风湿性心尖瓣膜病,平时一般活动无明显症状。近两日感冒后,出现明显心力衰竭的临床表现,入院治疗,护士在评估时,提示患者心衰严重的表现是

- A、端坐体位
- B、听力减弱
- C、血压95/65mmHg
- D、心率95次/分
- E、体温37.5℃

答案: A

19、禁忌使用鼻饲法的病人是

- A、破伤风病人

- B、食管下段静脉曲张病人
- C、人工冬眠病人
- D、昏迷病人
- E、口腔手术病人

答案：B

20、向某,男,45岁。因长期咳嗽、咳脓痰,反复咯血,以支气管扩张症收入院。病人近日咯血量增多,咯血间隔时间变短。入院当晚,护士在巡视时发现病人咯血突然中止,表情紧张、惊恐,大汗淋漓,两手乱动,继而颜面发绀。该病人可能并发了

- A、失血性休克
- B、窒息
- C、吸入性肺炎
- D、肺不张
- E、肺梗死

答案：B

21、肺性脑病不能用高浓度吸氧,主要是因为()

- A、可引起氧中毒
- B、缺氧不是主要因素
- C、诱发代谢性酸中毒
- D、促使CO₂排出过速
- E、解除了主动脉体和颈动脉体的兴奋性

答案：E

22、下列哪种情况禁用热疗法

- A、炎症晚期
- B、感觉迟钝
- C、循环不良
- D、各种脏器内出血
- E、四肢厥冷

答案：D

23、脑血管疾病三级预防中最关键的是()

- A、预防复发,提高生活质量
- B、发病前预防
- C、早期治疗
- D、防治并发症
- E、早期诊断

答案：B

24、女性, 35 岁, 有风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史 5 年, 近年来出现胸闷、气促伴咳嗽, 有咯血史。体检发现口唇发绀。其二尖瓣瓣口面积估计是

- A、 $<1.5\text{cm}^2$
- B、 $2.0\sim 2.5\text{cm}^2$
- C、 $1.8\sim 2.0\text{cm}^2$
- D、 $>2.5\text{cm}^2$
- E、 $1.5\sim 1.8\text{cm}^2$

答案：A

25、病毒性脑炎患儿急性颅内压升高有脑疝先兆时, 首先使用的药物是

- A、地塞米松静脉注射
- B、50%葡萄糖静脉注射
- C、20%甘露醇静脉注射
- D、呋塞米肌内注射
- E、50%甘油口服

答案：C

26、不是甲状腺癌的常见病理类型是

- A、髓样癌
- B、未分化癌
- C、鳞癌
- D、滤泡状腺癌
- E、乳头状癌

答案：C

27、鼻饲过程中应保持头高位或抬高多少床头, 能有效防止反流, 注意勿使胃管脱出。()

- A、 $5\sim 15^\circ$
- B、 $15\sim 25^\circ$
- C、 $20\sim 30^\circ$
- D、 $10\sim 20^\circ$
- E、 $25\sim 35^\circ$

答案：C

28、陈女士, 57 岁, 行胆总管切开取石、T 管引流术, 术后出现胆总管远端阻塞时, T 管引流表现为 ()

- A、胆汁棕色、稠厚
- B、胆汁清淡

- C、胆汁浑浊
- D、胆汁引流量过少
- E、胆汁引流量过多

答案：E

29、为气管插管患者做口腔护理以下哪项是错误的()

- A、口腔护理前放出气囊内的气体
- B、禁止漱口
- C、不合作患者需一人协助固定气管导管
- D、根据病情选择合适的口腔护理液
- E、教会患者用手势表达不适

答案：A

30、急性中毒病人,当诊断不明时,应选择的洗胃液是()

- A、1:15000 高锰酸钾
- B、牛奶
- C、温开水或生理盐水
- D、3%过氧化氢
- E、2%-4%碳酸氢钠

答案：C

31、林某,男,49岁。因“左上腹痛3天”收入院,既往有“急性胰腺炎”病史,以下不属于护士重点评估的内容是()

- A、腹痛的部位、性质和程度
- B、体位
- C、营养状态
- D、伴随症状
- E、诱因

答案：C

32、下列选项中,不属于脑卒中一级预防的内容是()

- A、积极进行康复训练
- B、控制体重
- C、应用他汀类药物控制血脂
- D、防治心脏病
- E、戒烟限酒

答案：A

33、体位引流宜在()进行,以免导致呕吐。每次引流()。一般可安排在晨起时.晚餐前及睡前,正确答案:是()

- A、饭前 1 小时或饭后 1 小时
20~30 分钟,每天 3~5 次
- B、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时
20~30 分钟,每天 3~5 次
- C、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时
15~20 分钟,每天 1~3 次
- D、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时
15~30 分钟,每天 1~3 次
- E、饭前 1~2 小时或饭后 1 小时
15~20 分钟,每天 1~3 次

答案: C

34、下列关于新型冠状病毒肺炎胸部影像学特点,说法正确的是()

- A、早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显
- B、MIS-C 时,心功能不全患者可见心影增大和肺水肿
- C、进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影
- D、严重者可出现肺实变,胸腔积液少见
- E、以上都是

答案: E

35、胃穿孔时腹腔穿刺抽出液的性质是()

- A、稀脓性有臭味
- B、血性渗出液
- C、不凝固血液
- D、黄色、浑浊无臭味
- E、血性脓液有臭味

答案: D

36、顾先生,39 岁,外伤后下腹部剧烈疼痛,并有少量血尿排出。体格检查:全腹有压痛、腹肌紧张,移动性浊音阳性。试插导尿管可顺利进入膀胱,注入生理盐水 200ml 后抽出不足 150ml。首先应考虑为()

- A、膀胱损伤
- B、后尿道损伤
- C、肾损伤
- D、前尿道损伤
- E、肠破裂

答案: A

37、查阿米巴原虫,留取粪便标本的正确方法是

- A、清晨留取少许
- B、取粪便异常部位
- C、取粪便表面的部分
- D、留新鲜粪便,注意保暖,立即送检
- E、取粪便的不同部位

答案: D

38、以下需要集中隔离观察的人群不包括

- A、无法排除的发热患者
- B、高风险地区流入人员
- C、确诊患者密切接触者
- D、确诊患者
- E、入境人员

答案: D

39、女性,43岁,头部被撞击致伤,唤之睁眼,回答问题错误,检查时躲避刺痛,其C格拉斯哥昏迷评分为()

- A、15分
- B、12分
- C、11分
- D、8分
- E、5分

答案: C

40、解救镇静催眠类药物和急性乙醇中毒时,使用()

- A、利多卡因
- B、胺碘酮
- C、葡萄糖酸钙
- D、阿托品
- E、纳洛酮

答案: E

41、一氧化碳中毒病人宜输入

- A、新鲜血
- B、红细胞混悬液
- C、血浆
- D、库血
- E、白蛋白液

答案: B

42、李某,女,18岁。诊断为1型糖尿病6年,BMI23.0kg/m²。护士为其制订的饮食原则中,正确的是()

- A、进餐热量分配为1/5、2/5、2/5
- B、以摄食饱和脂肪酸为宜
- C、脂肪占总热量的30%以上
- D、禁食粗纤维食物避免腹泻
- E、碳水化合物占总热量的45%以下

答案: A

43、约束患者牵拉臂丛神经导致尺神经损伤,第4、5指的指间关节弯曲形成()

- A、方肩
- B、爪行手
- C、尺侧偏屈
- D、桡侧偏屈
- E、垂腕征

答案: B

44、使用前需测心率的药物是

- A、氯丙嗪
- B、普萘洛尔
- C、地西洋
- D、泼尼松
- E、洋地黄

答案: E

45、张女士,55岁,行胆总管切开取石、T管引流术,术后出现胆总管远端阻塞时,T管引流表现为()

- A、胆汁引流量过多
- B、胆汁引流量过少
- C、胆汁清淡
- D、胆汁浑浊
- E、胆汁棕色、稠厚

答案: A

46、患者男,36岁。有慢性胃炎病史,护士在执行医嘱时,使用前应着重与医生进行沟通的药物是

- A、泼尼松
- B、多潘立酮

- C、考来烯胺
- D、雷尼替丁
- E、山莨菪碱

答案：A

47、与输入血液质量有关的早期输血反应为：

- A、过敏反应
- B、溶血反应
- C、发热反应
- D、细菌污染反应
- E、输液反应

答案：A

48、就多数传染病而言,最常见的感染表现形式是()

- A、暴发流行
- B、显性感染
- C、隐性感染
- D、潜伏性感染
- E、冰原携带状态

答案：C

49、原发性肝癌最早、最常见的转移方式是()

- A、种植转移
- B、肝内血行转移
- C、淋巴转移
- D、消化道转移
- E、肝外血行转

答案：B

50、协助患者取___卧位,有利于胆汁引流。()

- A、半卧
- B、半坐卧
- C、斜坡
- D、头高脚低

答案：B

51、根据病因学分类,目前临床最常见的肺炎为：

- A、理化因素所致肺炎
- B、真菌性肺炎
- C、病毒性肺炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638100112124006036>