

2024年湖南娄底市南华大学附属第一医院医疗集团双峰县人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、确诊为女性生殖器尖锐湿疣，不适宜的治疗是（ ）。

- A. 50%三氯醋酸
- B. 冷冻
- C. 激光
- D. 口服红霉素
- E. 微波

【正确答案】

D

【答案解析】

生殖器尖锐湿疣可采用局部药物治疗，如50%三氯醋酸外涂；物理治疗，如冷冻、激光、微波。尖锐湿疣是由人类乳头瘤病毒引起，而红霉素不能治疗人类乳头瘤病毒引起的感染。

2、智商IQ的结论“高于平常”，是指其分数为（ ）。

- A. 70~79
- B. 80~89
- C. 90~109
- D. 110~119
- E. 120~129

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、类风湿关节炎最早出现的关节症状是（ ）。

- A. 晨僵
- B. 关节痛
- C. 关节肿
- D. 关节畸形
- E. 关节活动障碍

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、新生儿病理性黄疸，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 生后24小时内出现黄疸
- B. 血清胆红素 $>205\mu\text{mol/L}$ （12mg/dl）
- C. 足月儿黄疸持续 >2 周，早产儿黄疸持续 >4 周
- D. 黄疸退而复现
- E. 血清结合胆红素 $>17.1\mu\text{mol/L}$ （1mg/dl）

『正确答案』

E

『答案解析』

新生儿病理性黄疸特点是：①黄疸于出生后24h内出现；②足月儿黄疸持续>2周，早产儿黄疸持续>4周；③黄疸退而复现；④足月儿血清胆红素>205 $\mu\text{mol/L}$ （12mg/dl），早产儿>256 $\mu\text{mol/L}$ （15mg/dl），血清结合胆红素>26 $\mu\text{mol/L}$ （1.5mg/dl）。

5、下列哪项不属于临终关怀的医德要求？（ ）

- A. 发扬人道主义
- B. 减轻痛苦，治疗疾病
- C. 尊重临终关怀，爱护临终病人
- D. 整体服务，满足需求
- E. 科学教育，理性疏解

『正确答案』

B

『答案解析』

发扬人道主义；尊重临终关怀，爱护临终病人；整体服务，满足需求；科学教育，理性疏解等属于临终关怀的医德要求，而减轻痛苦，治疗疾病错在临终关怀并不以治疗疾病为目的。故本题答案为B项。

6、有关III度胎盘早剥的描述，正确的是（ ）。

- A. 阴道流血量与贫血程度成正比
- B. 易导致凝血功能障碍
- C. 胎盘剥离面为胎盘面积的1/5
- D. 出现无原因无痛性阴道流血
- E. 一般胎儿存活

『正确答案』

B

『答案解析』

A项，III度胎盘早剥，临床表现可出现恶心、呕吐、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细数、血压下降等休克症状，且休克程度大多与母血丢失成比例。B项，严重的胎盘早剥可以引发弥散性血管内凝血，最终导致凝血功能障碍，如无凝血功能障碍属IIIa，有凝血功能障碍属IIIb。C项，胎盘剥离面积超过胎盘面积的1/2。D项，常有突发的持续性腹痛、腰酸或腰背痛，疼痛程度与胎盘后积血多少成正比。E项，腹部检查见子宫硬如板状，宫缩间歇时不能松弛，胎位扪不清，胎心消失。

7、双胎妊娠最常见的并发症为（ ）。

- A. 脐带脱垂
- B. 产程延长，产后出血。
- C. 产褥感染
- D. 胎头交锁
- E. 胎膜早破

『正确答案』

B

『答案解析』

双胎妊娠一般早孕反应较重，容易发生缺铁性贫血，还容易并发妊娠高血压综合征、羊水过多、胎儿畸形和前置胎盘，妊娠晚期容易发生胎膜早破和早产，分娩期容易发生宫缩乏力、难产和产后大出血。

8、怀疑胃癌，对下列情况应尽早和定期胃镜检查，其中哪项不正确？（ ）

- A. 40岁以上，特别是男性，近期出现消化不良、呕血或黑粪
- B. 慢性萎缩性胃炎伴胃酸缺乏，有肠化生或不典型增生
- C. 良性溃疡但胃酸缺乏
- D. 胃溃疡经正规治疗无效
- E. X线发现大于2cm的胃息肉者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646210220051010100>