

# 重庆三峡医药高等专科学校

## 临床医学专业实习出科理论考试题库（内科）

（以下每一道题有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。）

1. 十二指肠溃疡并发症不会出现  
A. 癌变 B. 出血 C. 慢性穿孔 D. 幽门梗阻 E. 急性穿孔
2. 就临床所见，上消化道出血最多见于  
A. 空肠上段 B. 胆道 C. 食管 D. 屈氏韧带的近端 E. 贲门
3. 门静脉高压症形成后，不会出现的病理变化  
A. 脾肿大 B. 肝大 C. 腹水 D. 侧支循环的建立和开放 E. 脾功能亢进
4. 中毒性巨结肠的诱因不包括  
A. 高血钾 B. 使用阿片类制剂 C. 钡剂灌肠 D. 使用胆碱能药物 E. 低钾
5. 下列治疗消化性溃疡出血最有效的抑酸药物  
A. 西咪替丁 B. 氧氟沙星 C. 法莫替丁 D. 兰索拉唑 E. 雷尼替丁
6. 劳力性心绞痛发作时最常见的 ECG 表现  
A. T 波倒置 B. ST 段抬高 C. T 波“假性正常化” D. ST 段压低  
E. 病理性 Q 波
7. 在欧美国家，引起肾动脉狭窄最常见的病因  
A. 肾动脉畸形 B. 多发性大动脉炎 C. 动脉粥样硬化  
D. 纤维肌性发育异常 E. 急性肾梗死
8. 最常见的急性心肌梗死并发症  
A. 乳头肌功能失调 B. 心脏破裂 C. 栓塞  
D. 心室壁瘤 E. 心梗后综合症
9. 治疗变异性心绞痛疗效最好的药物  
A. 硝酸甘油 B. 钙离子拮抗剂 C.  $\beta$  受体阻滞剂 D. ARB E. ACEI
10. 心肌梗死后心脏破裂多发生在  
A. 室间隔 B. 心室前壁 C. 心室后壁 D. 心室游离壁 E. 心尖部
11. 下列什么药物在双肾动脉狭窄伴高血压患者中不能使用  
A. 钙通道拮抗剂 B. 利尿剂 C. ACEI D. 血管紧张素受体阻滞剂  
E. 硝酸甘油
12. 房颤的心电图表现是  
A. P 消失，代之以小而不规则的 f 波 B. 心房活动呈规律的锯齿状 P 波  
C. 正弦图形，波幅大而规则 D. QRS 波群起始部分粗钝，终末部分正常  
E. P 波与 QRS 波无关，心室率快于心房率
13. 下列哪项不是渗出性胸膜炎的病因  
A. 阻塞性肺炎累及胸膜 B. 纵隔肿瘤侵袭胸膜 C. 系统性红斑狼疮  
D. 气胸 E. 药物过敏
14. 结核性腹膜炎一般不会出现  
A. 腹部压痛 B. 腹部触诊呈揉面感 C. 移动性浊音阴性  
D. 振水音 E. 腹部包块
15. 易造成蛛网膜下腔出血的疾病是

- A. 颅内动脉瘤      B. 后颅凹肿瘤      C. 脑震荡      D. 脑挫裂伤      E. 脑膜膨出
16. 中性粒细胞反应性增高的原因不包括  
A. 急性粒细胞白血病      B. 急性感染      C. 急性失血  
D. 急性溶血      E. 恶性肿瘤
17. 脑复苏的主要目的是  
A. 防治脑水肿      B. 防止体温降低      C. 减少耗氧量  
D. 保持脑功能      E. 防止昏迷
18. 关于抗生素的应用原则，不正确的是  
A. 所有的外科感染都要用抗生素      B. 最好根据细菌培养和药敏结果选择抗生素  
C. 药物敏感的药物不一定体内有效      D. 抗菌药物的剂量一般按体重计算  
E. 老年人应用抗生素应适当调整剂量
19. 甲亢常见的类型是  
A. 单纯性甲状腺肿      B. Graves 病      C. 高功能腺瘤  
D. 结节性毒性甲状腺肿      E. 亚甲炎
20. 乳腺癌出现桔皮现象的原因  
A. 癌肿累及 Cooper 韧带      B. 癌肿侵入乳管  
C. 癌细胞广泛扩散到乳腺及其周围皮肤      D. 皮下淋巴管阻塞  
E. 淋巴结压迫腋静脉
21. 结肠癌最早出现的性状  
A. 腹痛      B. 腹部肿块      C. 肠梗阻症状  
D. 大便习惯和性状的变化      E. 贫血
22. 中度失血性休克病人估计失血量为  
A. 500mL 以下      B. 800mL 以下      C. 800 ~1000mL  
D. 800 ~1600mL      E. 1600mL 以上
23. 短期内输库存血 5000mL，病人容易发生的酸碱平衡紊乱是  
A. 代谢性酸中毒      B. 代谢性碱中毒      C. 呼吸性酸中毒  
D. 呼吸性碱中毒      E. 代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒
24. 上尿路结石的主要表现  
A. 血尿+疼痛      B. 尿毒症      C. 发热，寒颤      D. 膀胱刺激征      E. 恶心呕吐
25. 膀胱癌最常见的组织学类型是  
A. 鳞癌      B. 腺癌      C. 移行细胞癌      D. 平滑肌肉瘤      E. 横纹肌肉瘤
26. 前列腺增生最早出现的症状  
A. 尿频      B. 血尿      C. 排尿困难      D. 尿痛      E. 尿急
27. 激素使用的指征不包括  
A. 炎症      B. 自身免疫病      C. 急性感染      D. 高热      E. 过敏
28. 能促进小肠吸收铁的是  
A. 维生素 A      B. 维生素 B      C. 维生素 C      D. 维生素 D      E. 维生素 E
29. 急性肾炎患儿参加体育锻炼的标准是  
A. 尿常规正常      B. 血沉正常      C. 血压正常  
D. 尿阿迪计数正常      E. 抗 O 滴度正常
30. 下列可作为肾病综合症与肾炎综合症临床鉴别要点的是  
A. 血尿      B. 肾功能损害      C. 蛋白尿      D. 高血压      E. 水肿
31. 下列与类风湿关节炎活动无关的是  
A. 晨僵      B. 关节畸形      C. 类风湿结节      D. 血沉增快      E. C 反应蛋白增高

32. 女, 30 岁, 2 天来进行性双下肢瘫痪, 大小便障碍。 体温正常。 胸 4 水平以下深浅感觉丧失和瘫痪。 脑脊液检查压力正常, 白细胞  $80 \times 10^6 / L$ , 淋巴细胞占 80%, 蛋白轻度增高, 最可能的诊断是
- A. 脊髓出血 B. 急性脊髓炎 C. 脊髓肿瘤 D. 多发性硬化 E. 急性硬膜外脓肿
33. 心音减弱 p2 减弱可见于
- A. 肺心病 B. 动脉导管未闭 C. 室间隔缺损 D. 房间隔缺损 E. 法洛四联征
34. 老年人前列腺增生所致急性尿潴留时, 最常用的 治疗方法是
- A. 耻骨上膀胱造瘘术 B. 耻骨上膀胱穿刺 C. 中药, 针灸  
D. 服利尿药 E. 导尿
35. 系统性红斑狼疮的最佳筛选试验是
- A. 抗核抗体 B. RF C. 抗中性粒细胞抗体  
D. 抗组织细胞抗体 E. 抗磷脂抗体
36. 慢支急性感染最常见的病原体
- A. 奈瑟球菌 B. 甲型链球菌 C. 流感嗜血杆菌  
D. 草绿色链球菌 E. 金黄色葡萄球菌
37. 冠心病心绞痛发作的典型部位是
- A. 咽部 B. 心前区 C. 心尖部 D. 剑突下 E. 胸骨体中上段之后
38. 胆固醇在体内不能转变生成的是
- A. 维生素 D3 B. 胆汁酸 C. 胆色素 D. 雌二醇 E. 睾酮
39. 新月体肾炎的病变特点
- A. 肾小球系膜细胞大量增生 B. 肾小球内皮细胞显著增生 C. 壁层上皮细胞增生  
D. 毛细血管基底膜多量钉状突起 E. 毛细血管壁增厚成车轨状
40. 急性弥漫性增生性肾炎的病理类型
- A. 肾小球毛细血管内皮细胞和系膜增生 B. 肾小球囊内广泛新月体形成  
C. 弥漫性上皮细胞足突消失 D. 系膜细胞增生, 系膜基质增多 E. 基底膜正常
41. 小儿肾病综合征最常见的类型
- A. 急性肾小球肾炎 B. 膜性增生性肾小球肾炎 C. IgA 肾病  
D. 微小病变型肾病 E. 膜性肾病
42. 大量饮水清水利尿的原理
- A. 肾小球滤过率增加 B. 肾血浆流量增多 C. 抗利尿激素减少  
D. 血浆胶体渗透压降低 E. 醛固酮分泌减少
43. II 型呼吸衰竭常见于下列哪种疾病
- A. 大叶性肺炎 B. 特发性肺纤维化 C. 慢性阻塞性肺疾病  
D. ARDS E. 浸润性肺结核
44. 重度贫血的指标是
- A. 血红蛋白浓度小于 30g/L B. 血红蛋白浓度大于 90g/L  
C. 血红蛋白浓度大于 30g/L 而小于 59g/L D. 血红蛋白浓度大于 60g/L 而小于 90g/L  
E. 血红蛋白浓度大于 110g/L
45. 糖皮质激素类药物可明显减少
- A. 中性粒细胞 B. 淋巴细胞 C. 血小板 D. 红细胞 E. 纤维蛋白原
46. 老年人进行性吞咽困难, 要首先考虑到
- A. 食管癌 B. Barrett 食管炎 C. 腐蚀性食管炎 D. 反流性食管炎 E. 胃癌
47. 急性胰腺炎发病 12 小时以内, 下列哪项检查比较准确
- A. 血钙 B. 血糖 C. 血淀粉酶 D. 血脂肪酶 E. 尿淀粉酶

48.  $\beta$ 受体阻滞剂的主要副作用是  
A. 咳嗽      B. 引起血钾增高      C. 导致高尿酸血症  
D. 诱发哮喘      E. 引起血钠降低
49. 不是心肌炎的病因是  
A. 遗传      B. 放射线照射      C. 白喉杆菌      D. 结节病      E. 病毒
50. 近端指间关节呈梭形肿胀常见于  
A. 类风湿关节炎      B. 风湿性关节炎      C. 骨性关节炎  
D. 痛风性关节炎      E. SLE
51. 对肝硬化门脉高压诊断最有价值的是  
A. 超声显示肝脏回声不均匀      B. 蜘蛛痣      C. 肝功能异常  
D. 钡餐显示食管下段有蚯蚓样充盈缺损      E. 脾大
52. 出现呼吸音增强的疾病是  
A. 重症肌无力      B. 贫血      C. 胸膜炎  
D. 膈肌瘫痪      E. 急性弥漫性腹膜炎
53. 小儿肾病综合症最早出现的表现是  
A. 肉眼血尿      B. 水肿      C. 少尿      D. 面色苍白      E. 精神萎靡
54. 先天性甲减临床症状表现错误的是  
A. 智能低下      B. 身材矮小      C. 脉搏慢      D. 常有腹泻      E. 血压低
55. 肝硬化最常见的并发症是  
A. 上消化道出血      B. 感染      C. 肝性脑病  
D. 原发性肝癌      E. 门静脉血栓形成
56. 对诊断肥厚型梗阻性心肌病最有意义的是  
A. 可闻第三心音      B. 胸骨左缘第三、四肋间有响亮的收缩期杂音  
C. 用力时心前区闷痛及晕厥史  
D. 超声心动图发现舒张期室间隔左室后壁的厚度之比 $\geq 1.3$ ，伴二尖瓣前叶收缩期向前运动  
E. 心电图出现深而宽的病理性Q波
57. 溃疡性结肠炎的临床表现下列哪项是错误的  
A. 腹痛-便意-便后缓解      B. 左下腹压痛      C. 可有腹胀  
D. 易形成肠瘘      E. 可有发热
58. 阑尾最常发生的肿瘤是  
A. 淋巴瘤      B. 平滑肌瘤      C. 类癌      D. 腺癌      E. 纤维肉瘤
59. 男, 48岁。被发现昏倒在煤气热水器浴室内。查体: 浅昏迷, 血压 160/90mmHg。口唇櫻桃红色, 四肢无瘫痪, 尿糖(++), 尿酮体(-), 最有可能的诊断是  
A. 脑出血      B. 高血压危象      C. 急性心肌梗死  
D. 急性CO中毒      E. 糖尿病酮症酸中毒
60. 下列不属于DU并发症的是  
A. 急性穿孔      B. 幽门梗阻      C. 癌变      D. 出血      E. 慢性穿孔
61. 以下是慢性腹泻的病症类型, 除了  
A. 渗透性腹泻      B. 渗出性腹泻      C. 分泌性腹泻  
D. 运动功能异常性腹泻      E. 服用番泻叶
62. 有关肝性脑病, 正确的治疗是  
A. 病人躁狂不安时使用水合氯醛灌肠      B. 肥皂水灌肠清除肠腔积血  
C. 静脉使用甲硝唑抑制肠道细菌的生长      D. 低蛋白饮食      E. 口服乳果糖

63. 中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于  
A. 慢性粒细胞白血病      B. 类白血病反应      C. 急性粒细胞白血病  
D. 急性淋巴细胞白血病      E. 淋巴瘤
64. 急性心梗后第 12 天出现发热和心包摩擦音，血沉 32mm/h，血白细胞  $6.2 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞 56%。可能是  
A. 急性心梗的反应性心包炎      B. 心脏破裂      C. 急性心梗后综合症  
D. 伴发病毒性心包炎      E. 室壁瘤
65. 根据症状和体征提示有胸腔积液时，需确定是否有胸腔积液时首选的检查是  
A. 超声波      B. 胸片      C. 胸部 CT      D. 胸部 MRI      E. 血常规
66. 男性，62 岁。慢性咳嗽 10 年，近半月来出现阵发性干咳，持续痰中带血。X 胸片显示左肺下叶不张。为明确诊断最有意义的检查是  
A. 纤维支气管镜检查      B. 痰细菌培养      C. 结核菌素试验  
D. 肺功能测定      E. 血清癌胚抗原测定
67. 肝癌的临床表现中，提示属晚期肝癌的表现是  
A. 腹胀，乏力      B. 肝区疼痛      C. 食欲不振      D. 肝区肿块      E. 体重下降
68. 原发性肝癌最主要的转移部位是  
A. 肺      B. 肝内播散      C. 骨      D. 左锁骨上淋巴结      E. 脑
69. 溃疡性结肠炎的好发部位是  
A. 空肠远端      B. 回肠远端      C. 回盲部      D. 横结肠      E. 直肠，乙状结肠
70. 下列不属于急性病毒性心肌炎常见临床表现的是  
A. 先有发热，然后出现心悸、胸闷      B. 恶心、呕吐等消化道症状  
C. 可合并各种心律失常      D. 常出现器质性心脏杂音      E. 心动过速与发热程度平行
71. 对原发性肝癌早期诊断最有价值的是  
A. 甲胎蛋白测定      B. 癌胚抗原测定      C. B 超检查      D. CT 检查      E. 腹部平片
72. 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是  
A. 强制性脊柱炎      B. 类风湿关节炎      C. SLE      D. 骨性关节炎      E. 痛风性关节炎
73. 预防 MODS 的基本要点中，错误的是  
A. 重视诊治急重症时的整体观念      B. 重视病人循环呼吸      C. 防治感染  
D. 积极改善全身状态      E. 及早治疗序贯继发的多个重要器官的功能障碍
74. 中年妇女乳头血性溢液应首先考虑  
A. 乳管内乳头状瘤      B. 乳腺囊性增生症      C. 乳腺纤维腺瘤  
D. 炎性乳癌      E. 乳腺硬癌
75. 依据糖尿病的诊断标准，目前确诊糖尿病选用  
A. OGTT1h 血糖      B. 血浆血糖      C. 糖化血红蛋白  
D. 尿糖定性      E. 24 小时尿糖定量
76. 有高血压的内分泌疾病中，尿儿茶酚胺增多见于  
A. 甲状腺功能亢进      B. 库欣综合症      C. 肢端肥大症  
D. 原发性醛固酮增多症      E. 嗜铬细胞瘤
77. 导致急性心肌梗死患者早期 (24 小时内) 死亡的主要原因为  
A. 心力衰竭      B. 心源性休克      C. 心律失常      D. 心脏破裂      E. 肺栓塞
78. 男性，31 岁，上夜班时突发上腹部剧烈疼痛，20 分钟后疼痛波及右下腹。检查肝浊音界消失，上腹部腹肌紧张，右下腹有明显压痛及反跳痛。该病人最可能的诊断是  
A. 胃溃疡急性穿孔      B. 急性阑尾炎      C. 急性胆囊炎  
D. 急性胰腺炎      E. 急性小肠梗阻

79. 男, 23 岁, 因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体: 面色稍苍白, 血压 100/60mmHg。心率 92 次/分, 腹软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。最可能的诊断是
- A. 食管静脉曲张破裂出血      B. 十二指肠溃疡并发出血      C. 胃癌出血  
D. 卓-艾综合症并发出血      E. 食管贲门撕裂综合症
80. 可进行骨髓移植的治疗的贫血是
- A. 巨幼细胞性贫血      B. 再生障碍性贫血      C. 自身免疫性溶血性贫血  
D. 慢性病贫血      E. 缺铁性贫血
81. 慢性再障的治疗首选
- A. 丙酸睾酮肌内注射      B. 造血干细胞移植      C. 维生素 B12 肌注  
D. 抗胸腺球蛋白      E. 肾上腺糖皮质激素口服
82. 慢性萎缩性胃炎的病理改变中属于癌前病变的
- A. 明显肠上皮化生      B. 中度以上不典型增生      C. 胃小凹上皮增生  
D. 假幽门腺化生      E. 假幽门腺化生伴肠上皮化生
83. 甲亢治疗时粒细胞减少多见于
- A. 放射性核素碘 131 治疗      B. 复方碘溶液治疗      C. 抗甲状腺药物治疗  
D. 甲状腺次全切除术      E. 甲状腺素治疗
84. 男, 35 岁, 阵发性心悸 3 年, 发作时按摩颈动脉窦心悸可突然终止。发作时心电图示: 心室率 190 次/分, 逆行 P 波, QRS 波群形态与时限正常。该患者最可能的诊断是
- A. 心房颤动      B. 窦性心动过速      C. 房性期前收缩  
D. 阵发性室性心动过速      E. 阵发性室上性心动过速
85. 室性心动过速伴严重血流动力学障碍时, 终止发作的首选方法是
- A. 利多卡因      B. 胺碘酮      C. 同步电复律  
D. 人工起搏超速抑制      E. 压迫颈动脉窦
86. 对于无器质性心脏病无症状的室性期前收缩的患者, 应采取的治疗是
- A. 去除病因和诱因      B. 胺碘酮      C. 维拉帕米  
D. 普罗帕酮      E. 美西律
87. 初次诊断活动期十二指肠溃疡, 下列治疗中最合适的是
- A. 联合应用两种粘膜保护剂      B. 促动力剂+ H<sub>2</sub> 受体拮抗剂  
C. 质子泵抑制剂+粘膜保护剂      D. 质子泵抑制剂+两种抗生素      E. 抗酸剂
88. 短暂性脑缺血发作(TIA), 出现相应的症状及体征, 完全恢复最长应在
- A. 6 小时内      B. 12 小时内      C. 24 小时内      D. 48 小时内      E. 72 小时内
89. 颅内感染、颅压增高应该用下列哪项治疗
- A. 糖皮质激素      B. 甘露醇      C. 头孢菌素      D. 多巴酚丁胺      E. 多巴胺
90. 原发性肝细胞肝癌最理想的肿瘤标记物为
- A. AFP      B. GGT2      C. CA19-9      D. CA125      E. CEA
91. 膀胱癌最常见的组织类型是
- A. 非上皮性肿瘤      B. 鳞状细胞癌      C. 腺癌      D. 绒毛膜上皮癌      E. 移行细胞癌
92. 根据蛋白尿的发生机制, 蛋白尿可分为五类, 下列哪一类是错误的
- A. 肾小球性蛋白尿      B. 肾小管性蛋白尿      C. 溢出性蛋白尿  
D. 分泌性蛋白尿      E. 假性蛋白尿
93. 输血后 7 ~14 天发生的输血并发症是
- A. 非溶血性发热性输血反应      B. 过敏反应      C. 迟发型溶血反应  
D. 细菌污染反应      E. 输血相关的急性肺损伤
94. 右心衰竭体循环淤血的表现是

- A. 端坐呼吸      B. 心源性哮喘      C. 劳力性呼吸困难  
D. 阵发性夜间呼吸困难      E. 肝颈静脉反流征阳性
95. 男，48岁。发作性胸痛1个月，每次发作含硝酸甘油后缓解，考虑冠心病心绞痛。最常用的检测方法是
- A. 心脏X线摄片      B. 心电图运动负荷试验      C. 放射性核素检查  
D. 动态心电图      E. 超声心动图
96. 尿毒症病人高血压的主要原因是
- A. 肾素增多      B. 促红素减少      C. 水钠潴留  
D. 血管加压素增多      E. 交感神经兴奋
97. 右心衰竭的病人常因组织液生成过多而致下肢水肿，其主要原因是
- A. 血浆胶体渗透压降低      B. 毛细血管血压增高      C. 组织液静水压降低  
D. 组织液胶体渗透压升高      E. 淋巴回流受阻
98. 乙型肝炎后肝硬化的主要合并症不包括
- A. 肝癌      B. 门静脉高压症      C. 急性肠系膜上静脉血栓形成  
D. 肝功能衰竭      E. 急性肝静脉血栓形成
99. 男性，50岁。乙型肝炎病史10年，近3个月肝区胀痛不适，CT检查：肝右叶5cm占位性病变，为进一步明确性质应首选检测
- A. CA19-9      B. 甲胎蛋白      C. 癌胚抗原      D. CA15-3      E. 碱性磷酸酶
100. 区别血尿和血红蛋白尿的主要方法是
- A. 观察血尿颜色      B. 做尿胆原测定      C. 做尿潜血试验  
D. 做尿三杯试验      E. 做尿沉渣镜检
101. 我国肝硬化最常见原因是
- A. 酒精中毒      B. 营养不良      C. 循环障碍      D. 药物损伤      E. 病毒性肝炎
102. 下面不是抑制胃酸分泌的药物是
- A. 法莫替丁      B. 阿托品      C. 丙谷胺      D. 氢氧化铝      E. 奥美拉唑
103. 轻型急性胰腺炎治疗中，不是必需措施的
- A. 禁食      B. 抑制胰腺分泌药物      C. 维持水电解质平衡  
D. 对症治疗      E. 预防感染
104. 胃溃疡最好发部位是
- A. 胃角      B. 胃大弯侧      C. 胃角和胃小弯侧      D. 贲门      E. 胃体
105. 我国慢性活动性胃炎最主要的病因
- A. 药物      B. HP      C. 胆汁      D. 自身免疫      E. 物理因素
106. 肝性脑病病人禁用
- A. 口服25%硫酸铝      B. 口服抗生素      C. 口服乳果糖  
D. 肥皂水灌肠      E. 生理盐水灌肠
107. 确诊急性糜烂性胃炎首选检查方法是
- A. 粪隐血试验      B. 胃液分析      C. 胃X线钡餐      D. 胃镜      E. B超
108. 血清肌酸激酶水平开始升高为急性心梗后
- A. 1-3h      B. 4-6h      C. 7-9h      D. 10-12h      E. 13-24h
109. 单纯性慢性左心衰最常见临床表现
- A. 黄疸      B. 少尿      C. 下肢水肿      D. 劳力性呼吸困难      E. 咳粉红色泡沫样痰
110. 评价心功能最常见的检查方法
- A. 常规心电图      B. 超声心动图      C. 动态心电图  
D. 放射性核素      E. 心电图运动负荷试验

111. 最有助于确诊室性心动过速的心电图表现  
A. p 波与 QRS 波群无固定关系 B. QRS 波群形态畸形 C. R-R 间期绝对不等  
D. T 波倒置 E. 心室夺获
112. 最有助于确诊肥厚性心肌病的检查  
A. 胸部 X 线检查 B. 常规心电图 C. 超声心动图  
D. 动态心电图 E. 心电图运动负荷试验
113. 合并哮喘的高血压患者不宜选用  
A. 利尿剂 B.  $\beta$  受体阻滞剂 C. 钙通道阻滞剂  
D. 血管紧张素受体阻滞剂 E. 血管紧张素转换酶抑制剂
114. 确诊冠心病主要依靠  
A. 胸部 X 线 B. 常规心电图 C. 超声心动图  
D. 动态心电图 E. 冠状动脉造影
115. 属于感染性发热原因的是  
A. 大面积烧伤 B. 血吸虫病 C. 脑出血 D. 风湿热 E. 甲亢
116. 口腔排出血性液体经 PH 定性为碱性多见于  
A. 消化性溃疡 B. 二尖瓣狭窄 C. 胆道出血 D. 急性胃炎 E. 肝硬化
117. 骤然发生呼吸困难多见于  
A. 肺炎 B. 尿毒症 C. 大块肺栓塞 D. 慢性支气管炎 E. 急性渗出性肾炎
118. 强烈提示有脑膜炎存在的表现是头痛伴有  
A. 眩晕 B. 发热 C. 精神症状 D. Kernig 征阳性 E. 癫痫样发作
119. 评估营养不良的指标不包括  
A. 体重急速下降 B. 血清转铁蛋白量升高 C. 贫血  
D. 血浆蛋白降低 E. 周围血淋巴细胞计数减少
120. 初期复苏时心按压的错误做法是  
A. 胸外心脏按压应按压胸骨下半部 B. 可使肋骨骨折, 以保按压效果  
C. 无效时可做开胸心脏按压 D. 成人每分钟按压100次以上 E. 下压需要达到4cm
121. 国际抗癌联盟制定的恶性肿瘤 TNM 分期法中 M 是指  
A. 发生肿瘤的器官 B. 原发肿瘤数量 C. 转移性肿瘤的数量  
D. 远处转移 E. 患肿瘤的时间区间
122. 手术治疗甲亢长期治愈率达  
A. 90% B. 80% C. 75% D. 70% E. 65%
123. 原发性肝癌最常见的转移部位是  
A. 脑 B. 肺 C. 肝 D. 骨 E. 淋巴结
124. 重型颅脑损伤常见的致命性并发症是  
A. 褥疾 B. 消化道出血 C. 角膜溃疡 D. 尿路感染 E. 肺炎
125. 前列腺增生最主要的症状是  
A. 进行性排尿困难 B. 尿频 C. 血尿 D. 尿潴留 E. 尿失禁
126. 营养性缺铁性贫血应用铁剂治疗的时间是  
A. HB 达正常水平后即可 B. 网织红细胞计数达高峰即可  
C. HB 达正常水平后, 1~2月左右 D. 网织红细胞和 HB 均达正常水平 E. 总疗程4周
127. 鉴别单纯性肾病和肾炎性肾病的指征不包括  
A. 低蛋白血症 B. 补体 C3降低 C. 高血压 D. 氮质血症 E. 血尿
128. 男性, 48岁, 肥胖。餐后阵发性右上腹痛, 每次发作持续约1~4小时, 伴有恶心和腹胀。首选的检查方法是



- A. B超    B. CT    C. 胃镜    D. 口服法胆囊造影    E. 上消化道钡餐透视
129. 男性, 56岁。进食胸骨后烧灼感3周, 上消化道钡餐造影检查: 见食管中段粘膜紊乱、中断, 管壁僵硬, 管腔狭窄, 长约3cm, 此时首先考虑的诊断是
- A. 食管裂孔疝    B. 食管囊肿    C. 食管癌  
D. 食管平滑肌瘤    E. 食管憩室
130. 女性62岁, 无自觉不适, 健康体检发现肺部阴影抗结核治疗3个月后复查下一步治疗应该首先考虑
- A. 继续抗结核治疗    B. 大剂量抗生素治疗    C. 抗真菌治疗  
D. 定期复查    E. 手术探查
131. 女性, 50岁, 因肺癌进行化疗。2天来陆续出现皮肤瘀斑, 时有鼻出血, 体温38℃, 血压120/70mm-Hg, HB105g/L, WBC3.1x10<sup>9</sup>/L, 血小板13x10<sup>9</sup>/L。此时医生应给予输注
- A. 全血    B. 新鲜全血    C. 红细胞悬液  
D. 血小板    E. 红细胞悬液和新鲜冰冻血浆
132. 急性白血病的主要临床表现是
- A. 出血    B. 贫血    C. 明显脾肿大  
D. 发热、贫血、出血    E. 发热、贫血、出血、淋巴结或肝脾肿大
133. 慢性粒细胞白血病主要临床表现是
- A. 出血    B. 贫血    C. 明显脾肿大  
D. 发热、贫血、出血    E. 发热、贫血、出血、淋巴结或肝脾肿大
134. 阵发性室上性心动过速
- A. P波呈双峰    B. P-R间期逐渐延长    C. P波消失, 代之以f波  
D. P波与QRS波群完全无关    E. P波为逆行型, 与QRS波群关系恒定
135. 第二度I型房室传导阻滞
- A. P波呈双峰    B. P-R间期逐渐延长    C. P波消失, 代之以f波  
D. P波与QRS波群完全无关    E. P波为逆行型, 与QRS波群关系恒定
136. 对结肠癌诊断和判断预后有意义的是
- A. AFP    B. P53    C. P16    D. CEA    E. CA19-9
137. 符合化脓性脑膜炎的脑脊液变化
- A. WBC5x10<sup>6</sup>/L, 淋巴细胞为主, 蛋白0.3g/L, 糖3.5mmol/L, 氯化物120mmol/L  
B. WBC10x10<sup>6</sup>/L, 淋巴细胞为主, 蛋白0.3g/L, 糖3.5mmol/L, 氯化物125mmol/L  
C. WBC20x10<sup>6</sup>/L, 中性粒细胞为主, 蛋白0.4g/L, 糖2.5mmol/L, 氯化物120mmol/L  
D. WBC200x10<sup>6</sup>/L, 淋巴细胞为主, 蛋白0.8g/L, 糖2.0mmol/L, 氯化物100mmol/L  
E. WBC2000x10<sup>6</sup>/L, 中性粒细胞为主, 蛋白1g/L, 糖1.5mmol/L, 氯化物106mmol/L
138. 尿毒症患者发生纤维性骨炎的主要原因是
- A. 尿钙排泄增多    B. 继发性甲状旁腺功能亢进    C. 尿磷排泄减少  
D. 营养不良和低蛋白血症    E. 活性维生素D合成障碍
139. 慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿时, 最特异的诊断性检查为
- A. 热溶血试验    B. 蔗糖溶血试验    C. 酸溶血试验  
D. 荧光斑点试验    E. 抗人球蛋白试验
140. 对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是
- A. 全程血尿    B. 合并尿道刺激征    C. 尿潜血阳性  
D. 肉眼血尿    E. 变性红细胞尿
141. 在下列缺铁性贫血的临床表现中, 属于组织缺铁表现的是
- A. 头晕    B. 眼花    C. 心悸    D. 异食癖    E. 气短

142. 球部尿道损伤后最有特征性的症状是  
A. 初始血尿 B. 终末血尿 C. 全程血尿 D. 尿道溢血 E. 会阴部肿痛
143. II型糖尿病的特点是  
A. 都有“三多一少”表现 B. 患者体型均较肥胖 C. 患者空腹血糖都增高  
D. 空腹均呈阳性 E. 少数以酮症酸中毒为首发表现
144. 尿中发现大量透明管型时，提示病变在  
A. 肾小管和肾盏 B. 肾小管和肾盂 C. 肾小管和肾小球  
D. 肾小管和输尿管 E. 肾小管和膀胱
145. 男，21岁，右侧肢体抽搐2年。突然昏迷1小时，查体：神智浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT显示右额叶脑内血肿。临床诊断最可能是  
A. 原发性癫痫 B. 脑动脉硬化 C. 脑动脉瘤  
D. 脑血管畸形 E. 高血压脑出血
146. 关于特发性血小板减少性紫癜（ITP）的概念，哪一种描述是错误的  
A. 急性型ITP与感染因素有关 B. 血小板寿命缩短 C. 骨髓巨核细胞总数减少  
D. 临床上是比较常见的一种出血性疾病 E. 急性型ITP多见于儿童
147. 10岁男孩，午餐时突发神志丧失，手中持碗失落，碗打碎后即醒。脑电图示3周/秒棘慢波规律性和对称性发放。最可能的诊断是  
A. 复杂部分发作 B. 部分性发作 C. 杰克逊癫痫  
D. 失神发作 E. 不能分类的癫痫发作
148. 胃癌淋巴结转移的常见部位是  
A. 右锁骨上 B. 左锁骨上 C. 右颈部 D. 左颈部 E. 左颌下
149. 高血压伴有低血钾应首先考虑  
A. 主动脉缩窄 B. 原发性醛固酮增多症 C. 嗜铬细胞瘤  
D. 继发于慢性肾炎的高血压 E. 肾动脉狭窄
150. 关于感染性休克病人应用糖皮质激素的依据与方法，不正确的是  
A. 糖皮质激素可以稳定细胞及溶酶体膜，免受内毒素的破坏  
B. 大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用  
C. 适当应用糖皮质激素可以减少合并症 D. 糖皮质激素应从大剂量开始  
E. 要取得疗效至少要使用5天
151. 诊断上尿路结石首选的检查方法是  
A. 腹部平片+静脉尿路造影 B. 逆行造影 C. CT  
D. 肾动脉造影 E. MRI
152. 男性，41岁，发热伴鼻出血1周，检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大，血红蛋白40g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ ，骨髓象原始细胞占60%，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为  
A. 急性粒细胞性白血病 B. 急性早幼粒细胞白血病 C. 急性淋巴细胞白血病  
D. 急性红白血病 E. 急性单核细胞性白血病
153. 肾病综合症最基本的表现是  
A. 尿蛋白定量 $>3.5g/24h$  B. 尿颗粒管型 C. 血浆白蛋白 $<35g/L$   
D. 高度水肿 E. 高脂血症
154. 男，55岁，胃癌行根治性胃大部切除术后3年，因上腹疼痛不适，进食后饱胀、消瘦、贫血入院。钡餐检查：胃空肠吻合口处有充盈缺损和狭窄，最可能的诊断是  
A. 残胃癌 B. 胃癌复发 C. 碱性反流性胃炎  
D. 吻合口消化性溃疡 E. 吻合口炎性水肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648023123124006036>