

# 2024 年公共卫生与预防医学题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

- A. 手
- B. 饮水
- C. 食品
- D. 医疗器械 衣物

【答案】：A

2、下列概念中哪项是错误的【单选题】——

- A. 全面综合性监测可获得医院感染本底感染率
- B. 目标性监测是将有限的人力、财力用于解决医院感染的关键问题
- C. 医院感染与传染病相同的是培养出细菌即能确诊
- D. 医院感染的现患率高于同期的感染发生率 医院感染漏报率的调查目的是对感染率监测质量的评估

【答案】：C

3、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

4、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C.

细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： C

5、供应室无菌区【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】： B

6、消毒的含义是【单选题】——

A. 杀灭物品上的所有微生物

B. 杀灭物品上的芽孢

C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物

D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】： E

7、妇产科检查室【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医

疗区的细菌学指标是

**【答案】**：C

8、用紫外线消毒空气的错误方法是【单选题】——

- A. 时间为 30~60 分钟
- B. 有效距离在 2m 内
- C. 每 10m<sup>2</sup> 安装 30W 紫外线灯管一支
- D. 消毒时间为 20~30 分钟 从灯亮 5~7 分钟后开始计时

【答案】： D

9、输液反应中属于医院感染的有【单选题】——

- A. 由于输注液体中药物引起的发热
- B. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- C. 由于液体被细菌污染引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管导管的感染引起的发热

【答案】： C

10、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

- A. 制定本科室医院感染管理规章制度
- B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施
- C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告
- D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】： C

11、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500 张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于 0.5%
- B. 100~500 张病床的医院,医院感染发病率应低于 8%
- C. 500 张病床以上的医院,医院感染发病率应低于 10%
- D. 100 张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于 2%  
100 张病床以下的医院,医院感染发病率应低于 7%

【答案】： D

12、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

13、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

- A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面
- B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内
- C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用
- D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开 无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

14、传染病院应设置在【单选题】——

- A. 靠近综合性医院
- B. 城市中心
- C. 远离公共场所
- D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

15、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：A

16、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

- A. 100cm
- B. 90cm
- C. 80cm
- D. 70cm 60cm

【答案】： B

17、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

- A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩
- B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水
- C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内
- D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液中

【答案】： A

18、下列情况不是医院感染【单选题】——

- A. 病人发生的感染是上次住院期间获得的
- B. 有明确潜伏期的感染,自入院时计算起。超过其常见潜伏期而发生的感染
- C. 在原有医院感染的基础上又出现其他部位新的感染(除外脓毒症的迁徙病灶)
- D. 没有明确潜伏期的感染,发生在入院 48 小时以后者 新生儿经胎盘获得的感染

【答案】： E

19、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌属
- D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】： C

20、下述监测不合格的有【单选题】——

- A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$
- B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性, 噬菌体试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】： D

21、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 24h
- B. 6h
- C. 48h
- D. 12h 72h

【答案】： A

22、下列关于交叉感染描述正确的是【单选题】——

- A. 在诊疗过程中, 由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期, 入院后发病, 并传给其他病人
- D. 病原体来源于病人本身的感染 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

【答案】： E

23、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

- A. 完全具备持续的人传人的能力
- B. 獼猴为自然储存宿主
- C. 以接触传播为主, 其次是呼吸道传播
- D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】： D

24、儿科病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

25、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

- A. 检验人员
- B. 消化内科医师
- C. 消化内科护士
- D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】：B

26、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】：E

27、护理传染病病人,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

- A. 手掌.腕部.手指.指甲.指缝.手背
- B. 腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲
- C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌
- D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】：E



28、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】

——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: D

29、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】 ——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】: E

30、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】 ——

- A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法
- B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可
- C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒
- D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】: E

31、带入感染【单选题】 ——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染  
【答案】：C

32、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】： E

33、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】： B

34、关于普通 30W 直管型紫外线灯消毒效果监测正确的是【单选题】——

- A. 新灯辐照强度 $\geq 100\mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格
- B. 新灯辐照强度 $\geq 90\mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格
- C. 灯辐照强度 $\geq 80\mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格
- D. 灯辐照强度 $\geq 70\mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格 使用中紫外线灯辐照强度 $\geq 60\mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格

【答案】： B

35、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D.

限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间  
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】： E

36、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： C

37、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】： A

38、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10\text{cfu/mL}$ ,允许检出金黄色葡萄球菌  
使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： E

39、用紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

- A. 20min
- B. 25min
- C. 15min
- D. 35min 30min

【答案】： E

40、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

41、ICU 的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

- A. 探视者进入 ICU 应更衣、换鞋
- B. 工作人员进入 ICU 要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手
- C. ICU 应布局合理,分治疗室(区)和监护区
- D. 病人的安置应感染病人与非感染病人分开,特殊感染病人单独安置 监护区每床使用面积不少于 9.5m<sup>2</sup>

【答案】：A

42、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 乙醇
- C. 苯扎溴铵
- D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

43、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

44、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B.

医院感染是指在医院内获得的感染

- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染      婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

45、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

- A. 环氧乙烷
- B. 70%乙醇溶液
- C. 0.2%过氧乙酸溶液
- D. 2%戊二醛溶液      0.5%碘伏

【答案】：D

46、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科      临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

47、自身感染【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染      病人在家中已发生的感染

【答案】：B

48、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

A. 必须无菌

B.

细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出  
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： B

49、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

A. 医院感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院感染

C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染  
婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】： E

50、每块手术巾的一边应折叠【单选题】——

A. 1/10

B. 1/5

C. 1/4

D. 1/3 1/2

【答案】： C

51、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

A. 化学指示卡法

B. 生物测试法

C. 化学指示管法

D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】： B

52、抗菌药物应用中,下列哪项属错误【单选题】——

A. 病毒感染不用抗菌药物

B. 疑为细菌感染,应先送培养标本而后经验性选药

C.



培养结果出来,根据其药敏结果调整药物

- D. 当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物 一般感染  
抗菌药物用至症状体征消失后 3~4 天

【答案】：D

53、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠  
B. 玻璃类用纱布包好  
C. 物品完全浸没在水中  
D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的  
器械宜打开

【答案】：A

54、I 类、II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌  
B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌  
C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌  
D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌 细菌总数  
 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】：D

55、我国艾滋病最常见的传播途径是【单选题】——

- A. 输血和血制品  
B. 静脉注射毒品  
C. 母婴垂直传播  
D. 性传播 儿童疫苗注射

【答案】：B

56、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区  
B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV 等标记物检查

- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D.

每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】： C

57、重症监护病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

58、用紫外线灯做空气消毒时有效距离为【单选题】——

- A.  $< 3.5m$
- B.  $< 4m$
- C.  $< 2m$
- D.  $< 3m \quad < 2.5m$

【答案】： C

59、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】： D

60、肠道隔离的要求哪项不对【单选题】——

- A. 患者尽可能住隔离室,相同疾病可居一室
- B. 接触感染物时戴手套,若容易污染衣服时穿隔离衣,不需戴口罩
- C. 接触患者及污染物后,护理另一患者前要洗手
- D. 被粪便污染的物品要先清洗再送消毒处理 探视者进入隔离室前应通知值班护士

【答案】： D

- 61、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——
- A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视
  - B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
  - C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视
  - D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】： C

- 62、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】： A

- 63、目前引起下呼吸道感染最主要的病原体是【单选题】——

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 链球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】： A

- 64、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

- A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 耐万古霉素金黄葡萄球菌(VRSA)
- D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】： A

- 65、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

- A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方
- B.

取出的无菌物品不得放回无菌容器内

- C. 无菌包必须注明灭菌日期
- D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h 后必须重新灭菌

【答案】： E

66、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】： A

67、关于消毒灭菌方法的选择,错误的是【单选题】——

- A. 耐热耐湿的物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- B. 手术器具与物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- C. 消毒首选物理方法,不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒
- D. 不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法,如环氧乙烷灭菌 化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用,应加以推广

【答案】： E

68、伤寒病人应采取【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 保护性隔离
- D. 消化道隔离 呼吸道隔离

【答案】： D

69、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——

- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名

- B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
- C.

使用中的灯管的强度监测应每个月监测 1 次

D. 新购灯管强度大于  $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ , 使用中灯管强度大于  $70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到 99.9% 以上为合格灯管

【答案】： C

70、《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》是卫生部于哪年制定的【单选题】——

- A. 2002 年
- B. 2003 年
- C. 2004 年
- D. 2005 年 2001 年

【答案】： C

71、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低, 病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】： D

72、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
- B. 体温表
- C. 呼吸机管道
- D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】： A

73、医院内感染主要发生在【单选题】——

- A. 门诊、急诊病人
- B. 探视者
- C.

医务人员

D. 住院病人 陪护人员

【答案】：D

74、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 保护性隔离

C. 全身使用广谱抗生素

D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

75、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

A. 空气传播

B. 接触传播

C. 血液传播

D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

76、关于洗手指征错误的是【单选题】——

A. 脱手套后不需洗手

B. 接触血液、体液和被污染的物品前后

C. 接触患者前后

D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

77、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会



D. 医院感染管理科

临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

78、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

79、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

80、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

81、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：D

82、母婴室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 每名婴儿床位的占地面积不应少于 0.5-1m<sup>2</sup>
- B. 每张产妇床位的使用面积不应少于 5.5-6.5m<sup>2</sup>
- C. 严格探视制度,探视者应着清洁服装,洗手后方可接触婴儿
- D. 婴儿有感染性疾病时,应及时与其他婴儿隔离,但患儿母亲不需隔离 产妇在传染病急性期,应暂停哺乳

【答案】： D

83、无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

- A. 2h
- B. 12h
- C. 16h
- D. 4h 8h

【答案】： D

84、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物
- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势
- D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】： C

85、合胞体病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： B

86、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

- A.

地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】： C

87、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

A. 7ml

B. 6ml

C. 12ml

D. 15ml 5ml

【答案】： A

88、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

A. 乙型肝炎

B. 艾滋病

C. 鼠咬热

D. 肺鼠疫

【答案】： D

89、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】： B

90、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

A. 8kg

B.

7kg

C. 5kg

D. 6kg 10kg

【答案】：B

91、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

A. 脑室镜

B. 胸腔镜

C. 腹腔镜

D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

92、碘伏属于【单选题】——

A. 中效消毒剂

B. 低效消毒剂

C. 以上都不是

D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

93、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌

B. 洗手刷应一用一灭菌

C. 隔离手术间应远离手术室入口处

D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

94、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

A. 消毒范围超过手术切口 15cm

B. 会阴部用碘酊消毒

C. 消毒范围与备皮范围一致

D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】：A

95、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器, 盛用消毒液
- B. 大口容器, 底部垫纱布
- C. 大口容器, 盛用消毒液, 底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液, 底部垫无菌纱布      大口容器, 盛用消毒液, 底部垫纱布

【答案】： A

96、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

- A. 蚊
- B. 虱
- C. 螨
- D. 鼠 蚤

【答案】： A

97、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要, 主要是指对所有患者均实施

【单选题】——

- A. 基础预防
- B. 标准预防
- C. 接触隔离
- D. 空气隔离    飞沫隔离

【答案】： B

98、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧      碘伏

【答案】： E

99、每日 I 级手术间开始前, 提前开启净化空调系统时间【单选题】——

—

- A.

10分钟

- B. 30分钟
- C. 15分钟
- D. 20分钟 40分钟

【答案】：B

100、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】：E

101、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

102、AFB 隔离指的是【单选题】——

- A. 空气隔离
- B. 接触隔离
- C. 结核菌(病)隔离
- D. 严密隔离 血液-体液隔离

【答案】：C

103、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施

【单选题】——

- A. 24h
- B. 12h
- C.



8h

D. 4h 2h

【答案】：D

104、下列哪项不属医院感染【单选题】——

A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎

B. 入院72小时后发生的肺炎

C. 无症状导管菌尿症

D. 烧伤6小时入院的创面感染 产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】：A

105、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同

B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性

C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加

D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

106、高度危险性物品是指【单选题】——

A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品

B. 虽有微生物污染,但一般情况下无害的物品

C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品

D. 仅和皮肤粘膜相接触,而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】：C

107、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——  
A.

国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

108、输液反应中属于医院感染的是【单选题】——

A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

B. 由于液体被细菌污染引起的发热

C. 由于输注液体中药物引起的发热

D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管、导管的感染引起的发热

【答案】：B

109、患者女性,45岁。III度烧伤后行植皮术,大腿内侧供皮区消毒不可使用【单选题】——

A. 3%碘酊

B. 1:1000 苯扎溴铵酊

C. 0.5%PVP 碘

D. 1:1000 氯己定酊 70%乙醇

【答案】：A

110、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】——

A. 脑胶质瘤切除术

B. 肛瘘切除术

C. 胰十二指肠切除术

D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】：A

111、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

A. 注射相关疫苗

B. 全身使用广谱抗生素预防感染

C.

治疗局部感染病灶

- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

112、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好  
B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上  
C. 冷水时即放入计时  
D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】：C

113、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会  
B. 省医院感染管理专家咨询委员会  
C. 各级医院的医院感染管理委员会  
D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

114、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌  
B. 经产道感染的乙型肝炎  
C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数 8 个  
D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后 5 天发生的甲型肝炎

【答案】：B

115、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C.

各级医院的医院感染管理委员会

- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

116、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染  
B. 表皮传染病  
C. 呼吸道感染  
D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】：C

117、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播  
B. 接触传播  
C. 经呼吸道飞沫传播  
D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】：C

118、属半污染区的区域是【单选题】——

- A. 治疗室. 值班室  
B. 走廊及病区化验室  
C. 配餐室与更衣室  
D. 浴室. 洗涤间 病室及厕所

【答案】：B

119、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染  
B. 医源性感染  
C. 自身感染  
D. 带入感染 以上都不是

【答案】：D

120、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

121、层流洁净病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：A

122、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

- A. 潴留导尿持续1周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】：E

123、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

124、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变
- B.



宿主的局部或全身免疫功能下降

- C. 菌群失调和二重感染
- D. 通过空气或水源的感染      潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】：D

125、下列情况属于医院感染【单选题】——

- A. 住院中由于治疗措施而激活的感染
- B. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如CMV,弓形虫发生在出生后48小时以内者
- D. 由于输注苏打外渗引起的局部炎症      由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症

【答案】：A

126、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶      疫苗注射

【答案】：B

127、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医院填报病例
- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例      专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

128、属于低效消毒剂的是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B.

新洁尔灭

- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

129、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
- B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】：A

130、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

131、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

132、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/655310211332011204>