

健康评估试题库

考核比例：第一部分（基础知识）8%、第二部分（症状评估）20%、第三部分（身体评估）50%、第四部分（实验室检查）17%、第五部分（心电图检查）4%

第一部分 基础知识（包括绪论、健康评估的方法、健康资料与护理诊断）

一、A1/A2 型题

1、护理体检首先应进行（ ）

A、视诊检查 B、触诊检查 C、叩诊检查 D、听诊检查 E、嗅诊检查

2、下列做法不符合交谈原则的是（ ）

A、友好的称呼 B、时时打断与交谈无关的谈话 C、保持双目平视

D、适当的沉默 E、对前后矛盾的内容提出质疑

3、触诊可以补充（ ）

A、视诊所不能确定的体征 B、叩诊所不能确定的体征

C、听诊所不能确定的体征 D、嗅诊所不能确定的体征

E、问诊不能确定的体征

4、下列不属于既往史的内容是（ ）

A、传染病史 B、过敏史 C、烟酒嗜好 D、手术史 E、外伤史

5、护理程序正确的说法是（ ）

A、一种护理工作的分工类型 B、一种护理工作的简化形式

C、一种解决问题的方法 D、一种技术革新的程序

E、一种护理活动的循环过程

6、下列内容中，不属于问诊范围的是（ ）

A、一般资料 B、主诉 C、现病史 D、既往史 E、身体评估

7、护士获取客观健康资料的主要途径是（ ）

A、阅读病历及健康记录 B、病人家属的陈述 C、观察及体检获取

D、病人的抚养人提供 E、病人本人提供

8、对主诉的正确理解是（ ）

A、症状加持续时间 B、体征加持续时间 C、病名加持续时间

D、症状或体征加持续时间 E、最感痛苦的症状或体征

9、女性，45岁，卵巢囊肿，新入院。护士收集资料时，询问“您是否绝经了？”

这一提问属于（ ）

- A、间接提问 B、主动提问 C、开放式提问
D、闭合性提问 E、过渡性提问
- 10、诊断疾病最基本最重要的手段是（ ）
A、详细的问诊 B、全面体检 C、实验室检查 D、心电图检查
E、以上都是
12. 用于护理诊断陈述的 PES 式中的 E 表示（ ）
A. 问题 B. 原因 C. 症状 D. 体征 E. 检查结果
13. 建立良好的护患关系的桥梁是（ ）
A. 熟练的检查方法 B. 视诊 C. 身体评估 D. 诚恳的态度 E. 问诊
- 14、正确的问诊语言是（ ）
A. 您腹泻前是否有左下腹痛? B. 您大便有潜血吗?
C. 您腹泻时是否有里急后重感? D. 您除腹泻外是否还有其他不舒服?
E. 您是不是在情绪紧张时容易腹泻?
15. 下列哪种方法收集的资料是主观资料（ ）
A. 身体评估结果 B. 亲属提供的信息 C. 化验检查结果
D. X 线检查结果 E. 心电图报告
- 16、收集资料最重要的方法是（ ）
A、查阅病历 B、护理体检 C、观察 D、交谈 E、门诊资料
- 17、主观资料是指（ ）
A、患者的诉说 B、医生的判断 C、护士的判断
D、陪人的诉说 E、家人的诉说
- 18、最准确、最可靠的健康资料来源（ ）
A、患者 B、医生 C、护士 D、陪人 E、家属
- 19、交谈时最先向患者作（ ）
A、身体评估 B、了解病史 C、开放性提问
D、介绍医院 E、自我介绍
- 20、下列哪项不是护理诊断的类型（ ）
A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断
D、潜在并发症：心输出量减少 E、有皮肤完整性受损的危险
- 21、属于主观资料的是（ ）

- A、心悸 B、黄疸 C、发绀 D、心脏杂音 E、肺部罗音
- 22、进行健康史采集时，错误的是（ ）
- A、收集完毕及时记录 B、客观资料应避免护士的主观判断
C、主观资料护士不能带自己的判断 D、客观资料的记录尽量使用医学术语
E、主观资料的记录只能用患者自己的语言
- 23、一位护士与一位患者交谈的过程中，当患者谈到住院以来高额的费用时异常激动、不满。为了缓解患者的情绪，护士此时可采取的交谈技巧是（ ）
- A、倾听 B、核实 C、提问 D、阐释 E、沉默
- 24、患者女性，70岁。腹部手术后第3天，护士在观察病情时获得资料：患者的肠鸣音每分钟4次。护士运用了身体评估哪种方法（ ）
- A、视诊 B、触诊 C、叩诊 D、听诊 E、嗅诊
- 25、不利于抓住患者交谈内容的是（ ）
- A、从主诉开始引导话题 B、事先了解患者资料 C、随意提出新话题
D、解释患者的提问 E、准备交谈提纲
- 26、一位护士在与患者交谈过程中，希望了解更多患者对其疾病的真实感受和治理看法。最适合的交谈技巧是（ ）
- A、认真倾听 B、仔细核实 C、及时鼓励 D、封闭式提问 E、开放式提问
- 27、一护士在与一位胃溃疡患者交谈中，当患者说道“我今天早上大便颜色特别黑”时，护士问道：“你刚才说你大便怎么了？”此护士特别运用了交谈技巧中的（ ）
- A、耐心倾听 B、仔细核对 C、详细阐释
D、及时鼓励 E、封闭式提问
- 28、护士评估某患者时，发现其排出的尿液呈烂苹果味，该患者很可能是（ ）
- A、膀胱炎 B、尿道炎 C、前列腺炎
D、急性肾炎 E、糖尿病酸中毒
- 29、患者女性，38岁。患“胃溃疡”3年，现呕血600ml，心悸气促，脉搏细速。体检：精神萎靡，皮肤干燥。T36.5℃，P108次/min，R24次/min，BP80/60mmHg。属于主观资料的是（ ）
- A、皮肤干燥 B、心悸气促 C、精神萎靡 D、血压下降 E、T36.5℃
30. 护理体检的最终目的是（ ）

- A. 全面采集病人的资料 B. 纠正医生不妥的诊断 C. 解决病人的健康问题
D. 取得病人的信任 E. 结合病史做出医疗诊断
31. 护理病史采集中错误的做法是 ()
- A. 护士先做自我介绍 B. 询问病史时多问少听 C. 交谈中避免套问
D. 结束谈话时简单重复内容 E. 对患者的疑虑应作必要的指导
32. 采集护理病史时获得重要线索主要依靠 ()
- A. 全面的护理体检 B. 详细询问病史 C. 作血、尿、便常规检查
D. 仔细阅读门诊病历 E. 先进的医疗仪器检查
33. 患者，女性，因发热、胸痛、咳嗽 2 日入院。护理体检：体温 40℃，右下肺闻及湿性罗音。血白细胞计数 $12.0 \times 10^9/L$ 。入院诊断：发热待查：肺炎？该患者的护理诊断是 ()
- A. 发热待查 B. 肺炎 C. 体温过高 D. 肺部 E. 白细胞计数增高
34. 患者，女性，22 岁。因咳嗽、痰中带血 3 日，以“支扩”收入住院。今晨突然大咯血 500ml。该患者最主要的护理诊断是 ()
- A. 焦虑 B. 活动无耐力 C. 有窒息的危险
D. 知识缺乏 E. 有感染的危险
35. 患者，男性，68 岁。慢性肺气肿病史 30 多年，2 周前感冒后出现发热，咳嗽，咳大量粘液脓痰，近 3 天来咳嗽无力，痰液特粘，不易咳出，气急、发绀。该患者最主要的护理诊断是 ()
- A. 气体交换受损 B. 清理呼吸道无效 C. 有窒息的危险
D. 呼吸型态改变 E. 恐惧
36. 患者，女性，23 岁。受凉后出现高热、咳嗽、咳痰，诊断为肺炎。该病例的护理诊断是 ()
- A. 体温过高 B. 活动无耐力 C. 组织灌注量改变
D. 有窒息的危险 E. 营养失调：低于机体的需要量
37. 患者，男性，76 岁。慢性支气管炎 24 年，护士收集的资料中属于主观资料的是 ()
- A. 体温 38.7℃ B. 肺部听诊可闻及干湿性罗音 C. 呼吸运动减弱
D. 咳嗽、咳痰 E. 呼吸音粗糙
38. 为了保证交谈结果有效，交谈过程中，护理人员不应该采取的方式是 ()

- A. 澄清相关内容 B. 复述患者的内容 C. 对患者相关问题进行解析
D. 对患者的内容马上提出表示怀疑 E. 可以恰当的方式打断患者的叙述
39. 患者，女性，因咳嗽可叹注射青霉素治疗后，出现头晕、眼花、抽搐、面色苍白、呼吸急促、神志模糊，此时护士应立即（ ）
- A. 详细询问护理病史 B. 全面进行护理体检 C. 报告医师，配合抢救
D. 重点询问、对症护理 E. 做好各种标本采集准备
40. 有关护理病史采集的方法与技巧，不应采取的是（ ）
- A. 采集前先进行过渡性交谈 B. 一般先从家族史问起 C. 由简易问题开始
D. 避免使用医学术语 E. 避免逼问和套问
41. 不属于生活习惯与嗜好的内容是（ ）
- A. 起居情况 B. 个人卫生 C. 饮食规律 D. 烟酒嗜好 E. 经济条件
42. 既往史的内容包括（ ）
- A. 诊疗经过 B. 主要症状 C. 曾患疾病 D. 社会经历 E. 生活习惯
43. 护理病史采集的重点不包括（ ）
- A. 对医护的需求 B. 对疾病的认识 C. 对疾病的诊断
D. 日常生活习惯 E. 住院带来的问题
44. 护士收集资料成功的关键是（ ）
- A. 患者能说会道 B. 患者病情简单 C. 患者文化程度的高低
D. 取得患者的信任 E. 善于运用沟通技巧
45. 护理病史的主体部分是（ ）
- A. 主诉 B. 现病史 C. 既往史 D. 个人史 E. 家族史
46. 采集护理病史的时间宜在（ ）
- A. 入院即刻进行 B. 入院 24h 后 C. 入院 48h 后
D. 入院安排床位时 E. 入院安排就绪后
47. 对发热病人的询问，正确的是（ ）
- A. “发热前有寒颤吗？” B. “您除了发热还有哪里不舒服吗？”
C. “您体温上升都在下午吗？” D. “您发热时有无头痛？”
E. “您发热时有谵妄吗？”

二、A3/A4 型题

(1~2 题共用题干)

患者男性，76 岁。慢性支气管炎 24 年，自诉发热、咳嗽，咳黄色粘痰 5 天，自觉咳嗽无力，痰液粘稠不易咳出。吸烟 40 年，20 支/天，难以戒除。体检：精神萎靡，皮肤干燥，体温 38.7℃，肺部听诊可闻及干、湿性罗音。

1、属于主观资料的是 ()

A、皮肤干燥 B、痰液粘稠 C、体温 38.7℃

D、无力咳嗽 E、肺部干、湿性罗音

2、患者目前最主要的护理问题是 ()

A、清理呼吸道无效 B、体温异常 C、活动无耐力

D、知识缺乏 E、组织灌注量不足

(3~4 题共用题干)

患者，女，25 岁。淋雨后打喷嚏、咳嗽、鼻塞、流涕，开始为清水样，3 天后变稠，伴有咽痛。护理体检：扁桃体 II 度肿大，呼吸音粗。

3. 进行病史采集时，最适合的交谈技巧是 ()

A. 认真倾听 B. 仔细核实 C. 及时鼓励

D. 随意提出新话题 E. 开放式提问

4. 该病人的客观资料的是 ()

A. 咽痛 B. 咳嗽 C. 打喷嚏

D. 扁桃体肿大 E. 鼻塞

第一部分 基础知识

参考答案：

一、A1/A2 型题

1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. C 8. D 9. D 10. B 11. C 12. B 13. E

14. D 15. B 16. B 17. A 18. A 19. E 20. D 21. A 22. E 23. E 24. D 25. C

26. E 27. B 28. E 29. B 30. C 31. B 32. B 33. C 34. C 35. B 36. A

37. D 38. D 39. C 40. B 41. E 42. C 43. C 44. D 45. B 46. E 47. B

二、A3/A4 型题

1. D 2. A 3. A 4. D

第二部分 症状评估

一、A1/A2 型题

1. 体温持续在 39~40℃ 以上，数天或数周，24 小时以内波动范围不超过 1℃，称之为（ ）
A. 稽留热 B. 间歇热 C. 回归热 D. 弛张热 E. 波状热
2. 某发热病人出现寒战时，护士应考虑该病人的体温处于（ ）
A. 体温上升期 B. 高热持续期 C. 体温下降期 D. 间歇无热期
E. 用药物后期
3. 用很强的刺激不能唤醒患者，但有防御反应，各种生理反射存在，为（ ）
A. 谵妄 B. 昏迷 C. 嗜睡 D. 昏睡 E. 意识模糊
4. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是（ ）
A. 端坐呼吸 B. 鼻翼扇动 C. 哮鸣音 D. 呼吸加深加快 E. 三凹征
5. 大咯血是指 24h 咯血量在（ ）
A. 100ml 以上 B. 200ml 以上 C. 300ml 以上 D. 500ml 以上 E. 1000ml 以上
6. 皮肤粘膜可出现发绀时毛细血管内还原血红蛋白绝对含量超过（ ）
A. 100g/L B. 75g/L C. 50g/L D. 45g/L E. 30g/L
7. 呕吐大量暗红色血液最常见于（ ）
A. 急性胃炎 B. 急性胃粘膜病变 C. 胃底、食道静脉曲张破裂出血
D. 消化性溃疡并出血 E. 胃癌
8. 中老年患者，慢性上腹痛，无明显规律性，伴消瘦、呕血，应警惕（ ）
A. 慢性胃炎 B. 消化性溃疡 C. 胃癌 D. 肝硬化 E. 胆囊炎
9. 引起肝细胞性黄疸最常见的原因（ ）
A. 胆管结石 B. 胆道蛔虫病 C. 毛细胆管型病毒性肝炎
D. 原发性胆汁性肝硬化 E. 病毒性肝炎
10. 肾源性水肿最主要特点是（ ）
A. 水肿最先发生于颜面部 B. 水肿最先发生在下肢下垂部位
C. 水肿发展迅速 D. 常伴有高血压 E. 低蛋白血症
11. 先发热后昏迷可能不是（ ）
A. 脑出血 B. 中暑 C. 中毒性痢疾 D. 流行性脑脊髓膜炎 E. 结核性脑炎
12. 下列哪项是引起头痛的颅外病变（ ）

- A、脑膜炎 B、脑栓塞 C、脑震荡 D、蛛网膜下腔出血 E、颅骨肿瘤
- 13、40 岁以上长期吸烟者，咯血应考虑（ ）
- A、肺癌 B、支气管扩张 C、风心病二尖瓣狭窄 D、慢性支气管炎 E、肺结核
- 14、下列哪项体温是高热（ ）
- A. 38.1~39℃ B. 38.5~40℃ C. 39.1~40℃ D. 39.1~41℃ E. 41℃以上
- 15、深长而大的呼吸见于（ ）
- A、呼吸性酸中毒 B、代谢性酸中毒 C、呼吸性碱中毒 D、代谢性碱中毒
E、以上都不是
- 16、大叶性肺炎的典型热型为（ ）
- A.稽留热 B.弛张热 C.间歇热 D.回归热 E.波状热
- 17、肾源性水肿的特点是（ ）
- A.伴颈静脉怒张 B.伴低蛋白血症 C.首先出现在身体下垂部位
D.先消瘦，后水肿 E.伴肝大
- 18、夜间阵发性呼吸困难常见于（ ）
- A.胸腔积液 B.支气管哮喘 C.肺气肿
D.急性右心功能不全 E.急性左心功能不全
- 19、中心性发绀的特点是（ ）
- A.皮肤冰冷 B.加温发绀可消失 C.常出现在肢端、颜面
D.急骤出现 E.发绀部皮肤温暖
- 20、呕吐咖啡色液体最常见于（ ）
- A.急性胰腺炎 B.食管静脉曲张破裂出血 C.消化性溃疡
D.急性胃粘膜病变 E.胆囊炎
- 21、鲜红血便，不与粪便混合仅粘附于粪便表面，提示（ ）
- A.上消化道出血 B.肛门或肛管疾病出血 C.小肠出血
D.食管出血 E.十二指肠出血
- 22、全身黄染，粪便呈白陶土色，常见于（ ）
- A.溶血性黄疸 B.肝细胞性黄疸 C.先天性黄疸
D.阻塞性黄疸 E.生理性黄疸
- 23、下列哪一项不符合典型心绞痛的疼痛特点（ ）
- A.情绪激动时易发生 B.疼痛性质呈刀割样 C.疼痛位于胸骨后

- D. 疼痛可放射至左肩 E. 休息疼痛可缓减
- 24、以下哪种疾病发热最常见 ()
- A、肺炎 B、心肌梗死 C、风湿热 D、脑出血 E、肠梗阻
- 25、咳粉红色泡沫痰，应首先考虑 ()
- A、肺结核 B、肺脓肿 C、肺癌 D、急性肺水肿 E、肺梗塞
- 26、小量咯血是指 24 小时咯血量小于 ()
- A、100ml B、300ml C、500ml D、400ml E、>500ml
- 27、感染性发热最常见的病原体是()
- A. 细菌 B. 病毒 C. 真菌 D. 立克次体 E. 支原体
- 28、下列对体温的描述不正确的是()
- A、1 日内波动范围不超过 1℃ B、口温一般在 37℃以上 C、肛温比口温高
- D、腋温 37.8℃为低热 E、腋温 40℃为高热
- 29、下列哪项不是引起头痛的颅内病变 ()
- A. 脑膜炎 B. 脑血栓形成 C. 颅底骨折 D. 颅内占位性病变 E. 脑震荡
- 31、左心功能不全时出现呼吸困难主要是由于 ()
- A. 体循环淤血 B. 腹水 C. 肺淤血水肿 D. 精神紧张 E. 膈肌活动障碍
- 32、下列病因中，引起干咳无痰的是 ()
- A. 肺炎 B. 急性气管炎 C. 重症肺结核 D. 胸膜炎 E. 支气管扩张
- 33、下列各项支持呕血的是 ()
- A. 有心脏病史 B. 有胸闷喉痒史 C. 经口腔排出
- D. 颜色鲜红 E. 混有食物残渣
34. 吸气性呼吸困难常见于 ()
- A. 支气管哮喘 B. 喉头水肿 C. 重症肺炎
- D. 喘息性慢支炎 E. 慢性阻塞性肺气肿
35. 呕吐伴腹泻多见于 ()
- A. 肠梗阻 B. 急性肝炎 C. 急性胃肠炎 D. 急性肾盂肾炎 E. 腹膜炎
- 36、长期腹泻，明显消瘦，腹部发现包块，可见于 ()
- A. 结肠癌 B. 胃肠炎 C. 阿米巴痢疾 D. 细菌性食物中毒 E. 溃疡性结肠炎
- 37、当血中高铁血红蛋白量达到多少可出现紫绀 ()
- A. 50g/L B. 40g/L C. 30g/L D. 20g/L E. 10g/L

- 38、下列哪种疾病出现发绀不是肺性发绀（ ）
- A. 阻塞性肺气肿 B. 气胸 C. 肺水肿 D. 弥漫性肺间质纤维化 E. 严重休克
- 39、最轻微的意识障碍是（ ）
- A、嗜睡 B、意识模糊 C、谵妄 D、昏睡 E、昏迷
- 40、小量咯血是指 24 小时咯血量小于（ ）
- A、100ml B、200ml C、300ml D、400ml E、500ml
- 41、呕血提示胃内积血量至少有（ ）
- A. 100~150ml B. 200~250ml C. 250~300ml D. 350~400ml E. 400~450ml
- 42、男，28 岁。车祸外伤后处于沉睡状态，不易被唤醒，仅在护士给其静脉输液扎针时苏醒片刻，但答非所问，很快又入睡。意识状态应评估为（ ）
- A、意识模糊 B、谵妄 C、昏睡 D、嗜睡 E、浅昏迷
- 43、属于非感染性发热的是（ ）
- A. 伤寒 B. 疟疾 C. 风湿热 D. 肺炎 E. 败血症
- 44、患者体温在 39℃ 以上，24 小时内波动范围超过 2℃，但都在正常水平以上，该患者的热型为（ ）
- A、波状热 B、间歇热 C、不规则热 D、弛张热 E、回归热
- 45、全身性水肿见于（ ）
- A. 肾小球肾炎 B. 蜂窝织炎 C. 药物过敏
D. 血栓性静脉炎 E. 上腔静脉阻塞综合征
- 46、下列哪项可出现呼气性呼吸困难（ ）
- A. 喉痉挛 B. 胸腔积液 C. 支气管哮喘 D. 气管异物 E. 白喉
- 47、周围性发绀见于（ ）
- A. 阻塞性肺气肿 B. 气胸 C. 肺水肿 D. 肺炎 E. 严重休克
- 48、呕吐伴眩晕、眼球震颤者，应考虑（ ）
- A. 急性胃肠炎 B. 前庭器官疾病 C. 脑炎 D. 尿毒症 E. 脑出血
- 49、急性腹泻的病程一般在（ ）
- A. 1 周以内 B. 3 周以内 C. 1 月以内 D. 2 月以内 E. 3 月以内
- 50、处于熟睡状态不易唤醒，虽在强烈刺激下可被唤醒，但很快又入睡，醒时答话含糊或答非所问是指（ ）
- A .嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 昏迷 E. 谵妄

- 51、对心源性水肿描述不准确的是（ ）
- A. 常伴肝大 B. 常伴颈静脉怒张 C. 常伴门静脉高压
D. 严重时出现胸腹水 E. 常伴低蛋白血症
- 52、依发热的分度，中等度发热是（ ）
- A、39.1~41℃ B、38.1~39℃ C、37.2~38℃ D、>41℃ E、39~40℃
- 53、吞咽食物使胸骨后疼痛加剧可能是（ ）
- A. 反流性食管炎 B. 心包炎 C. 心肌炎 D. 心绞痛 E. 右心衰
- 54、引起咯血最常见的心脏疾病是（ ）
- A、风湿性心脏病二尖瓣狭窄 B、心包炎 C、心肌梗死
D、肺心病 E、心肌炎
- 55、发热最常见的原因是（ ）
- A. 无菌性坏死性物质吸收 B. 变态反应 C. 自主神经功能紊乱
D. 病原体感染 E. 体温调节中枢功能失调
- 56、某男性患者畏寒发热一周，每天体温最高达 40℃左右，最低温度 37.8℃左右，试问该热型属于（ ）
- A. 稽留热 B. 间歇热 C. 弛张热 D. 回归热 E. 波状热
- 57、剧咳时突然发生剧烈胸痛伴呼吸困难常见于（ ）
- A. 肺炎球菌性肺炎 B. 心绞痛 C. 急性心肌梗塞
D. 急性左心衰 E. 自发性气胸
- 58、下列哪项可引起局部水肿（ ）
- A. 肝硬化 B. 丝虫病 C. 右心衰竭 D. 营养不良 E. 肾病综合征
- 59、金属音调咳嗽见于（ ）
- A. 声带炎 B. 喉癌 C. 纵隔肿瘤 D. 支气管扩张 E. 百日咳
- 60、病理性的持续睡眠状态，可被唤醒，并能准确回答题目属于（ ）
- A. 嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 昏迷 E. 谵妄
- 61、已婚妇女晨起呕吐伴停经应注意（ ）
- A. 盆腔炎 B. 早孕 C. 慢性肝炎 D. 肾结石 E. 肠梗阻
- 62、慢性腹泻的病程至少应在多少以上（ ）
- A. 1个月 B. 3个月 C. 4个月 D. 2个月 E. 5个月
- 63、下列胸痛描述中哪一项不正确（ ）

- A. 带状疱疹呈刀割样痛或灼痛
B. 心绞痛呈压榨样痛
C. 自发性气胸于用力后突发剧痛
D. 胸膜炎的胸痛可随咳嗽而加剧
E. 心绞痛含服硝酸甘油无效
- 64、女，45岁，因发热3天入院。首先对其采取的评估方法为（ ）
A. 交谈 B. 测试体温 C. 身体评估 D. 实验室检查 E. 查阅病历
- 65、疼痛位于脐与右髂前上棘连线的中外1/3的交点可能是（ ）
A. 盆腔炎 B. 阑尾炎 C. 小肠炎 D. 胃炎 E. 乙状结肠炎
- 67、瞳孔大小不等常见于（ ）
A. 有机磷中毒 B. 青光眼 C. 濒死状态 D. 脑疝形成 E. 阿托品中毒
- 68、左心功能不全最早最常见的症状是（ ）
A. 三凹征 B. 劳力性呼吸困难 C. 端坐呼吸困难 D. 心源性哮喘 E. 下肢水肿
- 69、浅昏迷和深昏迷的主要区别为（ ）
A. 有无自主运动 B. 角膜反射及防御反射是否存在
C. 对声、光刺激的反应 D. 有无大、小便失禁 E. 能否被唤醒
- 70、下列表现中不属于深昏迷的是（ ）
A. 呼吸不规则，血压下降 B. 大小便失禁 C. 对外界刺激无反应
D. 压迫眶上神经可出现痛苦表情 E. 全身肌肉松弛
- 71、女性，22岁，呼吸不规则，血压9.3/5.3KPa，大小便失禁，两侧瞳孔扩大，角膜反射消失，对针刺无反应，其意识状态是（ ）
A. 嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 深昏迷 E. 浅昏迷
- 73、病人出现角膜反射消失时，其意识障碍的程度为（ ）
A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊
- 74、造成谵妄的原因是（ ）
A. 脑部急性出血 B. 迷走神经兴奋性增高
C. 大脑细胞发生器质性改变 D. 中枢神经系统严重抑制
E. 中枢神经系统发生急性功能失调
- 75、患者出现谵妄时表现（ ）
A. 语言增多 B. 易激动 C. 朦胧状态 D. 感觉迟钝 E. 语无伦次
- 76、患者意识模糊伴知觉障碍，精神运动性兴奋，定向力消失，意识障碍属于（ ）
A. 谵妄状态 B. 昏睡状态 C. 意识模糊

D、嗜睡状 E、浅昏迷状态

77、嗜睡与昏睡的主要鉴别点（ ）

A、是否可被唤醒 B、对外界的反应性是否存在 C、反射是否存在

D、醒后回答问题是否正确 E、意识是否模糊

78、患者女性，30岁。体温持续升高达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，持续数日，24小时波动不超过 1°C ，属于（ ）

A、弛张热 B、稽留热 C、间歇热 D、不规则热 E、超高热

79、患者男性，30岁。体温持续升高达 39°C 以上，但波动幅度大，24小时波动超过体温持续升高达 1°C ，最低体温仍然超过正常水平，属于（ ）

A、弛张热 B、稽留热 C、间歇热 D、不规则热 E、波状热

80、患者男性，28岁。伤寒，持续高热5天，每晨8时 $T39.0^{\circ}\text{C}$ 左右，下午4时 $T39.6^{\circ}\text{C}$ 左右，此热型符合（ ）

A、弛张热 B、稽留热 C、间歇热 D、不规则热 E、波状热

81、患者男性，68岁，患尿毒症，护士查房时发现患者表情淡漠，反应迟钝，此种表现是（ ）

A. 嗜睡 B. 谵妄 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊

82、患者男性，37岁，出差感染了疟疾，发作时明显寒战，全身发抖，面色苍白，口唇发绀，寒战持续约10分钟，体温骤升至 40°C ，面色潮红，皮肤干热，烦躁不安，持续约3小时，体温又骤降至正常。经过几天的间歇期后，又再次发作，此患者发热的热型是（ ）

A、弛张热 B、稽留热 C、间歇热

D、不规则热 E、波状热

83. 患者男性，30岁。体温持续升高达 39°C 以上，护理体检时，患者通常表现为（ ）

A. 血压下降 B. 四肢湿冷 C. 大量出汗 D. 颜面潮红 E. 尿量增多

84. 患者，男性，58岁。肺炎入院4日。体温 39.5°C ，思维和语言不连贯，并躁动不安。此现象为（ ）

A. 精神错乱 B. 谵妄 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊

85. 患者，男，38岁，消化性溃疡多年。今作大便隐血试验检查，结果为阳性，提示该患者24小时消化道出血量至少（ ）

- A. 5mm1 以上 B. 10ml 以上 C. 30ml 以上 D. 50ml 以上 E. 70ml 以上
86. 急性腹泻最常见的病因是 ()
- A. 肠道肿瘤 B. 肝硬化 C. 结肠过敏 D. 慢性肝炎 E. 急性传染病
87. 患者, 男性, 50 岁。肝硬化病史 5 年, 今日因“呕血 800ml”入院。护理体检: 面色苍白, 精神萎靡, 体温 37.7℃, 脉搏 118 次/分, 呼吸 22 次/分, 血压 80/50mmHg。该患者目前最主要的护理问题是 ()
- A. 体温过高 B. 恐惧 C. 活动无耐力 D. 体液不足 E. 有受伤的危险
88. 吸气性呼吸困难的发生机制是 ()
- A. 大气道狭窄梗阻 B. 肺部病变广泛致呼吸面积减少 C. 血管床减少
D. 上呼吸道异物刺激 E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
89. 患者, 女性, 62 岁, 因脑梗塞入院。对声、光等刺激毫无反应, 仅护士在输液穿刺时患者能醒。该患者的意识属于 ()
- A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊
90. 某患者入院后, 护士在病情观察时发现患者两侧瞳孔散大并有对光反射消失, 应考虑 ()
- A. 颅内出血 B. 视神经萎缩 C. 有机磷中毒
D. 深昏迷状态 E. 濒死状态
91. 患者男性, 28 岁。诊断为“疟疾”。发热时体温可骤然升高到 39℃ 以上, 然后很快降至正常, 2 天后再次发作, 属于 ()
- A. 弛张热 B. 稽留热 C. 间歇热 D. 不规则热 E. 波状热
92. 护士在给某病人输液治疗过程中突然出现咳粉红色泡沫痰, 应考虑 ()
- A. 肺栓塞 B. 急性肺水肿 C. 支气管扩张 D. 肺血管破裂 E. 自发性气胸
93. 关于体温的论述下列哪项正确 ()
- A. 体温低于 36.5℃ 称体温过低 B. 甲状腺功能亢进病人常有体温过低
C. 体温高于 37.5℃ 称发热 D. 无菌性炎症一般无发热
E. 慢性消耗性疾病病人常有体温升高
94. 发作性呼气性呼吸困难见于 ()
- A. 肺不张 B. 胸膜黏连 C. 支气管扩张 D. 支气管异物 E. 支气管哮喘
95. 尿液呈酱油色见于 ()
- A. 阻塞性黄疸 B. 急性溶血 C. 肝细胞性黄疸 D. 肾脏肿瘤

E. 晚期丝虫病

96. 下列症状中不属于意识模糊的是 ()

- A. 语无伦次躁动 B. 答话简短迟钝 C. 定向力障碍 D. 表情淡漠
E. 对周围环境漠不关心

97. 浅昏迷和深昏迷的主要区别为 ()

- A. 有无自主运动 B. 角膜反射及防御反射是否存在
C. 对声、光刺激的反应 D. 有无大、小便失禁 E. 能否被唤醒

98. 下列表现中不属于深昏迷的是 ()

- A. 呼吸不规则, 血压下降 B. 大小便失禁 C. 对外界刺激无反应
D. 压迫眶上神经可出现痛苦表情 E. 全身肌肉松弛

99. 发热时脉搏增快是由于 ()

- A. 机体代谢率增快 B. 机体代谢率降低 C. 心肌收缩力减弱
D. 心肌收缩力增强 E. 心输出量降低

100. 上消化道出血病人的粪便可呈 ()

- A. 脓血样 B. 果酱样 C. 米泔水样 D. 柏油样 E. 白陶土样

101. 紫癜与充血性皮疹的特征性区别是 ()

- A. 直径大小 B. 是否高出皮肤 C. 颜色深浅 D. 指压是否褪色
E. 表面光亮度

102. 病人出现角膜反射消失时, 其意识障碍的程度为 ()

- A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊

103. 造成谵妄的原因是 ()

- A. 脑部急性出血 B. 迷走神经兴奋性增高 C. 大脑细胞发生器质性改变
D. 中枢神经系统严重抑制 E. 中枢神经系统发生急性功能失调

104. 患者出现谵妄时表现 ()

- A. 语言增多 B. 易激动 C. 朦胧状态 D. 感觉迟钝 E. 语无伦次

105. 呕吐物内除消化液和食物外, 混有大量胆汁时, 可呈 ()

- A. 黄绿色 B. 鲜红色 C. 腐臭味 D. 咖啡色 E. 暗红色

106. 正常成人 24h 尿量为 ()

- A. 400~600ml B. 500~1000ml C. 800~1200ml
D. 1000~2000ml E. 3000~5000ml

107. 少尿是指 24h 尿量少于 ()
A. 100ml B. 400ml C. 600ml D. 1000ml E. 1500ml
108. 下列哪项不是膀胱炎的症状 ()
A. 尿频 B. 尿急 C. 尿痛 D. 尿少 E. 陈尿有氨臭味
109. 病人痰液有恶臭味, 判定为何种细菌感染 ()
A. 病毒 B. 绿脓杆菌 C. 厌氧菌 D. 霉菌 E. 化脓菌
110. 听到病人带金属音的咳嗽时应警惕 ()
A. 喉炎 B. 肺脓肿 C. 肺癌 D. 哮喘 E. 肺炎
111. 某男性病人, 因急性脑出血入院两天, 连续睡眠 19 小时, 期间呼之能醒, 可进行简单对话, 过后很快又入睡, 此时病人处于 ()
A. 昏迷状态 B. 昏睡状态 C. 意识模糊状态
D. 嗜睡状态 E. 清醒状态

二、A3/A4 型题:

(1~3 题共用题干)

杨先生, 36 岁, 咳嗽、咳痰伴午后低热、乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻已 3 个月, 今晨患者一次咯出鲜红色血液约 400ml 急诊入院。

1. 此病人最可能的诊断是 ()
A. 慢性支气管炎 B. 支气管扩张症 C. 支气管肺癌
D. 肺结核 E. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
2. 此病人最易发生且危险的并发症是 ()
A. 继发感染 B. 肺不张 C. 失血性休克 D. 营养不良 E. 窒息
3. 此病人咯血为 ()
A. 小咯血 B. 中等咯血 C. 大咯血 D. 特大咯血 E. 不能确定

(4~6 题共用题干)

李先生, 患肝硬化已 4 年, 3 天前饮酒后突然大量呕血, 且神志恍惚, 四肢湿冷, 血压下降。入院后经积极治疗, 现病情稳定, 出血已停止。

4. 判断病人的出血量约为 ()
A. 500ml B. 600ml C. 700ml D. 800ml E. 1000ml 以上
5. 病人不可能出现 ()

A. 发热 B. 黑粪 C. 脉搏细数 D. 血红蛋白量减少 E. 血尿素氮低于正常

6. 出血停止的指征是 ()

A. 口渴 B. 尿少 C. 肠鸣音亢进 D. 血压正常稳定 E. 红细胞数明显增加

(7~9 题共用题干)

患儿, 7 岁, 因进食新鲜蚕豆后, 出现寒战、高热、头痛、呕吐、全身酸痛, 排酱油色尿液, 皮肤黄染, 血清总胆红素升高, 非结合胆红素升高, 结合胆红素正常。

7. 此患儿的黄疸属于 ()

A. 生理性黄疸 B. 先天性黄疸 C. 溶血性黄疸 D. 肝细胞性黄疸 E. 阻塞性黄疸

8. 对患儿进行护理评估时最该注意的问题是 ()

A. 注意黄疸的程度 B. 注意黄疸的病因 C. 注意相关病史

D. 注意伴随症状 E. 注意身心反应

9. 对黄疸的观察最好的部位是 ()

A. 腹部皮肤 B. 眼结膜 C. 手掌 D. 巩膜 E. 颜面部

(10~12 题共用题干)

女性患者, 60 岁, 有高血压病史 10 余年, 于劳动中突感剧烈头痛, 迅即出现意识障碍, 对声光刺激无 , 对疼痛刺激有防御 , 瞳孔大小正常, 对光反射存在, 呼吸深沉而有鼾音。

10. 其意识障碍的程度为 ()

A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 轻度昏迷 D. 中度昏迷 E. 重度昏迷

11. 其可能的病因是 ()

A. 脑膜炎 B. 脑出血 C. 脑梗死 D. 脑肿瘤 E. 脑外伤

12. 该患者 GCS 评分为 ()

A. 14~15 分 B. 8~13 分 C. 5~7 分 D. 3~5 分 E. <3 分

第二部分 症状评估

参考答案:

一、A1/A2 型题

1. A 2. A 3. B 4. E 5. D 6. C 7. D 8. C 9. E 10. A 11. A 12. E 13. A 14. D
15. B 16. A 17. B 18. E 19. E 20. C 21. B 22. D 23. B 24. A 25. D
26. A 27. A 28. B 29. C 30. D 31. C 32. D 33. E 34. B 35. C 36. A
37. C 38. E 39. A 40. A 41. C 42. C 43. C 44. D 45. A 46. C 47. E
48. B 49. C 50. C 51. E 52. B 53. A 54. A 55. D 56. C 57. E 58. B
59. C 60. A 61. B 62. D 63. E 64. B 65. B 66. A 67. D 68. B 69. B
70. D 71. D 72. C 73. D 74. E 75. E 76. A 77. D 78. B 79. A 80. B
81. E 82. C 83. D 84. E 85. A 86. E 87. D 88. A 89. B 90. E 91. C
92. B 93. C 94. E 95. B 96. B 97. B 98. D 99. A 100. D 101. D 102. D
103. E 104. E 105. A 106. D 107. B 108. D 109. C 110. C 111. D

二、A3/A4 型题

1. D 2. E 3. C 4. E 5. E 6. D 7. C 8. B 9. D 10. C 11. B 12. C

第三部分 身体评估

一、A1/A2 型题

- 1、正常人体体温（腋温）为（ ）
A、36.3~37.2℃ B、36~37℃ C、36.5~37.5℃ D、36.2~37.2℃ E、36~37.5℃
- 2、在检查淋巴结肿大时，首先应注意弄清楚（ ）
A、有无红肿、粘连 B、数量、大小 C、原发病灶 D、有无压痛 E、有无坏死
- 3、肺气肿患者的胸廓前后径与左右径的比例约为（ ）
A、1:2 B、1:1 C、1:2.5 D、1:1.5 E、2:1
- 4、正常成年人呼吸频率一般为（ ）
A、14~18 次/分钟 B、16~24 次/分钟 C、12~20 次/分钟
D、16~20 次/分钟 E、16~22 次/分钟
- 5、下列哪种疾病可出现急性腹痛（ ）
A、胃、十二指肠溃疡 B、肝炎 C、慢性胃炎 D、肠梗阻 E、反流性食管炎
- 6、靴形心脏常见于（ ）
A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、肺动脉瓣狭窄
D、主动脉瓣狭窄 E、主动脉瓣关闭不全
- 7、Louis 角是指下列哪个部位（ ）
A、腹上角 B、胸骨角 C、胸骨柄 D、胸骨体 E、胸骨下角
- 8、深反射不包括（ ）
A、肱二头肌反射 B、肱三头肌反射 C、桡骨膜反射 D、跖反射 E、膝反射
- 9、女，35 岁，咯血 4 天入院，面色晦暗，双颊暗红，口唇发绀，其病因首先考虑：（ ）
A、白血病 B、肺结核 C、风湿性二尖瓣狭窄 D、支气管扩张 E、再生障碍性贫血

- 10、对皮肤弹性的评估常取下列哪个部位（ ）
- A、两颊 B、腹部 C、手背或上臂内侧 D、上臂外侧 E、前臂内侧
- 11、反跳痛主要出现于（ ）
- A、腹腔内炎症累及壁腹膜 B、结核性腹膜炎 C、肠结核
D、腹腔内肿瘤 E、肝硬化腹水
- 12、WHO 确定成人高血压诊断标准为（ ）
- A、收缩压 $>140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $>90\text{mmHg}$
B、收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ ，舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
C、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
D、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$
E、收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- 13、男，55 岁，排尿缓慢两年，加重 1 个月，无浮肿，查体：下腹膨隆，叩诊浊音，浊音区不随体位改变，下列哪项诊断可能性大（ ）
- A、肝硬化腹水 B、结核性腹膜炎 C、肝硬化癌变
D、尿潴留 E、化脓性阑尾炎
14. 检查肝、脾、肾时应采用何种触诊方法（ ）
- A、浅部触诊法 B、滑行触诊法 C、双手触诊法
D、深压触诊法 E、冲击触诊
15. 正常人右锁骨中线第二肋间的叩诊音为（ ）
- A、清音 B、浊音 C、实音 D、鼓音 E、过清音
16. 正常心尖搏动位置在（ ）
- A. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 0.5~1cm 处
B. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 0.5~1cm 处
C. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 1.5~2.0cm 处
D. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 1.5~2.0cm 处
E. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 2.0~2.5cm
17. 测量下肢血压时，患者应采取（ ）
- A. 坐位 B. 立位 C. 仰卧位 D. 侧卧位 E. 俯卧位
18. 胸骨右缘第二肋间听诊区为（ ）
- A. 二尖瓣听诊区 B. 三尖瓣听诊区 C. 肺动脉瓣听诊区 D. 主动

脉瓣听诊区 E. 主动脉瓣第二听诊区

19、心、肺功能不全者常采取的体位是 ()

A、强迫蹲位 B、强迫侧卧位 C、强迫坐位 D、强迫站位 E、强迫侧卧位

20、判断营养状态最简单而迅速的方法是观察 ()

A、皮肤弹性 B、毛发稀疏程度 C、皮下脂肪充实程度

D、肌肉发育情况 E、指甲光泽度

21、桶状胸常见于 ()

A、肺结核 B、风心病 C、佝偻病 D、发育畸形 E、肺气肿

22、正常成年人静息状态下，呼吸与脉搏之比为 ()

A、1: 10 B、1: 8 C、1: 5 D、1: 4 E、1: 1

23、女，70岁，有慢性支气管炎和冠心病史，夜间突然憋醒，呼吸困难，咯粉红色泡沫痰可能为 ()

A、慢性支气管炎急性发作 B、急性左心衰竭 C、支气管哮喘

D、急性胃炎 E、有机磷中毒

24、梨形心脏常见于 ()

A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、肺动脉瓣狭窄

D、主动脉瓣狭窄 E、主动脉瓣关闭不全

25、腹壁揉面感多见于 ()

A、胃肠穿孔 B、肝脾破裂 C、急性胆囊炎 D、结核性腹膜炎 E、急性胰腺炎

26、浅反射不包括 ()

A、角膜反射 B、腹壁反射 C、桡骨膜反射 D、跖反射 E、提睾反射

27、扁桃体超过咽腭弓而未达咽后壁中线者为 ()

A、I度肿大 B、II度肿大 C、III度肿大

D、IV度肿大 E、正常

28、男，60岁，自己发现左锁骨上有一鸡蛋大小的无痛性肿块，质地坚硬。首先考虑 ()

A、乳癌 B、肺癌 C、胃癌 D、鼻咽癌 E、骨肉瘤

29、分析心脏杂音时不包括的内容是 ()

A、最响部位 B、时期和性质 C、强度和传导方向

D、杂音与体位、运动、呼吸的关系 E、杂音的发生机理

- 30、有关反跳痛描述错误的是（ ）
- A、壁层腹膜受炎症累及 B、脏层腹膜受炎症累及
C、反跳痛是腹膜刺激征之一 D、多见于腹内脏器病变累及邻近腹膜
E、可见于急性性腹膜炎
- 31、女，38岁。因急性上腹痛6小时入院。查体：脐与右髂前上棘连线的中、外1/3交界处有压痛。首先考虑（ ）
- A、胆石症 B、右侧输尿管结石 C、右侧卵巢囊肿
D、十二指肠溃疡穿孔 E、急性阑尾炎
- 32、正常胸部不会产生哪种叩诊音（ ）
- A、清音 B、浊音 C、实音 D、过清音 E、鼓音
- 33、正常人瞳孔的直径为（ ）
- A、1~2mm B、2~3mm C、3~4mm D、4~5mm E、5~6mm
- 34、呼吸过速是指呼吸频率超过（ ）
- A. 16次/min B. 18次/min C. 20次/min D. 22次/min E. 24次/min
- 35、肠鸣音正常是指（ ）
- A. 2~3次/min B. 4~5次/min C. 7~8次/min
D. 5~10次/min E. 10次/min以上
- 36、浅反射不包括（ ）
- A. 角膜反射 B. 腹壁反射 C. 提睾反射 D. 跖反射 E. 膝腱反射
- 37、正常人通常能听到几个心音（ ）
- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 E. 5个
- 38、面颊潮红、呼吸急促，烦躁不安，痛苦呻吟为（ ）
- A、病危面容 B、慢性面额 C、甲亢面容 D、急性面容 E、二尖瓣面容
- 39、正常人体不可能出现的叩诊音是（ ）
- A、清音 B、鼓音 C、实音 D、浊音 E、过清音
- 40、下列疾病可出现颈静脉怒张，除了（ ）
- A、右心衰竭 B、心包积液 C、缩窄性心包炎
D、左心衰竭 E、上腔静脉阻塞综合征
- 41、正常成年人呼吸频率一般为（ ）
- A、18次/分钟 B、24次/分钟 C、12次/分钟 D、>24次/分钟 E、<12次/分钟

- 42、正常心尖搏动位于()
- A、胸骨左缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
B、胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
C、胸骨左缘第 6 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
D、胸骨右缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
E、胸骨右缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
- 43、主动脉瓣听诊区闻及收缩期喷射样杂音，向颈部传导，应考虑()
- A、风湿性主动脉瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、二尖瓣关闭不全
D、主动脉瓣狭窄 E、室间隔缺损
- 44、局限性右下腹肌紧张见于()
- A、急性胰腺炎 B、急性胆囊炎 C、胃肠穿孔 D、盆腔脏器炎症
E、急性阑尾炎
- 45、下列哪个体征为深反射()
- A、巴宾斯基征 B、奥本海姆征 C、戈登征 D、膝腱反射 E、布鲁金斯基征
- 46、濒死状态的瞳孔表现为()
- A、缩小 B、扩大 C、大小不等 D、双侧缩小伴对光反射消失
E、双侧散大伴对光反射迟钝
- 47、男，62 岁，查体：心尖搏动于左侧第 6 肋间锁骨中线外 1.5cm 处，呈抬举感，提示()
- A、右心房扩大 B、左心室肥大 C、右心室肥大
D、左心房扩大 E、心包积液
- 48、肝脏触诊注意事项()
- A、大小 B、质地 C、表面及边缘形态 D、压痛 E、以上都是
- 49、男，52 岁。因食欲不振、腹胀、双下肢水肿 2 周入院。查体：双下肢水肿，腹部膨隆，移动性浊音阳性，肝右肋下 1cm，质韧，表面有结节。下列哪种情况可能性大()
- A、肝硬化腹水 B、急性腹膜炎 C、肾性水肿 D、心源性水肿 E、营养不良
50. 主动脉瓣第二听诊区位于()
- A、心尖区 B、胸骨右缘第二肋间 C、胸骨左缘第二肋间
D、胸骨左缘第三、四肋间 E、剑突下偏左偏右

51. 患者不能自己调整或变换肢体的位置是 ()
- A、自动体位 B、被动体位 C、强迫体位
D、强迫仰卧位 E、强迫侧卧位
52. 女, 45 岁, 因发热 3 天入院。首先对其采取的评估方法为 ()
- A. 交谈 B. 测试体温 C 身体评估
D. 实验室检查 E. 查阅病历
53. 视诊要求在那种光线下进行 ()
- A. 强光 B. 避光 C. 紫光 D. 白炽灯 E. 自然光
54. 气管移向右侧见于 ()
- A、右侧气胸 B、右侧胸腔积液 C、左侧肺不张 D、右侧肺不张 E、左侧肺炎
55. 胸骨压痛常见于 ()
- A、胸腔积液 B、白血病 C、气胸 D、再生障碍性贫血 E、气管内异物
56. 正常成年人呼吸频率一般为 ()
- A、18 次/分钟 B、24 次/分钟 C、12 次/分钟 D、>24 次/分钟 E、
<12 次/分钟
57. 正常心尖搏动位于 ()
- A、胸骨左缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
B、胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
C、胸骨左缘第 6 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
D、胸骨右缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
E、胸骨右缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
58. 正常成人 heart rate 为 ()
- A、50~100 次 / min B、60~100 次 / min C、50~110 次 / min
D、60~120 次 / min E、80~120 次 / min
59. 关于腹反跳痛不正确的是 ()
- A、腹部检查时出现压痛后手指原地不动 B、腹部出现压痛后片刻迅速抬手
C、当突然抬手时腹膜被牵拉引起疼痛 D、阳性说明腹膜壁层已受累及
E、见于急性腹膜炎
60. 下列哪个属于病理反射 ()
- A、肱二头肌反射 B、巴宾斯基征 C、桡骨膜反射 D、跖反射 E、膝反射

- 61、浅昏迷和深昏迷最主要鉴别点是()
- A、有无自主呼吸 B、对声光刺激的反应 C、有无二便失禁 D、能否被唤醒
E、角膜反射，瞳孔对光反射及防御反射是否存在
- 62、贫血病人，较可靠的评估部位是()
- A. 手掌皮肤和睑结膜 B. 颈部皮肤和舌面 C. 耳廓皮肤和上腭粘膜
D. 面颊皮肤及上腭粘膜 E. 手背皮肤及鼻腔粘膜
- 63、女，38岁，心脏叩诊左侧第3肋间心浊音界扩大，心界呈梨形，应考虑为()
- A、主动脉关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、心包积液
D、高血压性心脏病 E、二尖瓣关闭不全
- 64、典型机械性肠梗阻病人，肠鸣音常被描述为()
- A、减弱 B、消失 C、活跃 D、亢进 E、正常
65. 触诊对全身的哪个部位的检查更重要()
- A、颈部 B、腹部 C、胸部 D、皮肤 E、四肢脊柱
66. 确定第一心音最有价值的是()
- A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低
D、与心尖搏动同时出现 E、音响较强
67. 临床上最轻易观察发绀的部位()
- A. 眼眶 B. 面颊 C. 肢端 D. 口唇 E. 耳廓
68. 用来衡量心界增大与否与增大程度常用的垂直标志线为()
- A. 前正中线 B. 锁骨中线 C. 胸骨线 D. 胸骨旁线 E. 腋前线
69. 检查心脏震颤常用()
- A. 全手掌 B. 食指、中指指腹 C. 食指、中指指尖 D. 手掌桡侧 E. 手掌尺侧
70. 移动性浊音阳性，提示腹水量超过()
- A. 200ml B. 500ml C. 1000ml D. 1500ml E. 2000ml
- 71、确定扁桃体 I 肿大还是 II 肿大的界限是()
- A、舌腭弓 B、咽腭弓 C、咽后壁正中线 D、悬雍垂 E、以上都不是
- 72、一位 45 岁女性，一侧乳房皮肤局部呈橘皮样，乳头内陷，可能为()
- A、乳腺炎 B、乳腺小叶增生 C、乳腺囊肿 D、乳腺癌 E、以上都不是
- 73、肠鸣音亢进时每分钟至少能听到()

A. 2次 B. 6次 C. 4次 D. 8次 E. 10次

74、心尖搏动向左下移位,其原因为()

A、左室增大 B、右室增大 C、左、右室增大 D、右位心 E、全心脏扩大

75、心浊音界呈靴形者见于()

A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、心包积液

D、主动脉瓣关闭不全 E、主动脉瓣狭窄

76、腹膜炎最主要的体征是()

A. 腹式呼吸减弱 B. 腹膜刺激征 C. 移动性浊音阳性

D. 肠鸣音消失 E. 腹部可见肠型

77、深反射不包括()

A、肱二头肌反射 B、肱三头肌反射 C、桡骨骨膜反射 D、跖反射 E、膝反射

78、昏迷病人表现的体位为()

A、强迫仰卧位 B、被动体位 C、自动体位 D、强迫侧卧位 E、辗转体位

79、男,6岁,在玩耍时突发严重呼吸困难、发绀10分钟而来院急诊。查体:呈吸气性呼吸困难,并有“三凹征”。应首先考虑()

A、气管内异物 B、支气管哮喘 C、气胸 D、慢性支气管炎 E、急性胸膜炎

80、女,31岁,心慌、气短3年,加重1周,查体:P85次/分,心界向两侧扩大,心率126次/分,心律绝对不齐,心音强弱不等,心尖部可闻及响亮的舒张期隆隆样杂音和5/6级收缩期吹风样杂音,并向左腋下传导。首先考虑最可能为()

A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、二尖瓣狭窄合并关闭不全

D、主动脉瓣狭窄 E、室间隔缺损

81、女,32岁。昨日后半夜至今晨上腹部饱胀不适、疼痛伴恶心。查体:上腹部见胃型和蠕动波。最可能的病情是()

A、幽门梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、急性腹膜炎 D、大量腹腔积液 E、气腹

82. 浅部触诊法适合用于下列哪项检查()

A、胆囊压痛点 B、阑尾压痛点 C、脾脏触诊

D、肾脏触诊 E、关节及阴囊

83. 吸气时脉搏明显减弱或消失称为()

A、交替脉 B、水冲脉 C、奇脉 D、短绌脉 E、重搏脉

84. 胸骨右缘第二肋间处为哪个瓣膜听诊区 ()
- A. 主动脉瓣听诊区 B. 二尖瓣区 C. 肺动脉瓣区
D. 主动脉第二听诊区 E. 三尖瓣区
85. 面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、眼眶凹陷称为 ()
- A. 慢性病容 B. 危重病容 C. 满月病容 D. 二尖瓣病容 E. 急性病容
86. Murphy 征阳性见于 ()
- A. 急性肝炎 B. 急性阑尾炎 C. 急性胆囊炎
D. 急性腹膜炎 E. 急性胰腺炎
87. 能判断心脏大小、位置、形态的评估方法是 ()
- A. 视诊 B. 触诊 C. 叩诊 D. 听诊 E. 嗅诊
88. 在心尖部触及舒张期震颤, 应考虑 ()
- A. 主动脉瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 肺动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全 E. 二尖瓣狭窄
89. 判断患者意识状态常用 ()
- A. 视诊 B. 触诊 C. 叩诊 D. 听诊 E. 问诊
90. 紫癜与充血性皮疹鉴别要点是 ()
- A. 直径大小 B. 压之是否退色 C. 颜色程度
D. 皮肤隆起程度 E. 部位
91. 评估淋巴结时常用什么方法 ()
- A. 视诊 B. 浅部滑行触诊 C. 深压触诊 D. 双手触诊 E. 叩诊
92. 正常人坐位时颈静脉不显露, 平卧时可稍充盈, 其充盈水平限于 ()
- A. 锁骨上缘至下颌角距离的上 2/3 内 B. 锁骨上缘至下颌角距离的中 2/3 内
C. 锁骨上缘至下颌角距离的上 1/3 内 D. 锁骨上缘至下颌角距离的下 2/3 内
E. 锁骨上缘至下颌角距离的下 1/3 内
93. 用视诊法评估甲状腺时, 应嘱患者做什么动作, 观察甲状腺 ()
- A. 仰头 B. 屈颈 C. 吞咽 D. 抱头 E. 摇头
94. 对胸膜摩擦感的描述错误的是 ()
- A. 触诊时有擦皮革感 B. 呼气和吸气均可触及 C. 屏住呼吸消失
D. 于胸廓的下前侧部最易触及 E. 仅在呼气时可触及
95. 语颤增强可见于 ()

- A. 气胸 B. 肺气肿 C. 阻塞性肺不张 D. 大叶性肺炎 E. 胸膜粘连增厚
96. 舟状腹常见于 ()
- A. 肝硬化 B. 低血糖 C. 恶液质 D. 腹膜炎 E. 胃扩张
97. 腹部出现移动性浊音, 提示有 ()
- A. 门静脉高压 B. 腹膜炎 C. 幽门梗阻 D. 腹水 E. 腹腔肿瘤
98. 腹膜炎最主要的体征是 ()
- A. 腹式呼吸减弱 B. 腹膜刺激征 C. 移动性浊音阳性
D. 肠鸣音消失 E. 腹部可见肠型
99. 典型阑尾炎疼痛的特点是 ()
- A. 上腹部疼痛 B. 下腹部疼痛 C. 右上腹疼痛
D. 左上腹疼痛 E. 转移性右下腹疼痛
100. 一般体检测量脉搏的方法中, 正确的是 ()
- A. 可用拇指诊脉 B. 病人剧烈活动后立即测量
C. 有脉搏短绌, 应分别测量心率、脉率
D. 测量部位只有桡动脉 E. 测量前不必作解释工作
101. 成人血压的正常值是 ()
- A. 收缩压 $<140\text{mmHg}$, 舒张压 $<90\text{mmHg}$
B. 收缩压 $=140\text{mmHg}$, 舒张压 $=90\text{mmHg}$
C. 收缩压 $<160\text{mmHg}$, 舒张压 $<95\text{mmHg}$
D. 收缩压 $=160\text{mmHg}$, 舒张压 $=95\text{mmHg}$
E. 收缩压 $<90\text{mmHg}$, 舒张压 $<60\text{mmHg}$
102. 肠鸣音亢进见于 ()
- A. 急性肠炎 B. 急性胰腺炎 C. 肠麻痹 D. 消化性溃疡 E. 肝硬化
103. 气胸病人患侧肺部叩诊音为 ()
- A. 清音 B. 浊音 C. 鼓音 D. 实音 E. 过清音
104. 某病人呼吸由浅慢逐渐加快加深, 后又逐渐变浅变慢, 然后暂停数秒, 可出现上述状态呼吸, 考虑为 ()
- A. 断续呼吸 B. 浅慢呼吸 C. 深大呼吸 D. 潮式呼吸
E. 间歇呼吸
105. 某病人昏迷不醒, 呼吸有刺鼻大蒜味, 瞳孔缩小, 多汗。此病人可能是 ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656113111102010051>