

口腔医学主治医师：口腔颌面外科学六

1、单选 不需要拔除的乳牙是（）

- A. 乳牙滞留、影响恒牙正常萌出
- B. 乳牙龋坏、根尖外露造成口腔溃疡
- C. 乳牙不松动、恒牙先天缺失
- D. 乳牙为残根、牙根有瘻管
- E. 乳切牙唇侧位（江南博哥）、恒切牙已舌侧萌出

正确答案：C

2、单选 为了更准确地了解唇舌部病变的范围和性质，检查时一般用（）

- A. 口镜和敷料镊
- B. 分别用双手的拇指和食指
- C. 用口镜和一手的拇指
- D. 用敷料镊和一手的食指
- E. 用一手的拇指和食指 正确答案：E

3、单选 降颌肌群包括（）

- A. 二腹肌前腹
- B. 二腹肌后腹
- C. 下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌前腹
- D. 下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌后腹
- E. 二腹肌前腹、二腹肌后腹、颏舌肌 正确答案：C

4、单选 舌后1/3的淋巴管引流至（）

- A. 颏下和肩胛舌骨肌的淋巴结
- B. 颌下和颈深淋巴结
- C. 颈深淋巴结
- D. 腮腺淋巴结
- E. 锁骨上窝淋巴结 正确答案：D

5、单选 髁颈部骨折常伴有（）

- A. 上颌骨折
- B. 下颌角骨折
- C. 下颌升支骨折
- D. 颧弓骨折
- E. 对侧颞孔区或颈部骨折

正确答案：E

6、单选 幼儿的急性颌下淋巴结肿大多由哪种原因引起的（）

- A. 冠周炎
- B. 牙髓炎
- C. 牙周炎
- D. 上呼吸道感染

E. 牙龈炎

正确答案：D

7、单选 患者，女，50岁。左侧腮腺区反复肿胀3年，平时有胀感，口内时有咸味。较符合慢性阻塞性腮腺炎的X线造影表现为（）

A. 主导管不整型扩张

B. 末梢导管扩张

C. 腺内分支导管变细

D. 腺内有占位性病变

E. 主导管中断，造影剂外溢 正确答案：B

8、单选 腮腺导管口位于（）

A. 颊部黏膜的下1/3处

B. 下颌第二磨牙牙冠部平对的颊黏膜上

C. 平对上颌第二磨牙牙冠部的颊黏膜上

D. 颊脂垫尖

E. 翼下颌皱襞与颊垫尖之间 正确答案：C

9、单选 女，58岁，主诉右耳前区包块20年，缓慢生长，无其他不适。检查见右耳前区5cm×6cm结节状肿物，表面不光滑，有轻度的动度，与皮肤无粘连。最可能的诊断是右腮腺（）

A. 混合瘤

B. Warthin瘤

C. 舍格伦综合征（肿瘤型）

D. 黏液表皮样癌

E. 腺样囊性癌 正确答案：A

10、单选 在发育良好的情况下，双侧唇裂患者整复术最适合的年龄是（）

A. 3~6个月

B. 6~12个月

C. 1~2岁

D. 3~4岁

E. 6~7岁 正确答案：B

11、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。下列关于其创面描述不正确的是（）

A. 出血较多，疼痛剧烈易发生休克

B. 创缘整齐，有明显的出血点

C. 皮下组织及肌肉有挫伤

D. 颅骨暴露

E. 部分耳廓、眉毛连同上睑同时撕脱 正确答案：B

12、单选 普通拔牙后10天，伤口愈合良好，局部无明显炎症现象，但是患者常感到伤口处胀痛不适，尤其是碰触伤口颊侧时更为明显，常见的原因是（）

- A. 伤口内有残根遗留
- B. 伤口内有肉芽组织
- C. 干槽症
- D. 骨突
- E. 麻醉时针尖刺伤骨膜

正确答案：D

13、单选 仅限于悬雍垂裂开的唇裂是（）

- A. 软腭裂
- B. 不完全腭裂
- C. 单侧完全性腭裂
- D. I 度唇裂
- E. II 度唇裂

正确答案：A

14、单选 下齿槽神经阻滞麻醉如有感染易引起（）

- A. 嚼肌间隙感染
- B. 翼颌间隙感染
- C. 颊间隙感染
- D. 颌下间隙感染
- E. 颞间隙感染

正确答案：B

15、单选 颌下腺炎常见的原因（）

- A. 牙槽脓肿
- B. 淋巴结炎
- C. 结石堵塞导管
- D. 冠周炎
- E. 龋齿

正确答案：C

16、单选 若将局部麻醉药物注入血管中可发生（）

- A. 药物过敏
- B. 药物中毒
- C. 晕厥
- D. 血管扩张伤口出血
- E. 中枢神经麻痹

正确答案：B

17、单选 交叉十字绷带用于（）

- A. 临时固定颌骨
- B. 颌面部经常采用的绷带
- C. 使用于上颌骨、面、脸部手术后
- D. 各种骨折及术后颌骨制动用
- E. 适合上颌骨骨折的牵引

正确答案：B

18、单选 下列哪项不是腺样囊性癌的特征 ( )

- A. 好发于腮腺和下颌下腺
- B. 肿瘤沿神经血管束生长
- C. 浸润性极强
- D. 区域淋巴结转移率低
- E. 可带瘤生存

**正确答案：A**

19、单选 患者，男，51岁，1年来左面颊、下唇部因触摸等诱因多次发生阵发性剧痛，近半年来发作频繁，疼痛剧烈难忍。初起卡马西平治疗有效，近来服药无效。根据目前病情哪种治疗为首选 ( )

- A. 加大卡马西平剂量
- B. 行三叉神经病变支撕脱术
- C. 2%普鲁卡因三叉神经病变支封闭
- D. 三叉神经病变支 95%乙醇局部注射
- E. 三叉神经病变支射频电凝术

**正确答案：E**

20、单选 睑、眉部损伤的处理措施哪条是不正确的 ( )

- A. 有组织缺损时可拉拢缝合
- B. 清创后应准确对位缝合
- C. 应保持上下睑的长度
- D. 有组织缺损应植全厚皮片
- E. 清创时应尽量保存组织

**正确答案：A**

21、单选 牙种植术是指 ( )

- A. 将人工预制成的非生物性假牙植入人体牙槽窝或牙槽骨内
- B. 将患者自身的埋伏牙拔下易位移植
- C. 将他人的牙移植于患者牙槽窝内
- D. 将已完全脱位的牙再植于原来的牙槽窝内
- E. 将患者自身的阻生牙拔下后行易位植入

**正确答案：A**

22、单选 预防性气管切开术一般切开的是 ( )

- A. 环甲膜
- B. 气管一、二环
- C. 气管三、四环
- D. 环状软骨
- E. 环状软骨下方到第一气管环

**正确答案：C**

23、单选 关于麻醉效果，利多卡因比普鲁卡因维持的时间 ( )

- A. 要短
- B. 一样长
- C. 长 1 倍

D. 长 2 倍

E. 长 3 倍 **正确答案: C**

24、单选 拔牙手术区准备不包括 ( )

A. 术前反复漱口、必要时洁牙

B. 1 / 5000 高锰酸钾液冲洗术区

C. 1%甲硝唑液擦洗牙齿

D. 手术区用 1%或 2%碘酒消毒

E. 复杂牙齿需要切开缝合者, 要用 75%乙醇消毒口周及面部下 1 / 3 的皮肤, 并铺消毒巾 **正确答案: C**

25、单选 口腔颌面部较易早期发现的肿瘤是 ( )

A. 腮腺浅叶肿瘤

B. 下颌骨肿瘤

C. 上颌窦肿瘤

D. 舌根部肿瘤

E. 口底肿瘤 **正确答案: A**

26、单选 面神经下颌缘支损伤的临床表现为 ( )

A. 眼睑闭合不全

B. 额部皱纹消失

C. 鼻唇沟变浅

D. 舌偏向患侧

E. 下唇歪斜 **正确答案: E**

27、单选 根尖囊肿的 X 线表现为 ( )

A. 根尖周骨质未见改变

B. 根尖周骨质不规则破坏

C. 根尖周骨质有破坏, 但边界清楚

D. 根尖周骨质有破坏, 周围有致密骨线

E. 根尖周骨质破坏, 牙槽突有破坏

**正确答案: D**

28、单选 放疗后一般多长时间内避免拔牙 ( )

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

E. 4 年

**正确答案: D**

29、单选 儿童复发性腮腺炎可见于任何儿童期, 最常见于 ( )

A. 2 岁左右

B. 5 岁左右

- C. 8 岁左右
- D. 10 岁左右
- E. 14 岁

**正确答案：** B

30、单选 可以触及结石的是 ( )

- A. 蔓状血管瘤
- B. 海绵状血管瘤
- C. 杨梅状血管瘤
- D. 淋巴血管瘤
- E. 毛细血管瘤

**正确答案：** B

31、单选 单侧颞下颌关节强直的病人，若在儿童期发病，临床上可出现 ( )

- A. 健侧面部丰满
- B. 患侧面部狭长
- C. 颞点偏向患侧
- D. 前牙反𪙇
- E. 颞点偏向健侧

**正确答案：** C

32、单选 面神经颊支损伤的临床表现为 ( )

- A. 眼睑闭合不全
- B. 额部皱纹消失
- C. 鼻唇沟变浅
- D. 舌偏向患侧
- E. 下唇歪斜

**正确答案：** C

33、单选 拔牙术前准备不包括 ( )

- A. 详细询问病史
- B. 患者全身情况是否有拔牙禁忌证
- C. 必要时化验检查
- D. 必要时药物过敏试验检查
- E. 必要时进行牙髓活力检查

**正确答案：** E

34、单选 颌骨骨折治疗原则说法不正确的是 ( )

- A. 恢复正常的咬合关系
- B. 防止感染和镇痛
- C. 外伤后立即进行颌间固定
- D. 合理营养
- E. 保持呼吸道通畅

**正确答案：** C

35、单选 对偶三角瓣适用于 ( )

- A. 整复邻近组织的缺损
- B. 松解挛缩的疤痕

- C. 覆盖感染的创面
- D. 做毛发的移植
- E. 器官再造

正确答案：B

36、单选 口腔颌面部外伤出血最有效的止血方法是（）

- A. 填塞止血
- B. 结扎止血
- C. 指压止血
- D. 包扎止血
- E. 药物止血

正确答案：B

37、单选 上颌骨骨折致软腭后坠引起呼吸困难最主要的抢救措施是（）

- A. 气管切开
- B. 清除口腔内分泌物
- C. 从鼻腔或口腔插管
- D. 上提并固定上颌骨
- E. 环甲膜切开

正确答案：D

38、单选 以下哪种不属于癌前病变（）

- A. 白斑
- B. 口腔扁平苔藓
- C. 口腔黏膜下纤维性变
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 着色性干皮病

正确答案：B

39、单选 拔除上颌第一磨牙时，应当防止牙根折断后被推入（）

- A. 鼻腔
- B. 软腭
- C. 颊部软组织内
- D. 上颌窦内
- E. 腭大孔内

正确答案：D

40、单选 下颌骨骨折不易发生的临床体征有（）

- A. 眼镜征
- B. 骨折异常活动度
- C. 出血和血肿
- D. 牙龈撕裂
- E. 咬合关系紊乱

正确答案：A

41、单选 颌面部创口初期缝合最宽时间为（）

- A. 6 小时

- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时
- E. 48 小时甚至更久的创口，只要没有明显的化脓，清创后仍可作初期缝合 **正确**

**答案：E**

42、单选 腭裂手术两侧松弛切口内填塞的碘仿纱条抽除时间为术后（）

- A. 2 天
- B. 3~4 天
- C. 4~6 天
- D. 7~12 天
- E. 15 天以后 **正确答案：D**

43、单选 三叉神经第三支是属于（）

- A. 运动神经
- B. 交感神经
- C. 分泌神经
- D. 混合性神经
- E. 感觉神经 **正确答案：D**

44、单选 诊断化脓感染的可靠依据是（）

- A. 白细胞增多
- B. 凹陷性水肿
- C. 超声波检查
- D. 穿刺检查
- E. X 线片检查 **正确答案：D**

45、单选 急性边缘性骨髓炎诊断主要依据（）

- A. 病史
- B. 切开引流时探查发现骨面粗糙
- C. 感染
- D. 局部症状
- E. 全身症状 **正确答案：B**

46、单选 颌面外伤清创时只能清除下述哪种组织（）

- A. 坏死组织
- B. 污染组织
- C. 多余组织
- D. 不整齐的组织
- E. 可能坏死的组织 **正确答案：A**

47、单选 哪种肿瘤属于临界瘤（）

- A. 鳃裂囊肿
- B. 成釉细胞瘤



- C. 皮脂腺囊肿
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 骨化纤维瘤

**正确答案：B**

48、单选 对放射线敏感的肿瘤是（）

- A. 恶性黑色素瘤
- B. 颌骨骨肉瘤
- C. 脂肪肉瘤
- D. 下颌下腺腺癌
- E. 嗜酸粒细胞增生性淋巴肉芽肿

**正确答案：E**

49、单选 一患有双侧完全性唇腭裂的患儿，否认家族中有类似病史，临床表现提示可能患有某种全身发育畸形综合征。耳的检查应注意（）

- A. 外耳道分泌物
- B. 乳突压痛
- C. 耳郭缺损及听力情况
- D. 邻近部位的炎症
- E. 邻近部位的畸形 **正确答案：C**

50、单选 下唇的主要感觉神经来自（）

- A. 舌下神经
- B. 面神经
- C. 下颌神经
- D. 上颌神经
- E. 非上述神经 **正确答案：C**

51、单选 男，11岁，因牙齿排列不齐要求正畸治疗，检查发现前牙拥挤。适于观察混合牙列乳恒牙交替情况的是（）

- A. 曲面体层
- B. 上颌侧位体层
- C. 上颌后前位体层第一磨牙层
- D. 上颌前位体层翼突层
- E. 下颌体腔 **正确答案：A**

52、单选 女，50岁，开口受限1年，既往有关节弹响史。临床检查见开口度一指半，开口型左偏。下列表现中，哪一项不是颞下颌关节紊乱综合征的表现（）

- A. 关节间隙改变
- B. 髁突运动度改变
- C. 两侧关节形态不对称
- D. 髁状突骨质硬化

E. 关节结构为 T 形致密团块代替 **正确答案：E**

53、单选 诊断化脓性感染的可靠依据是（）

- A. 白细胞增多
- B. 凹陷性水肿
- C. 超声波检查
- D. 穿刺检查

E. X 线片检查 **正确答案：D**

54、单选 患者女性，43 岁，双侧腮腺反复肿大一年半，与进食有关，并伴轻微疼痛，有时自觉有咸味分泌物，口干不明显。检查见双侧腮腺肿胀不明显，导管口稍红，挤压腺体可从导管口流出混浊的“雪花样”唾液。该病最可能的诊断是（）

- A. 舍格伦综合征
- B. 慢性复发性腮腺炎
- C. 腮腺淋巴结炎
- D. 腮腺结核

E. 流行性腮腺炎 **正确答案：B**

55、单选 拔牙创内完全形成新骨的时间是（）

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月
- E. 12 个月

**正确答案：C**

56、单选 对一般心脏病患者要求拔牙时（）

- A. 不应做拔牙手术
- B. 绝对禁止拔牙
- C. 可以拔牙，但麻醉药内不加肾上腺素
- D. 为了拔牙效果好，拔牙时应加肾上腺素
- E. 必须在心电监护下拔牙 **正确答案：C**

57、单选 牙槽嵴修整适应证时间在拔牙后（）

- A. 2~3 周
- B. 4~5 周
- C. 6~7 周
- D. 7~8 周
- E. 8~12 周

**正确答案：E**

58、单选 神经鞘瘤的穿刺液特点为（）

- A. 蛋清样液

- B. 淡黄色清亮液，内含胆固醇结晶
- C. 血性液，但不凝固
- D. 米汤样稀薄液
- E. 血性液、凝固

正确答案：C

59、单选 新生儿颌骨骨髓炎常发生在（）

- A. 下颌骨体部
- B. 下颌支
- C. 下颌骨髁状突
- D. 上颌骨
- E. 上颌骨与翼突连接处

正确答案：D

60、单选 昏迷的外伤病员运送时最佳体位是（）

- A. 侧卧位
- B. 仰卧位
- C. 随时变动
- D. 俯卧位
- E. 头高仰卧位

正确答案：D

61、单选 患者，男，54岁，右舌缘溃疡5个月不愈，全身一般情况良好。门诊活检诊断为“舌鳞状细胞癌（II~III级）”。经专家门诊详细检查后诊断为“右舌缘鳞状细胞癌（T3N2aM0）”。该患者应选择的最佳治疗方案为（）

- A. 已无手术指征，鳞癌对放疗不敏感，尽快化疗
- B. 无手术指征，放疗加化疗
- C. 已无手术指征，鳞癌对化疗不敏感，尽快放疗
- D. 鳞癌对放、化疗均不敏感，尽快手术治疗
- E. 术前化疗加手术治疗加术后放、化疗

正确答案：E

62、单选 口角区的疔肿最易引起哪组淋巴结的肿痛（）

- A. 颌下淋巴结
- B. 颌上淋巴结
- C. 颌下淋巴结
- D. 腮腺下极淋巴结
- E. 颈浅淋巴结

正确答案：C

63、单选 牙槽外科阻滞麻醉时发生面瘫，处理方法为（）

- A. 局部注射神经营养药
- B. 局部理疗
- C. 口服镇静药
- D. 不做特殊处理
- E. 处理同Bell面瘫

正确答案：D

64、单选 舍格伦综合征伴发结缔组织病中最常见的是（）

- A. 多发性肌炎
- B. 红斑狼疮
- C. 类风湿性关节炎
- D. 结节性动脉炎
- E. 硬皮病

**正确答案：C**

65、单选 处理晕厥需要静脉推注的药物是（）

- A. 止血敏
- B. 抗生素
- C. 安定
- D. 高渗葡萄糖
- E. 扑尔敏

**正确答案：D**

66、单选 患者男性，63岁，右耳垂前肿性胀大8个月。近期肿物增长较快，痛向耳颞部放散。检查发现肿物约3.5cm、质地硬、有触痛、边界不清。活动度差，右眼睑闭合较对侧迟钝。以下哪项辅助检查对患者来说是不恰当的（）

- A. CT检查
- B. 胸部X线片
- C. 腮腺造影
- D. 细针吸细胞学检查
- E. 切除活组织检查

**正确答案：E**

67、单选 流行性腮腺炎的好发年龄（）

- A. 婴儿期
- B. 5~15岁
- C. 中年人
- D. 老年人
- E. 无明显年龄选择

**正确答案：B**

68、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。行清创缝合术中，若血管条件允许，应进行（）

- A. 松解创缘，减少张力尽量拉拢缝合
- B. 撕脱的皮肤清创后，切削成全厚或中厚皮片再植
- C. 立刻做血管吻合组织再植术
- D. 采用局部皮瓣关闭创面
- E. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面

**正确答案：C**

69、单选 女，23岁，双侧颞下颌关节弹响2年，许勒位及经咽侧位显示髁状突前斜面有明确的骨质改变。颞颌关节上腔造影可见上、下腔均有造影剂显影，应诊断为（）

- A. 关节盘内移位
- B. 关节上、下腔交通
- C. 关节盘外移位
- D. 关节盘穿孔
- E. 关节囊松弛 **正确答案: B**

70、单选 作为关节功能面，许多关节病最早破坏的髁状突关节斜面是（）

- A. 前斜面
- B. 后斜面
- C. 外侧斜面
- D. 内侧斜面
- E. 以上都不是

**正确答案: A**

71、单选 患者，女，35岁，因左下颌区无痛性肿胀1年就诊，局部无麻木。临床见左下颌角膨隆，皮肤正常，无波动感，口内左下磨牙区龈颊沟丰满，舌侧膨隆明显，触之有乒乓球感，黏膜无破溃。以下X线片表现，哪项最不符合造釉细胞瘤的X线特征（）

- A. 多房且房室大小相差悬殊
- B. 牙根有锯齿状吸收
- C. 肿瘤边缘皮质骨局部硬化
- D. 肿瘤内可见钙化影
- E. 肿瘤所在的骨皮质膨隆 **正确答案: E**

72、单选 男，30岁，因车祸面部外伤2天，检查见两侧面部不对称，左侧下睑肿胀、瘀血，口内检查左侧后牙早接触。首先应拍下列哪个片位（）

- A. 上颌体腔
- B. 上颌前部片
- C. 上颌正位体片
- D. 华特位
- E. 颧骨后前位 **正确答案: D**

73、单选 不是真性囊肿的是（）

- A. 角化囊肿
- B. 球上颌囊肿
- C. 始基囊肿
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 表皮样囊肿 **正确答案: D**

74、单选 腮腺淋巴结的淋巴液引流到（）

- A. 枕淋巴结
- B. 颌上淋巴结
- C. 颌下淋巴结

D. 颈深上淋巴结

E. 颈深下淋巴结 **正确答案：D**

75、单选 创缘内卷的主因是（）

A. 进针过深

B. 收结过紧

C. 组织富裕

D. 两侧进针深度不一致

E. 皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距 **正确答案：E**

76、单选 颌面部最常见的感染途径是（）

A. 血源性

B. 损伤性

C. 腺源性

D. 牙源性

E. 手术时不合理的操作

**正确答案：D**

77、单选 最理想的阻滞麻醉药是（）

A. 普鲁卡因

B. 利多卡因

C. 地卡因

D. 可卡因

E. 氯乙烷

**正确答案：B**

78、单选 下齿槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的原因是（）

A. 注射点过高

B. 注射点过前

C. 注射点过低

D. 注射点过后

E. 注射入血管内 **正确答案：D**

79、单选 下列关于腺淋巴瘤不正确的是（）

A. 多见于女性

B. 又名沃辛瘤

C. 肿块可有消长史

D. 患者常有吸烟史

E. 多位于腮腺后下极 **正确答案：A**

80、单选 关于颞下颌关节强直的治疗方法哪一项是正确的（）

A. 理疗、微波

B. 抗炎为主

C. 镇痛药物辅助下的开口训练

- D. 早期手术治疗为主  
E. 早期药物治疗，晚期手术治疗 **正确答案：D**

81、单选 通常颌面部随意瓣的长度比例为（）

- A. 1: 1  
B. 1.5: 1  
C. 2~3: 1  
D. 4~5: 1  
E. 6: 1 **正确答案：C**

82、单选 急性化脓性腮腺炎最常见病原菌是（）

- A. 乳酸杆菌  
B. 链球菌  
C. 金黄色葡萄球菌  
D. 肺炎球菌  
E. 厌氧菌 **正确答案：C**

83、单选 主要用于口外创口小量渗出的引流为（）

- A. 片状引流  
B. 纱条引流  
C. 管状引流  
D. 负压引流  
E. 加压引流 **正确答案：A**

84、单选 儿童颌骨骨折治疗原则错误的是（）

- A. 尽早复位  
B. 固定时间较成人短  
C. 尽可能采用保守治疗  
D. 必须恢复伤前的咬合关系  
E. 如要手术治疗，术中应避免损伤牙胚

**正确答案：D**

85、单选 作用于M期的化疗药物是（）

- A. 环磷酰胺  
B. 氨甲蝶呤  
C. 氮芥  
D. 长春新碱  
E. 争光霉素

**正确答案：D**

86、单选 包扎止血主要适用于（）

- A. 毛细血管和小动、静脉的出血  
B. 知名动脉的出血  
C. 腔窦的出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656233233041010113>