

## 口腔医学试题库含答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于 IL-2 的生物学效应, 错误的是( )。

- A、促进 T 细胞和 B 细胞的活化
- B、激活 NK 细胞和单核细胞
- C、抑制 Th1 细胞分泌 IFN- $\gamma$
- D、诱导 LAK 细胞形成
- E、以自分泌和旁分泌方式发挥作用

正确答案: C

2、新斯的明在临床使用中不可用于( )。

- A、重症肌无力
- B、有机磷酸酯中毒
- C、手术后肠胀气
- D、肌松药过量中毒
- E、阿托品中毒

正确答案: B

3、急性牙髓炎的主要病理变化是( )。

- A、巨噬细胞浸润
- B、中性粒细胞浸润
- C、淋巴细胞浸润
- D、肉芽组织形成
- E、浆细胞浸润

正确答案: B

4、糖皮质激素治疗哪种休克效果最佳?( )

- A、感染性休克
- B、心源性休克
- C、肾上腺皮质危象休克
- D、过敏性休克
- E、低血容量性休克

正确答案: A

5、患者, 女, 14 岁。偶然发现右下后牙颊侧牙龈有小脓包前来就诊。查右下第二前磨牙畸形中央尖折断, I 度松动, 颊侧牙龈有窦道口, X 线片见根长为 9mm, 根尖呈燕尾状敞开, 根尖周 X 线透射区 4mm $\times$ 5mm, 边界模糊不清。该主诉牙的治疗应选用( )。

- A、干髓治疗
- B、根尖诱导形成术
- C、塑化治疗
- D、拔除
- E、根管治疗

正确答案：B

6、骨纤维异常增殖症的主要病理改变是( )。

- A、骨小梁周边出现较多的成骨细胞
- B、骨小梁排列紊乱
- C、纤维结缔组织替代骨组织
- D、骨小梁呈“C”或“V”形状
- E、纤维结缔组织充满骨髓腔

正确答案：C

7、一个牙健康的 15 岁少年, 如果由饮水氟浓度为 0.8mg/L 地区迁至浓度为 2.0mg/L 地区, 其氟牙症发生的可能性为( )。

- A、20%
- B、80%
- C、50%
- D、100%
- E、0%

正确答案：E

8、急性牙槽脓肿从何种途径排脓后愈合较差( )。

- A、由龈沟或牙周袋排脓
- B、向鼻腔排脓
- C、穿通舌侧骨壁排脓
- D、穿通唇颊侧骨壁排脓
- E、通过根管从龋洞排脓

正确答案：A

9、硫脲类抗甲状腺药可引起的严重不良反应是( )。

- A、心动过缓
- B、低蛋白血症
- C、再生障碍性贫血
- D、黏液性水肿
- E、粒细胞缺乏症

正确答案：E

10、多形渗出性红斑口腔黏膜病变的特点是( )。

- A、黏膜出现边缘扩展现象
- B、黏膜出现白色条纹
- C、黏膜出现云雾状水肿
- D、黏膜出现色素斑
- E、黏膜出现红斑、水疱

正确答案：E

11、以下关于金瓷冠中合金与瓷粉要求的描述,哪项是错误的?( )

- A、良好的生物相容性
- B、瓷粉的热膨胀系数略大于合金
- C、有良好的强度
- D、合金熔点大于瓷粉
- E、两者的化学成分应各含有一种以上的元素

正确答案：B

12、Corlin 综合征不包括( )。

- A、钙磷代谢异常
- B、额部及颞顶部凹陷
- C、骨骼异常
- D、多发性牙源性角化囊肿
- E、多发性皮肤基底细胞癌

正确答案：B

13、患者左下后牙进热饮时痛 1 周,平时无不适。查左下第一磨牙咬合面深龋,探洞底硬,稍敏感,叩痛(+),热测刺激过去 20 秒后患牙出现疼痛。考虑可能的诊断是( )。

- A、急性牙髓炎
- B、慢性龋
- C、慢性闭锁性牙髓炎
- D、可复性牙髓炎
- E、深龋

正确答案：C

14、胆固醇不能转化成( )。

- A、雌激素
- B、雄激素

- C、醛固酮
- D、维生素 D
- E、胆色素

正确答案：E

15、医师王某,2006年5月前在某县医院内科工作,后借调到县团委工作,2008年6月回县医院工作,王某在应当经所在地的县级以上卫生行政部门委托的机构或者组织考核合格,并依法申请办理( )。

- A、中止注册手续
- B、重新注册手续
- C、注销注册手续
- D、准予注册手续
- E、变更注册手续

正确答案：B

16、中龋的症状不可能有( )。

- A、过冷食物敏感
- B、有自发痛
- C、酸甜食物敏感
- D、无自觉症状
- E、过热食物敏感

正确答案：B

17、患者,男,67岁,肺源性心脏病急性加重期患者。血气分析:pH7.25, PaCO<sub>2</sub> 9.3kPa(70mmHg), HCO<sup>-</sup> 30mmol/L;对其酸碱失衡的治疗措施应为( )。

- A、补充氯化钾
- B、静脉滴注盐酸精氨酸
- C、改善通气功能
- D、静脉滴注5%碳酸氢钠
- E、给予利尿剂

正确答案：C

18、全口义齿基托与唾液或黏膜与唾液之间产生的力称为( )。

- A、附着力
- B、大气压力
- C、粘着力
- D、摩擦力

E、内阻力

正确答案：A

19、对牙槽嵴损害最小的人工牙是( )。

A、非解剖式塑料牙

B、解剖式瓷牙

C、半解剖式瓷牙

D、解剖式塑料牙

E、半解剖式金属𪔐面牙

正确答案：A

20、连接着腺泡的导管是( )。

A、排泄管

B、闰管

C、以上都不是

D、分泌管

E、小叶间导管

正确答案：B

21、根折牙临床表现的描述, 不正确的是( )。

A、部分根折患牙的牙髓出现“休克”现象

B、最常见的根折为根尖 1/3 折断

C、多见于牙根完全形成的成人牙齿

D、根折恒牙的牙髓坏死率为 20%~24%

E、外伤性纵折很多见

正确答案：E

22、慢性支气管炎患者呼吸道感染时, 最常致病的革兰阴性杆菌为( )。

A、绿脓杆菌

B、流感嗜血杆菌

C、大肠杆菌

D、肺炎克雷白杆菌

E、变形杆菌

正确答案：B

23、特殊黏膜是( )。

A、软腭黏膜

B、硬腭黏膜

C、牙龈

D、舌腹黏膜

E、舌背黏膜

正确答案：E

24、临床上对牙髓已经坏死而牙根尚未发育完全的年轻恒牙治疗方法应选择( )。

A、塑化治疗

B、根管治疗

C、干髓治疗

D、根尖诱导形成术

E、根尖切除术

正确答案：D

25、治疗慢性心功能不全和逆转心肌肥厚并能降低病死率的药物是( )。

A、强心苷

B、哌唑嗪

C、卡托普利

D、酚妥拉明

E、硝酸甘油

正确答案：C

26、涎腺肿瘤中最常见的是( )。

A、黏液表皮样癌

B、腺样囊性瘤

C、上皮-肌上皮癌

D、鳞癌

E、多形性腺瘤

正确答案：E

27、医生必须保守病人的秘密,但应考虑除外( )。

A、病人的某些怪癖

B、病人的某些心理

C、病人的不良预后

D、病人的生理缺陷

E、病人的过失行为

正确答案：C

28、脂肪酸合成过程中,脂酰基的载体是( )。

A、肉碱

B、丙二酰 CoA

C、ACP

D、草酰乙酸

E、CoA

正确答案：B

29、患者,女,35岁。左上后牙遇冷水痛4天,平时无其他不适。查右上第一前磨牙咬合面龋深达牙本质中层,叩诊(一),冷测引起尖锐痛,刺激去除后痛持续数十秒。考虑最可能的诊断是( )。

A、可复性牙髓炎

B、慢性牙髓炎

C、急性牙髓炎

D、深龋

E、牙本质过敏症

正确答案：B

30、人脑不仅反映当前所看到、听到的事物,还能反映过去经历过的事物和想象出来从未见到过的事物,这说明人脑对现实的反映具有的特点是( )。

A、抽象概括性

B、客观真实性

C、系统整体性

D、主观能动性

E、间接创造性

正确答案：D

31、急性牙髓炎的诊断步骤是( )。

A、先麻醉止痛,后查患牙和问诊

B、先温度测验,后查患牙和问诊

C、先问诊,再查牙,后温度测验

D、先查患牙,后问诊做温度测验

E、先问诊,后做麻醉止痛和检查

正确答案：C

32、为研究老年人的糖尿病患病率,拟进行抽样调查,下列哪一项不是抽样调查中决定样本含量的因素( )。

A、精确度

B、调查者的数量

- C、个体间的变异程度
- D、预期现患率
- E、把握度

正确答案：A

33、纤维囊壁内出现腺体的是( )。

- A、甲状舌管囊肿
- B、鳃裂囊肿
- C、含牙囊肿
- D、根尖周囊肿
- E、牙源性角化囊肿

正确答案：A

34、患者,男,45岁。左下后牙进食不适2个月,无自发痛,口腔检查:左下第一磨牙龋洞,冷刺激一过性疼痛,叩诊(-),探诊(+),○面磨损严重,该患牙可诊断为( )。

- A、根尖周炎
- B、牙周炎
- C、牙隐裂
- D、牙髓炎
- E、牙本质过敏

正确答案：E

35、金属烤瓷冠就位后色泽、形态与各牙协调,颈长达设计要求,颈部探针可探入,邻接处牙线勉强通过,正中颌时切端位于1烤瓷区,你认为此冠( )。

- A、邻接过紧
- B、邻接过松
- C、颈部与牙体间隙过大
- D、金一瓷结合区设计不当
- E、为合格修复体

正确答案：C

36、根尖肉芽肿内的上皮成分大多来自( )。

- A、Malassez 上皮剩余
- B、口腔上皮
- C、牙板上皮
- D、腺上皮

E、缩余釉上皮

正确答案：A

37、牙根形成的多少取决于( )。

A、上皮根鞘

B、牙乳头

C、牙囊

D、成釉器

E、上皮隔

正确答案：E

38、外科救治感染性休克时不正确的做法是( )。

A、使用皮质激素

B、待休克好转后手术处理感染灶

C、采用血管扩张药物治疗

D、应用抗菌药物

E、补充血容量

正确答案：B

39、患儿, 2岁, 上前牙唇面广泛性龋坏, 牛奶喂养, 未刷过牙, 诊断为( )。

A、静止龋

B、猖獗性龋

C、慢性龋

D、湿性龋

E、奶瓶龋

正确答案：E

40、支原体人类非淋菌性尿道炎的重要病原体是( )。

A、柯萨奇 B 组病毒

B、伯氏疏螺旋体

C、炭疽芽胞杆菌

D、解脲脲原体

E、汉坦病毒

正确答案：D

41、tRNA 含有( )。

A、密码子

B、帽子 m<sup>7</sup>Gppp

C、3' CCA-OH

- D、大、小两个亚基
- E、3' 末端的多聚腺苷酸结构

正确答案：C

42、结核传播的主要途径是( )。

- A、饮水
- B、空气
- C、粪-口
- D、接触
- E、食品

正确答案：B

43、全口义齿的印模确切的提法是( )。

- A、开口式印模
- B、解剖式印模
- C、初步印模
- D、压力印模
- E、功能性印模

正确答案：E

44、急性心梗第 2 周出现发热和心包摩擦音,血沉 30mm/小时,血白细胞  $6.1 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞 55%,可能是( )。

- A、急性心梗后综合征
- B、伴发病毒性心包炎
- C、室壁瘤
- D、急性心梗的反应性心包炎
- E、心脏破裂

正确答案：A

45、患儿,5 岁。龋深及髓,探无反应,叩(+++),唇侧牙龈充血,无明显肿胀,扪痛,松动 II°。当日临床处理宜采用( )。

- A、置放失活剂
- B、封丁香油球安抚
- C、牙龈切开引流
- D、髓腔开放引流
- E、全身应用抗生素

正确答案：D

46、上颌全口义齿基托后缘位置是( )。

- A、上颌结节与腭小凹后 2mm 连线
- B、翼上颌切迹与腭小凹连线
- C、上颌结节与腭小凹连线
- D、翼上颌切迹与腭小凹后 2mm 连线
- E、翼上颌切迹与腭小凹前 2mm 连线

正确答案：D

47、固定桥受力时,桥体弯曲的变形量与桥体( )。

- A、长度的立方成正比
- B、厚度的立方成正比
- C、长度的立方成反比
- D、宽度的立方成反比
- E、宽度的立方成正比

正确答案：A

48、釉质龋最早出现的病理变化是( )。

- A、色素沉着
- B、混浊
- C、透明
- D、崩解
- E、再矿化

正确答案：C

49、关于修复性牙本质正确的是( )。

- A、存在于受刺激相应的髓腔端
- B、矿化程度高
- C、存在于所有牙中
- D、存在于死髓牙中
- E、牙本质小管数目与原发性牙本质相同

正确答案：A

50、欲用统计图比较 1994~2003 年城市和农村 3 岁以下儿童贫血患病率的变化趋势,选用何种统计图最为合适( )。

- A、线图
- B、圆图
- C、散点图
- D、直方图
- E、条图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657116132052006060>