

# 2023 年耳鼻喉科临床主治医师专业知识考 试题库（内含答案与解析）

## 一、选择题

1、先天性耳前瘦管来自于

A、第 1 鳃弓

B、第 2 鳃弓

C、第 3 鳃弓

D、第 1、第 2 鳃弓

E、第 2、第 3 鳃弓

参考答案：D

答案解析：先天性耳前瘦管为第 1、2 鳃弓的耳廓原基在发育过程中融合不全的遗迹，是一种临床上很常见的先天性外耳疾病。

2、先天性内耳畸形中，主要表现为蜗管发育不良，听力可表现为高频听力损失或者全聋，而前庭功能可能尚正常者是

A、Alexander 型

B、Scheibe 型

C、Mondini 型

D、Michel 型

E、Scheibe 型和 Mondini 型

参考答案：A

答案解析：Alexander 型：即蜗管型，主要表现为蜗管发育不良。可以只侵及耳蜗基底回，表现为高频听力损失，亦可侵及蜗管全长，表现为全聋，而前庭功能可能尚正常。

3、外耳湿疹处理不当的是

A、告诉患者不要抓挠外耳道，可用水清洗

B、中耳脓液刺激引起者应用有效药物治疗中耳炎

C、尽可能找出病因，去除过敏原

D、病因不明者，停食辛辣、刺激性或有较强变应原性食物

E、急性湿疹渗液较多者，用炉甘石洗剂清洗渗液和痂皮后，用硼酸溶液或醋酸铝溶液湿敷

参考答案：A

答案解析：外耳湿疹应告诉患者不要抓挠外耳道，不要随使用水清洗，以免感染流脓。

4、鼓膜创伤穿孔者处理不当的是

A、外耳道可用酒精擦拭消毒

B、发病后尽早应用抗生素预防感染

C、嘱患者切勿用力擦鼻涕

D、保持耳内干燥

E、局部滴入抗生素滴耳液，预防感染

参考答案：E

答案解析：鼓膜创伤穿孔者局部禁止滴入任何滴耳液。

5、外耳道疔的处理正确的是

A、都应切开排脓

B、如疔较大，有明显的波动，不应切开引流

C、切口应与外耳道纵轴平行

D、如需切开，刀尖应尽量切深

E、不能用微波治疗，会导致炎症扩散

参考答案：C

答案解析：疔的早期，局部局限性红肿疼痛，可用鱼石脂甘油纱条或紫色消肿膏纱条敷于红肿处，每日更换一次；也可局部物理治疗、微波治疗，促进炎症消散。未成熟的疔禁忌切开，防止炎症扩散；如疔的尖端有白色脓栓时，可轻轻刺破脓栓，用棉棒轻轻将脓栓压出；如疔较大，有明显的波动，应局麻下切开引流，注意切口应与外耳道纵轴平行，防止痊愈后外耳道形成瘢痕狭窄；为防止损伤外耳道软骨，刀尖不可切入太深。

6、坏死性外耳道炎的最常见致病微生物是

A、葡萄球菌

B、链球菌

C、真菌感染

D、病毒

E、绿脓杆菌

参考答案：E

答案解析：坏死性外耳道炎致病菌多是绿脓杆菌，约占90%，其他有葡萄球菌、链球菌和真菌感染等。

7、外耳道真菌病病因，叙述不正确的是

A、耳内进水或不适当地用药

B、外耳道分泌物的堆积和刺激

C、全身性慢性疾病

D、未及时使用抗生素

E、游泳、挖耳等引起外耳道的炎症

参考答案：D

答案解析：全身长期大剂量应用抗生素，为真菌的孳生提供了条件。

8、关于外耳道胆脂瘤的处理不当的是

A、如胆脂瘤较大，与外耳道贴得很紧，已引起外耳道的扩大，取出有时相当困难。此时用浸泡盯口宁的滴耳液浸泡效果较好

B、清除应彻底

- C、外耳道呈葫芦状，需麻醉后做辅助切口再取出
- D、如外耳道胆脂瘤伴感染，应在控制感染后取出
- E、若有死骨，应予清除

参考答案：A

答案解析：如胆脂瘤较大，与外耳道贴得很紧，或已引起外耳道的扩大，取出有时相当困难。此时不能用浸泡叮耳宁的滴耳液浸泡，那会增加取出的难度。可用一些消毒的油剂润滑，将叮聆钩插到胆脂瘤和外耳道壁之间轻轻松动后取出。

- 9、关于先天性耳前瘦管的描述错误的是
- A、临床上很常见的先天性外耳疾病
  - B、国内抽样调查，其发生率达 12%
  - C、单侧与双侧发病比例为 4：1
  - D、女性略多于男性
  - E、平时易感染，易引起注意并接受诊治

参考答案：E

答案解析：先天性耳前瘦管患者平时多无症状，不以为疾，及至感染，才引起注意并接受诊治。

- 10、先天性外耳道闭锁是源于
- A、第 1 鳃沟发育障碍所致
  - B、第 1 鳃弓发育畸形所致

- C、第 2 鳃弓发育畸形所致
- D、第 3 鳃弓发育畸形所致
- E、第 1、2 鳃弓发育畸形所致

参考答案：A

答案解析：先天性外耳道闭锁是第 1 鳃沟发育障碍所致。

11、耳廓组织结构和解剖形态描述错误的是

- A、耳廓是由较薄的皮肤覆盖在凹凸不平的软骨上组成
- B、耳廓前面皮肤较薄，皮肤与软骨紧密相贴
- C、耳廓后面皮肤较厚，与软骨粘贴较紧
- D、耳廓软骨薄而富有弹性
- E、耳廓前面皮肤与软骨紧密相贴

参考答案：C

答案解析：耳廓后面皮肤较厚，与软骨粘贴较松。

12、耳廓创伤的处理不正确的是

- A、及时清创止血
- B、预防和控制感染
- C、尽可能保留组织以免形成畸形
- D、当耳廓形成血肿时，应早期行抽吸治疗
- E、血肿或开放性创口均易引发感染，多见链球菌感染，故应选

用相应的敏感的抗生素

参考答案：E

答案解析：耳廓创伤血肿或开放性创口均易引发感染，多见绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌感染。

13、与纵行骨折相比横行骨折更易引起

- A、脑脊液漏
- B、硬脑膜撕裂伤
- C、传导性听力损失和低频耳鸣
- D、感音性听力损伤，耳鸣多为高频性
- E、混合性聋

参考答案：D

答案解析：纵行骨折主要伤及中耳，故出现传导性听力损失和低频耳鸣。横行骨折易伤及内耳故多为感音性听力损伤，耳鸣多为高频性。如同时伤及中耳和内耳可出现混合性聋。

14、以下关于急性乳突炎说法错误的是

- A、急性乳突炎是乳突气房黏骨膜、特别是乳突骨质的化脓性炎症
- B、成人多发
- C、多为急性化脓性中耳炎的并发症
- D、继发于外伤或通过血行感染很少见

E、以上说法都不对

参考答案：B

答案解析：急性乳突炎好发于儿童，但因23岁以下儿童乳突方开始发育，故仅出现鼓窦炎，而不存在乳突炎。

15、关于急性乳突炎病因说法错误的是

A、致病菌毒力强，耐药，对常用抗生素不敏感

B、患者体质虚弱，抵抗力下降，伴有其他急慢性疾病，患者患急性化脓性中耳炎时易并发本病

C、中耳脓液向外引流不畅

D、乳突气房为板障型

E、危险型乳突

参考答案：D

答案解析：急性乳突炎的病因主要有：致病菌毒力强，耐药，对常用抗生素不敏感；患者体质虚弱，抵抗力下降，伴有其他急慢性疾病，患急性化脓性中耳炎；引流不畅，包括中耳向外引流不畅及乳突气房结构异常。急性乳突炎多发生于气化型乳突，当气房内蓄积分泌物时，周边大气房的分泌物常不能顺利向鼓室引流，常易引起乳突炎，因此将这种乳突称为危险型乳突。

16、耳后骨膜下脓肿可继发于下列哪种疾病

A、外耳道炎

- B、外耳道疔
- C、耳后淋巴结炎
- D、慢性化脓性中耳炎急性发作
- E、慢性化脓性中耳炎静止期

参考答案：D

答案解析：化脓性中耳炎，特别是慢性化脓性中耳乳突炎急性发作期，炎症穿破鼓室外侧骨壁或乳突尖部骨皮质，使乳突腔内蓄积的脓液经乳突外侧骨板破溃区流入并聚集于耳后乳突骨膜的下方，形成耳后骨膜下脓肿。选择慢性化脓性中耳炎急性发作。

17、以下哪一项不属于耳源性颅外并发症

- A、耳后骨膜下脓肿
- B、颈部贝佐尔德脓肿
- C、迷路炎
- D、周围性面瘫
- E、乙状窦血栓性静脉炎

参考答案：E

答案解析：颅外并发症可分为颞骨内和颞骨外并发症，颞骨内并发症多见为迷路炎、岩锥炎及耳源性周围性面瘫。颞骨外并发症多见为耳后骨膜下脓肿和瘻管、颈部脓肿等。乙状窦血栓性静脉炎应属于颅内并发症。

18、颈部 Bezold 脓肿是由于炎症穿破乳突尖内侧的乳突皮质，  
脓液流注于

- A、二腹肌深面
- B、二腹肌浅面
- C、二腹肌前面
- D、二腹肌后面
- E、胸锁乳突肌深面

参考答案：E

答案解析：在气化良好的乳突中，其乳突尖内侧骨壁较薄，而外骨壁较厚，且有胸锁乳突肌腱附着。当乳突内蓄脓时，乳突尖部骨壁常有破溃，脓液循破溃处流入胸锁乳突肌和颈深筋膜中层之间形成 Bezold 脓肿。

19、中耳炎并发迷路屡管多位于

- A、外半规管
- B、上半规管
- C、后半规管
- D、耳蜗
- E、前庭

参考答案：A

答案解析：外半规管位于鼓窦的底部，此部位容易受到病变如胆脂瘤的侵蚀破坏，导致形成迷路瘦管。

20、对于耳源性脑膜炎，下列哪一项不典型

- A、头痛
- B、耳分泌物增多
- C、恶心、呕吐
- D、脑膜刺激征
- E、高热

参考答案：B

答案解析：耳源性脑膜炎首先有中耳乳突炎的急慢性病变，在出现以高热、头痛、呕吐为主要症状时要考虑并发脑膜炎的可能，起病时可有寒战、高热、头痛剧烈、伴有脑膜刺激征，出现恶心、呕吐。小儿还可出现腹泻、痉挛等。但耳源性脑膜炎常伴有中耳脓液的引流不畅，因此耳分泌物增多不是其典型表现。

21、关于迷路炎，以下说法错误的是

- A、可分为局限性迷路炎、浆液性迷路炎及化脓性迷路炎 3 个类型
- B、破坏多位于外半规管隆凸处
- C、可伴有眩晕、恶心、呕吐
- D、瘦管试验可为阴性

E、手术治疗为主要疗法，务必清除包括瘦管附近处所有的病变组织

参考答案：E

答案解析：化脓性迷路炎时屡管试验多为阴性。对于迷路炎，手术为主要疗法，应彻底清除胆脂瘤，对屡管附近的上皮进行处理时应谨慎，以免开放迷路引起化脓性迷路炎。若不慎将屡管打开，去除病灶后应用组织将其修补。

22、关于化脓性迷路炎，关于其说法错误的有

A、破坏正常组织，内耳功能可完全丧失

B、炎症可进一步向颅内扩散，引起颅内并发症

C、瘘管试验多为阳性

D、可在抗生素控制下立即行乳突手术

E、急性炎症消退后，患者的前庭与耳蜗功能常不可恢复，成为“死迷路”

参考答案：C

答案解析：化脓性迷路炎时化脓菌侵入内、耳，引起内外淋巴间隙内的弥漫性化脓性炎症。炎症破坏正常组织，使内耳功能完全丧失，此时瘘管试验多为阴性。炎症感染可继续向颅内扩散，引起颅内并发症。炎症消退后，内耳肉芽组织生成，继而结缔组织及新骨形成，成为“死迷路”。

23、耳源性周围性面瘫最易发生在面神经哪一段

- A、颅内段
- B、迷路段
- C、鼓室段
- D、垂直段
- E、颅外段

参考答案：C

答案解析：中耳炎出现的面瘫多因鼓室段面神经骨管先天性缺损，面神经直接受炎症侵犯所致；或面神经骨管虽完整，但由于供应神经的血管受到炎症刺激后发生痉挛，以致神经水肿，出现面瘫。在鼓室段最为多见。

24、耳源性 Moutet 脓肿是由于炎症穿破乳突尖内侧的乳突皮质，脓液流注于

- A、二腹肌沟处
- B、胸锁乳突肌深面
- C、胸锁乳突肌浅面
- D、胸锁乳突肌后面
- E、胸锁乳突肌前面

参考答案：A

答案解析：耳源性 Moutet 脓肿是指乳突尖的骨质破溃区位于二

腹肌沟处，脓液在二腹肌沟处形成脓肿，先沿二腹肌后膜向前发展到下颌下区，再顺颈部大血管鞘发展到咽旁隙，形成颈深部脓肿。

25、关于乙状窦血栓性静脉炎，错误的为

A、是中耳乳突的炎症通过直接或间接途径造成乙状窦壁的炎症，在损伤区形成血栓

B、疾病早期患者可有耳痛及剧烈头痛

C、侵入乙状窦内引起静脉系统感染，可出现寒战、高热、

D、血栓形成可导致静脉血回流受阻，多见有颅内压升高

E、Tobey-Ayer 试验为阴性

参考答案：E

答案解析：Tobey-Ayer 试验（也称压颈试验）设计的目的是了解乙状窦是否有栓塞存在。在腰椎穿刺时测脑脊液压力时，压迫健侧颈内静脉，此时脑脊液压力迅速上升，超出原压力 12 倍，然后压迫患侧颈内静脉，若乙状窦有闭塞性血栓形成，脑脊液压力不升高或仅升高 10-20mmH<sub>2</sub>O，此现象称 Tobey-Ayer 试验阳性。

26、关于乙状窦血栓性静脉炎，错误的是

A、在寒战、高热期如有中耳炎存在时首先应考虑此病

B、应与疟疾、伤寒鉴别，主要依据血液检查

C、打开乙状窦至正常界线，血栓必须取出

D、眼底检查可有 GroWe 试验阳性

E、TObey-Ayer 试验阴性不能排除有血栓

参考答案：C

答案解析：对于乙状窦血栓性静脉炎治疗原则，应手术治疗彻底清除病灶，打开乙状窦至正常界线，血栓可不取出，远处的血栓可结扎颈静脉。通畅引流，应用强有力的抗生素，辅以支持疗法。

27、耳源性脑膜炎的治疗原则，错误的是

A、尽早行乳突手术，以清除病灶

B、足量、有效的抗生素治疗

C、对症和支持治疗

D、酌情使用糖皮质激素

E、禁用糖皮质激素

参考答案：E

答案解析：耳源性脑膜炎应当尽早进行乳突根治术，彻底清除病灶，通畅引流，但必须注意当颅内压特别高时，首先预防脑疝形成，必要时应用降颅压药物，在降颅压的同时进行手术。应用足量有效的抗生素，可酌情同时应用糖皮质激素。

28、关于耳源性脑膜炎，错误的是

A、急性或慢性化脓性中耳乳突炎所并发的软脑膜和蛛网膜的急性化脓性炎症

B、依患者的个体抵抗力的强弱，病菌毒力的大小可以形成局限

性和弥漫性两类脑膜炎

C、局限性脑膜炎一般称之为硬脑膜下脓肿，弥漫性的脑膜炎即通常所说的耳源性脑膜炎

D、耳源性脑膜炎和普通化脓性脑膜炎的治疗原则一样

E、诊断上须注意与流行性脑膜炎和结核性脑膜炎相鉴别

**参考答案：D**

答案解析：耳源性脑膜炎应当尽早进行乳突根治术，彻底清除病灶，通畅引流；而普通化脓性脑膜炎以应用足量有效的抗生素控制感染为主。

29、关于小儿假性脑膜炎，错误的是

A、可有脑膜刺激征

B、脑脊液检查一般正常

C、一般不合并软脑膜炎

D、属于耳源性脑膜炎的一种类型

E、感染可经未闭合的骨缝侵入颅内

**参考答案：D**

答案解析：小儿在急性化脓性中耳炎时，感染可经未闭合的骨缝侵入颅内，但并未出现软脑膜炎，可有轻度脑膜刺激征，称为假性脑膜炎，脑脊液检查一般正常。其要与耳源性脑膜炎相鉴别。

30、关于耳源性脑膜炎，错误的为

A、有中耳乳突炎的急慢性病变，在出现以高热、头痛、呕吐为主要症状时要考虑并发脑膜炎的可能

B、起病时可有寒战、高热、体温高达 40 左右

C、KernigS 征及 BrUdZinSkiS 征可为阳性

D、锥体束受累时，可出现浅反射如腹壁反射、提睾反射减弱，深反射如膝反射、跟腱反射等亢进

E、生化检查，蛋白、糖含量、氯化物含量升高，脑脊液细菌培养可呈阳性结果

**参考答案： E**

答案解析：耳源性脑膜炎时脑脊液生化检查多为细胞数增多，以多形核粒细胞为主，蛋白含量增高，但糖含量降低或消失，氯化物亦减少。

31、关于耳源性脑积水，错误的是

A、为脑室-蛛网膜下腔通路内脑脊液增多

B、表现为颅内压增高症状

C、多有中耳炎病史

D、预后较差

E、脑脊液实验室检查可正常

**参考答案： D**

答案解析：耳源性脑积水在彻底清除中耳乳突病变、控制感染

后，多有自愈倾向，故预后一般良好。故选预后较差。

32、在脑疝代偿期，错误的是

- A、呼吸明显加深或变慢
- B、血压升高
- C、脉搏加快
- D、中枢性高热
- E、昏迷

参考答案：C

答案解析：脑疝代偿期时，其脉搏变慢。在衰竭期时脉搏变细快且不规则。

33、耳源性脑脓肿患者，一旦出现脑疝，错误的是

- A、不用脱水剂，以防止电解质紊乱
- B、必要时做气管切开术或气管插管
- C、给氧及人工呼吸
- D、紧急行脑脓肿穿刺排脓
- E、急请神经外科协同抢救

参考答案：A

答案解析：脑疝为颅内并发症中最危急的阶段，应快速静脉使用脱水剂，以降低颅内压。

34、关于耳源性脑脓肿，错误的是

A、脓肿多位于小脑，其次为大脑颞叶

B、常为单发脓肿，当患者体质很差或感染细菌毒力强时，也可见到多发性脓肿

C、临床可出现典型的四期：起病期、潜伏期、显症期和终末期

D、起病期可出现体温升高、畏寒、头痛、呕吐及轻度脑膜刺激征等症

E、显症期也是脓肿形成期，脓肿包膜形成并可逐渐增大

参考答案：A

答案解析：耳源性脑脓肿多发生于大脑颞叶，其次为小脑。

35、耳流臭脓、对侧上肢麻痹，首先考虑以下何种疾病

A、耳源性脑脓肿

脑积水

C、颅内肿瘤

D、硬脑膜外脓肿

E、耳源性脑膜炎

参考答案：A

答案解析：耳源性脑脓肿多位于大脑颞叶，其次为小脑，视脓肿在脑部的不同位置可出现不同的定位症状。结合耳流臭脓的病史，多半考虑为耳源性脑脓肿。

36、中耳有肉芽和脓液，高热、剧烈头痛、喷射状呕吐、颈项强

直，但神志尚清楚，疑为

A、耳源性脑脓肿

B、脑积水

C、颅内肿瘤

D、硬脑膜外脓肿

E、耳源性脑膜炎

参考答案：E

答案解析：耳源性脑膜炎首先有中耳乳突炎的急慢性病变，在出现以高热、头痛、呕吐为主要症状时要考虑并发脑膜炎的可能，起病时可有寒战、高热、头痛剧烈，伴有脑膜刺激征，出现恶心、呕吐。选择耳源性脑膜炎。

37、关于硬脑膜外脓肿，错误的是

A、在颅中窝或颅后窝之硬脑膜与软脑膜间形成脓肿

B、耳镜检查时常可见到有明显的搏动性脓液外溢

C、小的脓肿可无症状，有时有轻度的头痛；脓肿较大时有持续性头痛，头位变化时更明显

D、大脓肿可引起颅内压升高征象，当耳内流脓量增大时，头痛可减轻

E、颞骨和脑 CT、MRI 检查可见中耳乳突骨质破坏，硬脑膜区有阴影

参考答案：A

答案解析：化脓性中耳乳突炎可侵入颅内，化脓性迷路炎、岩锥炎亦可侵入颅内，在颅中窝或颅后窝之硬脑膜与骨板间形成脓肿，称硬脑膜外脓肿。

38、关于硬脑膜下脓肿，错误的是

- A、脓肿可位于蛛网膜与软脑膜之间
- B、脓肿可位于硬脑膜与颅骨骨板之间
- C、好发于大脑镰旁、小脑幕上和弓下裂孔处
- D、化脓性炎症可向脑深部蔓延，不易彻底清除，故可反复发作
- E、多发于全身衰弱、抵抗力极低的患者

参考答案：B

答案解析：硬脑膜下脓肿位于硬脑膜与蛛网膜或蛛网膜与软脑膜之间，好发于大脑镰旁、小脑幕上和弓下裂孔处。本病罕见，多发于全身衰弱、抵抗力极低的患者，且病情险恶。

39、关于岩锥炎，错误的是

- A、多为颞骨岩部含气小房之化脓性感染
- B、患侧头前部疼痛，常感眼内及眼部四周疼痛，可放射到额、颞、颊、牙等部
- C、乳突手术后耳部已无脓液，而又突然流大量脓液，结合有三叉神经痛及体温升高，应考虑本病

D、可出现岩尖综合征，表现为眼内直肌瘫痪，展神经分布区疼痛及局限性脑膜炎症状

E、对于岩尖部蓄脓，尤其是有多数脓腔不能治愈者，须行岩尖切除术

参考答案：D

答案解析：岩尖综合征是指岩尖部化脓性感染引起的三叉神经半月神经节受累导致头部、眼部疼痛，外展神经麻痹引起的斜视及复视；中耳流脓或局限性脑膜炎引起的脑膜刺激症状。

40、中耳炎合并对侧肢体偏瘫、对侧中枢性面瘫及失语症最常见于

A、耳源性颞叶脓肿

B、耳源性小脑脓肿

C、耳源性额叶脓肿

D、硬脑膜外脓肿

E、乙状窦血栓性静脉炎

参考答案：A

答案解析：耳源性颞叶脓肿典型表现为对侧肢体偏瘫；对侧中枢性面瘫；失语症：在额下回和中央前回的下部有脓肿时，可出现运动性失语即口语运用障碍。

41、中耳炎合并同侧肢体、肌张力减弱或消失、共济失调及指鼻

试验阳性最常见于

- A、耳源性颞叶脓肿
- B、耳源性小脑脓肿
- C、耳源性额叶脓肿
- D、硬脑膜外脓肿
- E、乙状窦血栓性静脉炎

参考答案：B

答案解析：耳源性小脑脓肿典型表现为：中枢性眼震；同侧肢体、肌张力减弱或消失；共济失调，指鼻试验阳性，轮替运动障碍，步态蹒跚，Romberg征阳性；辨距不良。

42、重度眩晕、听力丧失、自发性眼震，患耳冷热试验、矮管试验均无反应常见于

- A、浆液性迷路炎
- B、局限性迷路炎
- C、化脓性迷路炎
- D、乙状窦血栓性静脉炎
- E、耳源性小脑脓肿

参考答案：C

答案解析：化脓性迷路炎急性病程为12周。常表现为：重度的眩晕、恶心、呕吐，自发性眼震。病初听力即完全丧失，常因其他症状显

著，患者多不注意。患耳冷热试验、瘳管试验均无反应，自发性眼震向健侧。前庭功能代偿大约需 35 周，此时除患耳听力丧失外，无明显其他症状。急性前庭症状消退后，患者的前庭和耳蜗功能永不能恢复，成为“死迷路”。迷路感染可经内耳道、内淋巴囊、耳蜗水管或穿破后半规管骨壁而侵入颅内，发生脑膜炎、小脑脓肿、硬脑膜外脓肿及颅内静脉窦栓塞等并发症。

43、关于胆固醇肉芽肿病理以下说法错误的为

- A、含有胆固醇结晶和多核巨细胞
- B、鼓室乳突腔内有咖啡色液体
- C、黏膜出现鳞状上皮化生
- D、肉芽一般不易侵及骨质
- E、肉芽肿内多淋巴细胞

参考答案：C

答案解析：胆固醇肉芽肿是一种含有丰富血管的肉芽组织，其中有许多由胆固醇结晶溶解后形成的裂隙，该裂隙为长菱形，常呈同心性排列。其周围有多核巨细胞或巨噬细胞浸润，偶有出血或含铁血黄素沉积。此外，肉芽肿内尚可见大量的淋巴细胞和浆细胞，以及纤维蛋白等。与胆脂瘤不同，本病在肉芽肿与周围骨质间无基质，黏膜一般不出现鳞状上皮化生。肉眼下，这种肉芽肿大多呈暗红色，形状不一，质较软，但较水肿性肉芽坚韧些。除肉芽组织外，鼓室和（或）乳突气房内尚有多少不等的咖啡色液体蓄积，液体中可见细微的、闪烁发亮

的点状胆固醇结晶。

44、对于咽鼓管异常开放症的治疗方法以下错误的是

- A、多咀嚼口香糖
- B、咽鼓管口涂硝酸银
- C、腭帆张肌松解术
- D、软腭封闭
- E、水杨酸粉咽鼓管吹张法

参考答案：A

答案解析：咽鼓管异常开放症的一般治疗向患者说明本病无生命危险，解除其精神顾虑，消除紧张状态。告其勿作过度的咀嚼及吞咽动作等。

45、中耳胆固醇肉芽肿患者临床特点以下错误的是

- A、多为单耳发病
- 鼓膜不一定有穿孔
- C、可有酱油色分泌物
- D、CT 显示一般有骨质破坏
- E、与骨疡性中耳炎易混淆

参考答案：D

答案解析：中耳胆固醇肉芽肿患者颞骨 CT 可见乳突或（和）鼓室

内有软组织阴影，一般无骨质破坏，乳突呈板障型或气化型。

46、中耳胆固醇肉芽肿与其他中耳疾病的关系以下说法中错误的是

- A、可有分泌性中耳炎病史
- B、可导致胆脂瘤的形成
- C、与骨疡性中耳炎易混淆
- D、单纯鼓膜穿孔也可继发中耳胆固醇肉芽肿
- E、只要中耳出血都可能导致

参考答案：B

答案解析：胆固醇肉芽肿可与胆脂瘤并存，一般认为，胆固醇肉芽肿是继胆脂瘤而发生的，并非胆脂瘤的病因。

47、CT 显示中耳胆固醇肉芽肿患者肉芽肿位于鼓窦，听骨链正常，乳突气化可，采取治疗方法为

- A、保守观察
- B、乳突径路鼓室成形术
- C、鼓膜切开置管
- D、改良乳突根治
- E、单纯乳突切开

参考答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/658126057041006051>