

2024 年安徽省黄山市护士基础理论知识模拟试题及答案解析

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 男性, 13 岁, 半月全身浮肿, 乏力。尿蛋白(++++) , 定量 4.0g/24h, 镜检偶见沉渣细胞和透明管型。血压 120/80mmHg, 血浆白蛋白 29g/L。BUN5mmol/L, 血清肌酐 98 umol/L, 胆固醇, 甘油三酯升高, 该临床诊断是 ()

- A、急性肾炎综合征
- B、急进性肾炎综合征
- C、慢性肾炎综合征
- D、肾病综合征
- E、肾病综合征并发急性肾炎综合征

答案:

D

解析: 根据病史和检查结果, 该患者出现了半月全身浮肿、乏力、尿蛋白大量增加、血浆白蛋白降低、血压正常、血清肌酐轻度升高等症状和体征, 符合肾病综合征的诊断标准。因此, 答案为 D。其他选项的病史和检查结果不符合该疾病的诊断标准。

2. 会阴冲洗的流程 ()

A、阴阜→近侧腹股沟→对侧腹股沟→对侧大小阴唇→近侧大小阴唇→尿道→阴道口
→肛门

B、阴阜→对侧腹股沟→近侧腹股沟→对侧大小阴唇→近侧大小阴唇→尿道口→阴道
口→肛门

C、阴阜→对侧腹股沟→近侧腹股沟→同侧大小阴唇→远侧大小阴唇→尿道→阴道口
→肛门

D、阴阜→对侧腹股沟→近侧腹股沟→对侧大小阴唇→近侧大小阴唇→阴道口→肛门
→尿道

E、阴阜→对侧腹股沟→近侧腹股沟→对侧大小阴唇→近侧大小阴唇→肛门→尿道→
阴道口

答案：

B

解析：本题考查会阴冲洗的流程。会阴冲洗是指用温水或药水冲洗会阴部，以清洗会阴部的污垢和细菌，预防感染和炎症。会阴部包括阴阜、腹股沟、大小阴唇、尿道口、阴道口和肛门。根据常规的冲洗流程，应该是从阴阜开始，依次冲洗对侧腹股沟、近侧腹股沟、对侧大小阴唇、近侧大小阴唇、尿道口、阴道口和肛门。因此，选项 B 为正确答案。选项 A、C、D、E 的流程顺序均有误，不符合常规的冲洗流程。

3. 鼻饲婴幼儿插管长度（ ）

A、14 -18cm

B、14 -16cm

C、15 -19cm

D、15 -17cm

E、14 -19cm

答案：

A

解析：本题考察鼻饲婴幼儿插管长度的范围。正确答案为 A 选项，即 14-18cm 。鼻饲是一种通过鼻腔将营养液或药物输送到胃部的方法，常用于婴幼儿或无法口服的患者。插管长度的选择应根据患者的年龄、身高、体重、鼻腔大小等因素进行个体化调整。根据临床经验和相关文献，鼻饲婴幼儿插管长度的范围一般为 14-18cm 。因此，本题的正确答案为 A 选项。其他选项的长度范围均不符合临床实践。

4. 李某，男，58 岁，上腹部创伤高位肠痿 5 天，血压 100/65mmHg. 血 pH7.2，
Hco⁻ 15mmol/L，该患者酸碱失衡类型是（ ）

A、呼吸性碱中毒

B、代谢性碱中毒

C、呼吸性酸中毒

D、代谢性酸中毒

E、呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案:

D

解析: 根据题干中给出的血气分析结果, 血 pH 为 7.2, HCO_3^- 为 15mmol/L , 说明患者处于代谢性酸中毒状态。因为代谢性酸中毒是由于体内酸性物质过多或碱性物质丢失过多导致的, 而呼吸性酸中毒则是由于呼吸系统功能障碍导致 CO_2 排出不足而引起的。因此, 选项 A、C、E 都不符合题意。选项 B 代表代谢性碱中毒, 与题干中的血气分析结果不符, 因此也不是正确答案。综上所述, 答案为 D。

5. 患者李某,胆结石术后感到疼痛,为减轻患者疼痛,10am 医生开出医嘱:强痛定 100mg im sos, 此项医嘱失效时间为 ()

A、当天 2pm

B、当天 10pm

C、第二日 10am

D、第二日 10pm

E、医生开出停止时间

答案:

B

解析: 本题考查医学常识和医嘱的理解。根据题干中的医嘱“强痛定 100mg im sos”, 可以知道这是一种止痛药, 使用方法为肌肉注射, 需要根据疼痛程度决定使用次数和剂量。而题干中的“失效时间”指的是医嘱的有效期限, 即在什么时间之后

该医嘱就不再适用。根据常识和医学知识，强痛定是一种短效止痛药，一般作用时间为 4-6 小时，因此该医嘱的失效时间应该在当天晚上或第二天早上。而根据选项，只有 B 选项“当天 10pm ”符合这个条件，因此 B 选项为正确答案。综上所述，本题的正确答案为 B。

6. 单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别是（ ）

A、梗阻的病因

B、梗阻的时间

C、梗阻的严重程度

D、肠管壁有无血运障碍

E、有无并发症

答案：

D

解析：单纯性肠梗阻和绞窄性肠梗阻的主要区别在于肠管壁有无血运障碍。单纯性肠梗阻是由于肠腔内物质阻塞引起的，肠管壁血运正常；而绞窄性肠梗阻是由于肠管被扭转或压迫引起的，肠管壁血运受到障碍。因此，选项 D 为正确答案。其他选项与两种肠梗阻的区别无关。

7. 有一实习护士发生了护理缺陷，请问应由（ ）承担责任。

A、科主任、护士长

B、事件本人

C、科室

D、带教老师

E、其父母

答案:

D

解析: 本题考查的是医疗事故责任的承担。根据实习护士的特殊身份，带教老师应该对其进行指导和监督，因此在发生护理缺陷时，带教老师应该承担一定的责任。因此，本题的正确答案为 D。其他选项均不符合实际情况。

8. 女孩, 2岁, 体检发现胸骨左缘第 2-3 肋间 I ~ Ⅲ级收缩期杂音. 肺动脉瓣区第二心音亢进, 伴固定性, 该患儿的诊断是 ()

A、动脉导管未闭

B、房间隔缺损

C、室间隔缺损

D、法洛四联症

E 肺动脉瓣狭窄

答案:

B

解析：根据题干中提到的体征，可以确定该患儿存在心脏结构异常。具体来说，胸骨左缘第2-3肋间I~III级收缩期杂音以及肺动脉瓣区第二心音亢进伴固定性，提示该患儿存在房间隔缺损。因此，答案选B。其他选项的体征与该患儿的情况不符。

9. 患者不小心被开水烫伤，你作为当班护士要求患者用洁净冷水冲洗（ ）分钟

A、30 分钟

B、45 分钟

C、60 分钟

D、30-60 分钟

E、20-30 分钟

答案：

D

解析：本题考查护理常识。烫伤后应立即用洁净冷水冲洗，时间为30-60分钟。选项A、B、C、E均不符合常规护理要求，故排除。选项D符合常规护理要求，为正确答案。

10. 急性胰腺炎行胃肠减压治疗的目的是（ ）

A、解除胃痉挛

B、解除胰管痉挛

C、解除肠梗阻症状

D、以免胃酸进入十二指肠刺激胰液分泌

E、减轻弥漫性腹膜炎的症状

答案:

E

解析: 本题考查急性胰腺炎的治疗方法。急性胰腺炎是一种常见的急腹症, 其病因复杂, 临床表现多样, 治疗方法也较为复杂。胃肠减压是急性胰腺炎治疗中的一种重要方法, 其目的是减轻弥漫性腹膜炎的症状, 缓解腹胀、呕吐等症状, 降低胰腺的分泌负担, 促进胰腺的恢复。因此, 本题的正确答案为E。其他选项均与急性胰腺炎的治疗方法无关。

11. 纤维支气管镜检查时, 病人术前禁食禁饮 () 小时

A、2

B、4

C、6

D、8

E、12

答案:

B

解析：纤维支气管镜检查是一种需要局部麻醉的内窥镜检查，为了避免术中呕吐、误吸等情况的发生，一般要求病人术前禁食禁饮一定时间。根据常规操作规范，纤维支气管镜检查前禁食禁饮时间为4小时。因此，本题答案为B。

12. 男性,60岁,因心前区压榨样疼痛4小时余伴冷汗、恐惧,来院急诊,护士采取的措施中哪项不妥()

A、拍X线胸片

B、抽血送检

C、简单护理体检

D、心电监护

E、监测血压

答案：

A

解析：本题考查对急诊护理的基本知识和技能。患者主诉心前区压榨样疼痛4小时余伴冷汗、恐惧，怀疑为急性心肌梗死，应立即进行心电监护、抽血送检、监测血压等措施，但拍X线胸片并不是首选措施，因为心肌梗死的诊断主要依靠心电图和心肌酶学检查，而X线胸片对心肌梗死的诊断价值较小，且会浪费宝贵的时间。因此，选项A不妥。

13. 姚某,女,78岁。因意识模糊,频繁呕吐,诊断为脑出血入院。身体评估:血压208/120mmHg, 右侧瞳孔大,左侧偏瘫。目前应禁止使用的护理措施为()

A、绝对卧床休息,头偏向一侧

B、遵嘱应用脱水降低颅压

C、将瘫痪肢体置于功能位

D、吸氧

E、采用灌肠保持大便通畅

答案:

E

解析: 本题考查对脑出血患者的护理措施的了解。根据题干中提到的“频繁呕吐”和“血压 208/120mmHg ”等信息,可以判断患者可能存在颅内压增高的情况,因此应禁止使用脱水降低颅压的护理措施(选项 B)。绝对卧床休息、头偏向一侧和将瘫痪肢体置于功能位是脑卒中患者的常规护理措施,但本题中并未提及患者是否存在脑卒中,因此不能确定是否适用(选项 A、C)。吸氧可以提高血氧饱和度,但并不能直接缓解颅内压增高的症状,因此不是本题的答案(选项 D)。采用灌肠保持大便通畅可以减少腹部压力,缓解颅内压增高的症状,因此是本题的正确答案(选项 E)。综上所述,本题的答案为 E。

14. 尿常规检查需何时留取尿标本()

A、饭前半小时

B、晨起第一次尿

C、12h 尿

D、24h 尿

E、随时收集尿液

答案：

B

解析：尿常规检查是一种常见的临床检查方法，可以通过检查尿液中的各种成分来判断身体的健康状况。在进行尿常规检查时，需要留取一定量的尿液作为标本进行检测。那么，何时留取尿标本呢？ A 选项：饭前半小时。这个选项是错误的。饭前半小时留取的尿液可能会受到饮食的影响，不利于检测结果的准确性。 B 选项：晨起第一次尿。这个选项是正确的。晨起第一次尿液是最为浓缩的，可以反映出身体的基础代谢情况，是进行尿常规检查的最佳时间。 C 选项：12h 尿。这个选项是错误的。12h 尿是指收集 12 小时内的所有尿液，这种方法一般用于检测尿中的某些特定成分，不适用于尿常规检查。 D 选项：24h 尿。这个选项也是错误的。24h 尿是指收集 24 小时内的所有尿液，同样不适用于尿常规检查。 E 选项：随时收集尿液。这个选项是不准确的。随时收集的尿液可能会受到饮食、运动等因素的影响，不利于检测结果的准确性。综上所述，正确答案为 B 选项：晨起第一次尿。

15. 肌内注射时帮助患者取适当体位，使注射部位肌肉放松常用注射姿势（ ）

A、侧卧位：上腿伸直并放松，下腿稍弯曲

B、侧卧位：上腿弯曲，下腿稍伸直并放松

C、仰卧位：常用于危重患者及不能翻身的患者

D、坐位：坐位要稍高便于操作

E、俯卧位：足尖相对，足跟分开，头偏向一侧

答案：

A

解析：本题考查肌肉注射时患者取适当体位的常用注射姿势。肌肉注射时，应选择患者肌肉放松的体位，以便注射药物能够更好地渗透到肌肉内。根据选项，A 选项侧卧位上腿伸直并放松，下腿稍弯曲，是常用的肌肉注射姿势，符合题意，故选 A。B 选项上腿弯曲，下腿稍伸直并放松，不是常用的肌肉注射姿势；C 选项仰卧位常用于危重患者及不能翻身的患者，不是常用的肌肉注射姿势；D 选项坐位要稍高便于操作，不是常用的肌肉注射姿势；E 选项俯卧位足尖相对，足跟分开，头偏向一侧，不是常用的肌肉注射姿势。因此，本题正确答案为 A。

16. 膝胸卧位适用于矫正孕妇胎儿体位、子宫复位等。每次不超过()

A、5 分钟

B、10 分钟

C、15 分钟

D、20 分钟

E、30 分钟

答案：

C

解析：本题考查膝胸卧位的适用时间。膝胸卧位是一种常见的产前矫正体位，适用于矫正孕妇胎儿体位、子宫复位等。但是，由于膝胸卧位会增加孕妇和胎儿的心肺负担，因此每次使用的时间应该控制在一定范围内。根据常规临床实践，膝胸卧位的适用时间一般不超过 15 分钟，因此本题的答案为 C。其他选项的时间都过长，可能会对孕妇和胎儿的健康产生不良影响。

17. 为病人取半坐卧位时，需注意床头支架与床的角度应成（ ）

A、 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$

B、 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

C、 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$

D、 $50^{\circ} \sim 70^{\circ}$

E、 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$

答案：

C

解析：病人取半坐卧位时，床头支架与床的角度应该适中，既能保证病人的舒适度，又能保证病人的呼吸道通畅。根据常规操作，床头支架与床的角度应该在 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ 之间，因此本题的正确答案为 C。

18. 患儿，男，1 岁 5 个月，因急性肺炎住院，肌内注射选择的最佳部位是（ ）

A、上臂三角肌下缘

B、臀大肌

C、臀中肌、臀小肌

D、股内侧肌

E、三角肌

答案：

C

解析：本题考查的是肌肉注射的部位选择。肌肉注射是将药物注射到肌肉中，使药物迅速吸收到血液中，起到快速治疗的作用。在选择注射部位时，需要考虑到肌肉的大小、深度、血管和神经的分布等因素。A选项上臂三角肌下缘是肌肉较小的部位，不太适合肌肉注射。B选项臀大肌是肌肉较大的部位，但是由于臀大肌与坐骨神经和股神经有关，注射时容易损伤神经，不太安全。D选项股内侧肌是肌肉较小的部位，不太适合肌肉注射。E选项三角肌是肌肉较小的部位，不太适合肌肉注射。因此，选择C选项臀中肌、臀小肌是最佳的肌肉注射部位。臀中肌、臀小肌是肌肉较大、深度适中、血管和神经分布较少的部位，注射时相对安全，也能够使药物迅速吸收到血液中，起到快速治疗的作用。

19. 下列各项中病死率最高的脑卒中类型为（ ）

A、脑血栓形成

B、脑栓塞

C、TIA

D、脑出血

E、蛛网膜下腔出血

答案：

D

解析：脑卒中是指由于脑血管疾病引起的脑功能障碍，包括脑血栓形成、脑栓塞、脑出血和蛛网膜下腔出血等类型。病死率是指患者因疾病死亡的比例，是评估疾病严重程度的重要指标。根据统计数据，脑出血是脑卒中类型中病死率最高的，其病死率可达到 30% 以上。脑出血是指脑内血管破裂导致脑组织出血，病情严重，容易引起脑水肿、颅内压增高等并发症，治疗难度大。其他脑卒中类型的病死率相对较低，脑血栓形成和脑栓塞的病死率约为 10% 左右，TIA 的病死率很低，蛛网膜下腔出血的病死率也较低，但其后遗症较多。因此，本题的正确答案为 D，即脑出血是脑卒中类型中病死率最高的。

20. 宋先生，男，36 岁，急诊入院后病人呼吸由浅慢逐渐加深加快，又由深快逐渐变为浅慢，暂停 30 秒后再度出现上述状态的呼吸，该病人的呼吸是（ ）

A、潮式呼吸

B、毕奥呼吸

C、间断呼吸

D、鼾声呼吸

E、呼吸困难

答案:

A

解析: 根据题干中的描述,病人的呼吸由浅慢逐渐加深加快,又由深快逐渐变为浅慢,暂停 30 秒后再度出现上述状态的呼吸,可以判断出这是潮式呼吸。潮式呼吸是一种呼吸节律异常,呼吸深浅和频率逐渐加深加快,然后逐渐变浅变慢,最后暂停一段时间后再度出现上述状态的呼吸。因此,本题答案为 A。

21. 可疑患者贵重衣物可选用()进行消毒处理。

A、75% 酒精

B、含氯消毒剂

C、紫外线照射

D、高温蒸煮法

E、环氧乙烷方法

答案:

E

解析: 本题考查的是对可疑患者贵重衣物进行消毒处理的方法选择。根据题干中的“贵重衣物”可以排除掉高温蒸煮法和含氯消毒剂,因为这两种方法容易对衣物造成损坏。紫外线照射虽然可以消毒,但是对于衣物的消毒效果不够彻底。因此,正确答案应该是环氧乙烷方法,这种方法可以对衣物进行彻底的消毒处理,而且不会对衣物

造成损坏。75% 酒精虽然可以消毒，但是对于衣物的消毒效果也不够彻底，因此不是最佳选择。因此，本题的正确答案是 E。

22. 病人姚某，男，28 岁，持续高热数天，每日体温最高 40.3℃，最低 39.0℃，此热型符合（ ）

A、稽留热

B、弛张热

C、间歇热

D、不规则热

E、异常热

答案：

B

解析：本题考查热型的判断。根据题干中提供的信息，病人姚某的高热持续数天，每日体温最高 40.3℃，最低 39.0℃，这种热型属于弛张热。稽留热是指热度波动小，每日体温变化不超过 1℃；间歇热是指热度波动大，每日体温变化超过 1℃，但有规律地出现发热和退热的交替；不规则热是指热度波动大，每日体温变化超过 1℃，但没有规律地出现发热和退热的交替；异常热是指热度超过正常范围，但没有规律地出现发热和退热的交替。因此，本题答案为 B。

23. 属于医院感染的是（ ）

A、新生儿出生后 48 小时内诊断为弓形体病

- B、肺炎病人原有的慢性阑尾炎症在住院期间急性发作
- C、结核性胸膜炎病人入院 2 天后查出并发结核性脓胸
- D、上消化道大出血病人输血治疗四个月后诊断为“丙型肝炎”
- E、直肠癌病人手术后 5 天见切口缝合针眼处有少许分泌物

答案:

D

解析: 医院感染是指患者在医院内接受医疗过程中，由于医疗操作、医疗设备、医护人员等因素引起的新发或加重的感染。根据选项，只有 D 选项提到了患者在住院期间诊断出的疾病与医疗操作有关，因此 D 选项属于医院感染。其他选项与医疗操作无关，不属于医院感染。因此，本题答案为 D。

24. 患者，女，40 岁，因术后长期卧床，已三天未解大便，行饮食指导后效果不明显，遵医嘱予以灌肠，灌肠液的温度为（）

- A、39 -40 度
- B、39 -41 度
- C、38 -41 度
- D、38 -40 度
- E、38 -42 度

答案:

B

解析：本题考查对灌肠的基本知识。灌肠是一种通过直肠将液体注入肠道的方法，以刺激肠道蠕动，促进排便。灌肠液的温度应该与人体温度接近，一般在 39-41 度之间。选项中只有 B 符合要求，故选 B。

25. 患者张某,女性,意识不清,评估确认患者目前存在以下护理问题,你认为应该首先解决的问题是()

A、清理呼吸道无效

B、皮肤完整性受损

C、便秘

D、语言沟通障碍

E、营养失调 低于机体需要量

答案：

A

解析：本题考查护理问题的优先级排序。根据患者的病情，意识不清，首先需要保证呼吸道通畅，否则会影响患者的生命安全。因此，应该首先解决清理呼吸道无效的问题。其他选项也需要关注和解决，但不如呼吸道问题紧急。因此，答案为 A。

26. 患者女性，20 岁。因癫痫收治入院，今日早晨洗漱回病房途中突然全身倒地，意识丧失、四肢抽搐，此时首要的处理措施是 ()

A、立即与家属将患者抬到床上，以防受伤

B、回治疗室拿电筒观察瞳孔变化

C、向医生汇报，尽快用药

D、脑电图检查

E、保持呼吸道通畅，防止窒息

答案：

E

27. 属于主观资料的是：()

A、体温 38℃

B、黄疸

C、发绀

D、头晕

E、颈项强直

答案：

D

解析：本题考查主观资料的概念。主观资料是指患者自己感觉到的症状或体验，如头晕、恶心、疼痛等，而客观资料是指医生通过检查、观察等手段得出的结果，如体

温、血压、血常规等。选项中只有 D 项“头晕”是主观资料，其他选项均为客观资料。因此，答案为 D。

28. 关于心电监护仪使用介绍不正确的是（ ）

- A、监护导联选择 P 波清晰的 II 导联
- B、安放电极片的位置应避免伤口、瘢痕
- C、测量血氧饱和度尽量首选测趾端
- D、电极片每 24h 予以更换
- E、密切观察心电图波形，主要避免各种干扰所致的伪差

答案：

C

解析：本题考查心电监护仪的正确使用方法。选项 A、B、D、E 均为正确的使用方法，而选项 C 不正确。测量血氧饱和度应该选择测量手指或耳垂等部位，而不是趾端。因此，选项 C 为本题答案。

29. 陈先生，66 岁，护士为其测量血压，为与第一次测量辨别，需重新测量，下述何项做法错误（ ）

- A、将袖带内气体驱尽
- B、使汞柱降至 0 点
- C、稍等片刻后重测

D、连续加压直到听清为止

E、测量值先读收缩压，后读舒张压

答案：

D

解析：本题考查的是正确测量血压的方法。选项 A、B、C、E 都是正确的做法，而选项 D 是错误的。连续加压直到听清为止会导致血压值偏高，不符合实际情况。正确的做法是逐渐加压，直到听到第一次心跳声，然后再逐渐减压，直到听到最后一次心跳声，此时的压力就是舒张压。再继续减压，直到听不到心跳声，此时的压力就是收缩压。因此，选项 D 是错误的。

30. 为肝性脑病患者灌肠时,应选用的溶液是()

A、温水

B、生理盐水或弱酸性溶液

C、2% 碳酸氢钠溶液

D、肥皂水

E、苏打水

答案：

B

解析：肝性脑病是由肝功能衰竭引起的一种脑部疾病，常见的症状包括意识障碍、精神异常等。灌肠是一种治疗肝性脑病的方法，可以通过清除肠道内的毒素来缓解症状。在灌肠时，应选用生理盐水或弱酸性溶液，因为这些溶液对肠道刺激小，不会引起肠道反应，同时也不会对肝脏造成负担。其他选项如温水、碳酸氢钠溶液、肥皂水、苏打水等都不适合作为灌肠溶液，因为它们可能会对肠道和肝脏造成刺激或损伤。因此，本题的正确答案是 B。

31. 测血压放气速度: ()

A、1mmHg/ 秒

B、2mmHg/ 秒

C、3mmHg/ 秒

D、4mmHg/ 秒

E、5mmHg/ 秒

答案：

D

解析：测血压时，需要通过放气速度来控制血压计的压力下降速度，以便准确测量血压值。放气速度越快，血压计的压力下降速度就越快，测量出的血压值就越低。反之，放气速度越慢，血压计的压力下降速度就越慢，测量出的血压值就越高。根据常规的测量方法，测血压时的放气速度应该是每秒 4 毫米汞柱。因此，本题的正确答案为 D，即 4mmHg/ 秒。

32. 患者男性,76 岁,以“COPD ”收住院,护士在收集资料时认为目前存在以下问题,属于首优问题的是()

A、疼痛

B、恐惧

C、清理呼吸道无效

D、知识缺乏

E、营养不良

答案:

C

解析: 本题考查的是护理学中的优先问题,即护理中需要优先解决的问题。根据题干中提供的信息,患者是因为“COPD ”收住院,因此呼吸道清理是非常重要的问题,也是首要问题。因此,答案为 C。其他选项中,疼痛、恐惧、知识缺乏和营养不良也是需要关注的问题,但在这个情况下,呼吸道清理是最紧急的问题。

33. 患者可以复印或复制的病历资料包括内容不正确的是()

A、门诊急诊病历和入院记录

B、三测单、医嘱单、化验单、医学影像检查

C、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录

D、病历报告、护理记录、出院记录

E、病理报告、住院病志记录、出院记录

答案:

E

解析: 本题考查患者可以复印或复制的病历资料，正确的选项应该是包括的，而不是不包括的。因此，选项 E 中的“病理报告、住院病志记录、出院记录”是患者可以复印或复制的病历资料，而其他选项中的内容也都是可以复印或复制的。因此，本题的正确答案是 E。

34. 患者，男性，46 岁，因贫血入院，遵医嘱静脉输血，对于全血制品应于（ ）小时内输完

A、3

B、4

C、5

D、2

E、3.5

答案:

B

解析：本题考查对于全血制品输注速度的掌握。全血制品是指含有红细胞、白细胞、血小板和血浆等成分的血液制品。对于输注速度，一般情况下应该在4小时内输完，以避免输血反应和其他不良反应的发生。因此，本题的正确答案为B。

35. 男性, 13岁, 半月全身浮肿, 乏力。尿蛋白(++++)，定量4.0g/24h, 镜检偶见沉渣细胞和透明管型。血压120/80mmHg, 血浆白蛋白29g/L。BUN5mmol/L, 血清肌酐98umol/L, 胆固醇, 甘油三酯升高, 该临床诊断是()

- A、急性肾炎综合征
- B、急进性肾炎综合征
- C、慢性肾炎综合征
- D、肾病综合征
- E、肾病综合征并发急性肾炎综合征

答案：

D

解析：根据病史和检查结果，该患者出现了半月全身浮肿、乏力、尿蛋白大量增加、血浆白蛋白降低、血压正常、血清肌酐轻度升高等症状和体征，符合肾病综合征的诊断标准。因此，选项D为正确答案。其他选项中，急性肾炎综合征和急进性肾炎综合征通常表现为急性起病，病情进展迅速，而该患者病程较长，不符合急性或急进性肾炎综合征的特点。慢性肾炎综合征通常表现为慢性起病，病程较长，而该患者病程较短，不符合慢性肾炎综合征的特点。肾病综合征并发急性肾炎综合征通常表现为急性

起病，病情进展迅速，而该患者病程较长，不符合肾病综合征并发急性肾炎综合征的特点。

36. 指导出院后继续服药的患者应该(服药

A、按时、正确、安全

B、按时、足量、正确

C、按时、足量、全程

D、规律、全程、足量

E、根据不适随时调节

答案:

A

解析: 本题考查出院后患者继续服药的指导。正确的指导应该包括三个方面：时间、剂量和方法。选项 A 中的“按时、正确、安全”恰好涵盖了这三个方面，因此是正确答案。选项 B 中的“足量”虽然也是重要的，但是没有涵盖“安全”的概念。选项 C 中的“全程”虽然也是重要的，但是没有涵盖“正确”的概念。选项 D 中的“规律”虽然也是重要的，但是没有涵盖“安全”的概念。选项 E 中的“根据不适随时调节”虽然也是重要的，但是没有涵盖“正确”和“安全”的概念。因此，选项 A 是正确答案。

37. 输液时液体滴入不畅，局部肿胀，检查无回血，此时应()

A、改变针头方向

B、更换针头重新穿刺

C、抬高输液瓶位置

D、局部热敷

E、用注射器推注

答案:

B

解析: 本题考查的是输液时出现滴入不畅、局部肿胀的处理方法。根据常规操作, 当出现此情况时, 应该首先检查针头是否堵塞, 如果堵塞应该更换针头重新穿刺。因此, 本题的正确答案为 B。其他选项的处理方法不够妥当, 不符合常规操作。

38. 吴某,男, 36 岁, 因脑外伤后昏迷入院, 护士为其留置鼻胃管提供营养, 插管至 15cm 处时要将其头部托起的目的是()

A、加大咽喉部通道的弧度

B、以免损伤食管黏膜

C、减轻病人痛苦

D、避免出现恶心

E、使喉部肌肉放松便于插入

答案:

A

解析：本题考查对于鼻胃管插入的相关知识。插管时要将病人头部托起的目的是加大咽喉部通道的弧度，使插管更加顺畅，避免损伤食管黏膜。因此，选项 A 正确。选项 B、C、D、E 都不是插管时将病人头部托起的目的。

39. 喉上神经内侧支损伤出现()

A、饮水呛咳

B、声调降低

C、呼吸困难

D、吞咽困难

E、声音嘶哑

答案：

A

解析：喉上神经内侧支是喉部的主要运动神经，主要支配喉软骨肌和喉腔内的黏膜肌。当喉上神经内侧支损伤时，会影响喉部的运动功能，导致饮水呛咳。因此，答案为 A。其他选项与喉上神经内侧支损伤不相关。

40. 刘先生，25 岁，肺炎已 1 周，体温正常 2 日，昨夜突然高热、呼吸急促、咳嗽、胸痛。体格检查：右侧肋间隙饱满，语颤音减弱。辅助检查：胸部 X 线示右侧胸腔呈现大片浓密阴影。血常规示白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比值 85%。右侧胸腔穿刺抽出少许稀薄脓性液体。临床诊断考虑为急性脓胸。以下护理措施错误的是()

- A、指导病人做胸式深呼吸
- B、物理降温
- C、适当镇痛
- D、协助病人定时翻身
- E、如予引流，引流口周围皮肤涂氧化锌软膏

答案:

A

41. 下列属于临时医嘱的是 ()

- A、病危
- B、转科
- C、一级护理
- D、半流质饮食
- E、氧气吸入 prn

答案:

B

42. 张先生, 41岁, 与朋友聚餐后突发上腹部剧烈疼痛, 体格检查: 腹部膨隆, 上腹压痛明显, 有反跳痛和腹肌紧张。也下列处理不正确的是 ()

- A、禁食
- B、应用哌替啶镇痛
- C、应用抗生素控制感染
- D、半卧体位
- E、静脉输液

答案：

B

解析： 本题考查急性胰腺炎的处理。根据题干描述，张先生出现了急性胰腺炎的症状，应该采取以下处理措施：禁食、半卧体位、静脉输液。哌替啶是一种镇痛药，但不适用于急性胰腺炎的治疗，因为它会刺激胰腺分泌，加重病情。抗生素只有在有感染的情况下才需要使用，因此本题中不需要应用抗生素。因此，选项B 应该是不正确的处理措施。

43. 输血引起溶血反应，最早出现的主要表现为()

- A、头部胀痛、面部潮红、恶心、呕吐、腰背部剧痛
- B、寒战、高热
- C、呼吸困难、血压下降
- D、瘙痒、皮疹
- E、少尿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666032003114011004>