

临床知识测试题含参考答案

1、 异物引起的阻塞性肺炎常不出现：（ ）

- A、 小叶或小叶融合阴影
- B、 肺段实变
- C、 肺叶实变
- D、 肺门部肿块
- E、 肺体积缩小

答案：D

2、 某颅脑损伤致脑挫裂伤患者，其临床表现的描述不正确的是

- A、 脑脊液检查无红细胞
- B、 昏迷时间多在半小时以上
- C、 有局灶性症状、体征
- D、 脑膜刺激征阳性
- E、 头痛、呕吐

答案：A

3、 强迫症的临床表现中主要包括强迫行为和

- A、 强迫的感觉
- B、 强迫思维
- C、 强迫情绪
- D、 强迫的幻觉
- E、 重复语言

答案：B

4、 女，65岁，不明原因口唇和口腔黏膜发绀半天。化验血红蛋白浓度正常。该患者血氧饱和度至少应低于

- A、 0.85
- B、 0.75
- C、 0.7
- D、 0.9
- E、 0.8

答案：A

5、 小儿腹泻其脱水性质不明时，第1天静脉补液可选用的液体是

- A、 1/2张含钠溶液
- B、 1/3张含钠溶液
- C、 1/5张含钠溶液
- D、 2/3张含钠溶液

E、4:3:2 溶液

答案：A

6、放射性核素肺扫描有助于下列哪项引起胸痛疾病的诊断

A、肺炎

B、主动脉夹层动脉瘤

C、肺癌

D、急性心肌梗死

E、肺梗死

答案：E

7、胸部创伤的救治原则哪一项是错误的

A、纠正呼吸和循环功能紊乱

B、维持呼吸通畅、给氧；控制外出血、补充血容量

C、镇痛、固定骨折、保护脊柱

D、对于各种胸部创伤都要尽快实施急诊室开胸手术

E、开胸手术其手术抢救成功的关键是迅速缓解心脏压塞、控制出血、快速补充血容量和及时回收胸腔或心包内失血

答案：D

8、慢性阻塞性肺疾病患者的康复治疗注意事项不包括

A、环境适宜，避免在风沙、粉尘、寒冷、炎热、嘈杂的环境锻炼

B、方案个体化

C、锻炼时如果出现疲劳、乏力、头晕等症状，可休息后再锻炼

D、循序渐进，持之以恒

E、训练适度，避免过度换气综合征

答案：C

9、引起主动脉瓣关闭不全最常见的病因是

A、主动脉窦瘤

B、主动脉瓣脱垂

C、风湿性心脏病

D、升主动脉粥样硬化

E、马凡综合征

答案：C

10、2021版《规范》中，医学科研人员在涉及（ ）等研究中，要树立公共卫生和实验室生物安全意识

A、传染病

B、新发传染病

- C、不明原因疾病
- D、已知病原改造
- E、以上均是

答案：E

11、 对新发现的突发传染病，由（ ）决定宣布为甲类传染病

- A、县级人民政府
- B、省级人民政府
- C、卫健委
- D、市卫生行政主管部门
- E、国务院

答案：E

12、 从事生物医学新技术临床研究，应当通过（ ），并在具备相应条件的医疗机构内进行；进行人体临床研究操作的，应当由符合相应条件的卫生专业技术人员执行

- A、资质认可
- B、伦理审查
- C、技术备案
- D、技术认证

答案：B

13、 当怀疑病人心跳停止时，为迅速诊断，首先应该

- A、触摸桡动脉搏动
- B、听心音
- C、测血压
- D、触摸颈动脉或股动脉搏动
- E、连接心电图进行描记

答案：D

14、 尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是（ ）

- A、口服钠型阳离子交换树脂
- B、静脉滴注碳酸氢钠
- C、血液透析
- D、静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素
- E、静脉滴注葡萄糖酸钙

答案：C

15、 关于病原微生物实验室生物安全管理，下列那一项不符合实验室生物安全标准（ ）

A、从事病原微生物实验活动，应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程，采取安全防范措施

B、从事高致病性或者疑似高致病性病原微生物样本采集、保藏、运输活动，应当具备相应条件，符合生物安全管理规范

C、设立病原微生物实验室，应当依法取得批准或者进行备案。个人可以设立病原微生物实验室或者从事病原微生物实验活动

D、病原微生物实验室应当加强对实验活动废弃物的管理，依法对废水、废气以及其他废弃物进行处置，采取措施防止污染

答案：C

16、 以下哪一种症状不属于前列腺增生引起的膀胱出口梗阻症状

A、尿后滴沥

B、尿急

C、排尿迟缓

D、尿线细而无力

E、射程变短

答案：B

17、 上消化道大出血，发病急，出血凶猛，易致休克，出血常是

A、十二指肠溃疡出血

B、胃小弯溃疡出血

C、胃黏膜病变出血

D、胃体癌出血

E、门静脉高压症出血

答案：E

18、 一新生儿发生溶血，其可能的情况是

A、母亲 Rh 血型阳性，患儿 Rh 血型阳性

B、母亲 Rh 血型阳性，患儿 Rh 血型阴性

C、母亲 Rh 血型阴性，患儿 Rh 血型阴性

D、母亲 Rh 血型阴性，患儿 Rh 血型阳性

E、以上都不是

答案：D

19、 患者，男性，30岁，因工伤致右锁骨骨折，行切开复位内固定术。下列麻醉选择中错误的是（ ）

A、术中注意观察患者，防止出现局麻药中毒反应

B、患者坚决要求可采用全麻

C、可加用肾上腺素

- D、腋路臂丛阻滞
- E、肌间沟臂丛阻滞

答案：D

20、室间隔缺损可引起心脏下列各部位负荷增加但除了

- A、肺循环
- B、左心室
- C、右心房
- D、左心房
- E、右心室

答案：C

21、患者，女性，30岁。便秘2年，近半月来大便时肛门疼痛，粪便表面及便纸上附有鲜血，其诊断最可能是

- A、内痔
- B、肛裂
- C、肛瘘
- D、直肠癌
- E、外痔

答案：B

22、下列不属于恶性溃疡（癌溃疡）典型内镜下表现的是

- A、溃疡底部不平滑
- B、溃疡不规则
- C、活检组织脆
- D、溃疡周边参差不齐
- E、溃疡周边光滑

答案：E

23、预激综合征合并快速心房颤动，伴血压下降时，首选治疗是

- A、Valsava动作
- B、直流电复律
- C、射频导管消融
- D、胺碘酮静注
- E、食管心房调搏超速抑制

答案：B

24、低渗性脱水时体液容量的变化正确的为

- A、细胞内液显著减少，细胞外液正常
- B、细胞外液减少，细胞内液正常

- C、细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少
- D、细胞内液显著减少，细胞外液轻度减少
- E、细胞内外液均明显减少

答案：C

25、 休克病人中心静脉压为 5 cmH₂O， 血压 80/65 mmHg。 处理原则为

- A、 适当补液
- B、 使用强心药物
- C、 使用扩血管药
- D、 补液试验
- E、 充分补液扩容

答案：E

26、 关于纵隔肿瘤症状， 下述哪项是错误的

- A、 其症状的程度及发生时间与肿瘤的部位， 生长速度相关
- B、 大部分患者在体检时偶然发现
- C、 每一类肿瘤都有相应的症状
- D、 一部分患者有胸闷， 胸痛症状
- E、 一部分患者有压迫相应器官的症状

答案：C

27、 新冠肺炎实验室检查， 错误的是（ ）

- A、 重型， 危重型患者可见炎症因子升高
- B、 发病早期外周血白细胞总数增高
- C、 多数患者 CRP 和 ESR 升高， 降钙素原正常
- D、 部分患者出现肝酶， LDH， 肌酶、 肌红蛋白、 肌钙蛋白和铁蛋白增高
- E、 重型， 危重型患者可见 D-二聚体升高

答案：B

28、 评价阻塞性通气功能障碍最主要的指标是

- A、 FEV_{1.0}
- B、 PEF
- C、 FEV_{1.0}/FVC
- D、 FVC
- E、 MMEF

答案：C

29、 下列哪项最有助于区别心绞痛与心肌梗死

- A、 疼痛部位
- B、 有无心率增快

- C、疼痛性质
- D、有无发热
- E、心电图变化

答案：E

30、女，60岁，突感心前区疼痛，血压70/50 mmHg，经用右旋糖酐40、多巴胺、间羟胺等处理后血压仍不升，中心静脉压18 cmH₂O，四肢厥冷且发绀。应给予以下哪项处理（ ）

- A、硝普钠
- B、去甲肾上腺素
- C、毛花苷C
- D、异丙肾上腺素
- E、呋塞米

答案：A

31、建筑工人不慎坠楼，腰剧痛，双下肢感觉运动障碍，二便功能障碍。除手术外，伤后早期最重要的治疗措施是

- A、防止压疮
- B、留置尿管
- C、甘露醇与大剂量糖皮质激素
- D、止痛剂
- E、抗生素

答案：A

32、某新生儿，孕36周分娩，出生体重2.1kg，母乳喂养。生后3天出现黄疸，血清总胆红素180 μmol/L，大便正常，吃奶好，观察黄疸至生后2周末消失，故考虑为

- A、生理性黄疸
- B、Grigler-Najjar 综合征
- C、新生儿败血症
- D、新生儿溶血病
- E、先天性胆道闭锁

答案：A

33、临床手术与麻醉的特点不包括

- A、技术的复杂性
- B、病人或家属的多项要求
- C、损伤的必然性
- D、过程中的风险性

E、病人的被动性及术前的焦虑心理

答案：B

34、 脑梗死最常见病因

A、动脉粥样硬化

B、小动脉玻璃样变

C、动脉夹层

D、心源性栓塞

E、动脉炎

答案：A

35、 健康中国 2030 联防联控，成员单位共（ ）个部门

A、32

B、28

C、48

D、24

E、36

答案：A

36、 原发性甲状腺功能减退症最常见原因

A、甲状腺手术切除

B、使用抗甲状腺药物

C、自身免疫性甲状腺炎

D、碘过量

E、缺碘

答案：C

37、 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于

A、空气栓塞

B、胸膜过敏反应

C、抽液过多、过快，胸内压突然下降

D、穿刺损伤肺组织

E、穿刺损伤肺血管

答案：C

38、 新型冠状病毒确诊的首要标准是（ ）

A、抗体检测阳性

B、胸脯斑片状改变

C、核酸检测阳性

D、抗原检测阳性

E、发热症状

答案：C

39、 下列哪项是所有休克的根本特征

A、低氧血症

B、低血压

C、心动过速

D、少尿

E、组织灌注不足

答案：E

40、 根据突发事件应急处理的需要，突发事件应急处理指挥部有权（ ）

A、调集人员

B、必要时对人员进行疏散或者隔离

C、紧急调集交通工具以及相关设施、设备

D、依法对传染病疫区实行封锁

E、以上都是

答案：E

41、 II型糖尿病患者最常见的死亡原因是

A、低血糖

B、糖尿病肾病

C、酮症酸中毒

D、感染

E、心脑血管意外

答案：E

42、 急性酒精中毒的临床表现分期或分度中不包括

A、昏睡期

B、躁狂期

C、共济失调期

D、轻度、中度、重度

E、兴奋期

答案：B

43、 下列出现异常支气管呼吸音的肺疾病是

A、肺脓肿

B、阻塞性肺气肿

C、大叶性肺炎实变期

D、空洞型肺结核

E、胸腔积液（中等量）

答案：B

44、急性心梗并发心源性休克的主要原因是：

A、血管床增大而有效循环血量不足

B、周围血管扩张

C、心排血量急剧降低

D、迷走神经兴奋性增加

E、窦性心动过速

答案：C

45、耶鲁大学医学院科研不端事件发生在（ ）

A、1979年

B、1980年

C、1981年

D、1982年

E、1983年

答案：A

46、2021版《医学科研诚信和相关行为规范》第一条里增加的依据规定，描述错误的是（ ）

A、《中华人民共和国著作权法》

B、《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》

C、《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》

D、《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》

E、《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

答案：A

47、下面哪种激素不是腺垂体分泌

A、生长激素

B、促性腺激素

C、泌乳素

D、血管升压素

E、促肾上腺皮质激素

答案：D

48、子宫颈癌与下列哪种病毒感染有关

A、HCV

B、HIV

C、HPV

D、HGV

E、HBV

答案：C

49、《医学科研诚信和相关行为规范》适用于（ ）

A、从事医学研究的所有人员

B、医学研究的全过程

C、基础医学、临床医学

D、中医学与中药学

E、以上均是

答案：E

50、急性亚硝酸盐类中毒的特效解毒药是（ ）

A、亚甲蓝

B、二巯丙磺酸钠

C、氟马西尼

D、乙酰胺

E、纳洛酮

答案：A

51、医疗机构、专业机构及其工作人员发现传染病、动植物疫病或者不明原因的聚集性疾病的，应当（ ）

A、开展主动监测和病原检测，并纳入国家生物安全风险监测预警体系

B、根据预测和职责权限及时发布预警，并采取相应的防控措施

C、及时报告，并采取保护性措施

D、开展主动监测，收集、分析、报告监测信息，预测新发突发传染病、动植物疫病的发生、流行趋势

答案：C

52、预防局麻药毒性反应，下列措施中错误的是（ ）

A、每次注药不要超过极量

B、每次注药前，均应回抽，防止误入血管

C、对高危病人应加强监测

D、有局麻药过敏者，不宜使用

E、注药时不能注入太深的组织

答案：E

53、解除支气管痉挛、改善呼吸困难最为有效的药物是

A、糖皮质激素

B、 β_2 受体兴奋剂

C、酮替芬

D、氨茶碱

答案：B

54、 大于（ ）岁老年人为新冠肺炎重症，危重症高危人群

A、55

B、65

C、50

D、45

E、60

答案：E

55、 在呼吸系统疾病中，突发呼吸困难（吸气或呼气）或和哮鸣音，下列最多见的情况是

A、肺疾病

B、胸廓疾病

C、膈肌运动受限

D、气道梗阻

E、神经肌肉疾病

答案：D

56、 婴儿最常见的腹部肿瘤是

A、肾错构瘤

B、肾盂癌

C、肾母细胞瘤

D、肾上腺神经母细胞瘤

E、肾癌

答案：C

57、 腰麻的并发症中，下列选项中由细菌感染引起的是（ ）

A、脑神经麻痹

B、化脓性脑膜炎

C、假性脑膜炎

D、马尾综合征

E、脊髓炎

答案：B

58、 患儿女性，4天，生后2小时反复抽搐入院。查体：神志尚清，眼距宽，耳位低，小颌，以下哪项检查最具有诊断价值？

A、血钙+心电图

- B、淋巴结活检
- C、血糖+头颅 CT
- D、血清免疫球蛋白测定
- E、胸部 X 线检查胸腺影+血钙

答案：E

59、男，49岁，心电图示 PR 间期固定，且大于 0.21 秒，无 QRS 波群脱落。最可能的诊断是

- A、一度房室传导阻滞
- B、窦性心律不齐
- C、二度 II 型房室传导阻滞
- D、窦性心动过缓
- E、二度 I 型房室传导阻滞

答案：A

60、重度脑挫伤后出现的高热，其原因主要为（ ）

- A、体温调节中枢功能失常
- B、感染性发热
- C、内分泌、代谢障碍
- D、无菌性坏死物质吸收
- E、自主神经功能紊乱

答案：A

61、引起小儿脊柱后凸最常见的原因是

- A、结核
- B、外伤
- C、肿瘤
- D、强直性脊柱炎
- E、佝偻病

答案：E

62、急性胸外伤中绝对必须进行紧急开胸探查的手术指征是

- A、张力性气胸
- B、多根多处肋骨骨折合并血气胸
- C、胸内子弹留存
- D、气胸闭式引流后仍持续大量漏气

答案：D

63、2021 版《规范》中，医学科研人员在研究结束后，对于（ ）要遵循相应的生物安全和科研管理规定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666205145041011005>