

## 神经系统疾病护理练习题

### 一. 单项选择题

1. 以下哪项属于深感觉

A. 痛觉

B. 温觉

C. 触觉

D. 地点觉

E. 两点鉴别觉

2. 某下肢瘫痪者，经查肢体不可以自行抬起，此肌力应判断为

A. 0级

B. 1级

C. 2级

D. 3级

E. 4级

3. 以下瘫痪病人的呼吸道护理，哪项是错误的

A. 室内空气流通、保暖

B. 激励病人尽量咳嗽、排痰

C. 喂食要慢一面呛入气管

D. 注意口腔护理

E. 对分泌物好多而咳嗽无力者应先翻身后吸痰

4. 一般脑血栓形成患者，初期进行患肢功能锻炼宜在发病后几日进行

A. 3 天

B. 1 周

C. 2 周

D. 3 周

E. 4 周

5. 瘫痪患者最常有的并发症是

A. 肺部感染

B. 尿路感染

C. 便秘

D. 褥疮

E. 静脉炎 6. 头痛病人防备使劲排便的主要意义是防备

A. 呕吐

B. 脑血栓形成

C. 颅内压增高

D. 心脏负荷增添

E. 心绞痛发生

7. 以下哪项是脑膜刺激征

A. 巴彬斯基征

B. 戈登征

C. 克匿格征

D. 奥本海姆征

E.霍夫曼征 8.深昏倒是最重要的体征是

A.瞳孔反射消逝

B.压眶反射愚痴

C.病理反射阴性

D.角膜反射减弱

E.吞咽反射亢进

9.我国目前最常有的脑血管壁疾病是

A.脑出血

B.蛛网膜下腔出血

C.脑血栓形成

D.脑栓塞

E.短暂性脑缺血发生 (TIA)

1

0."惹起脑出血最常有的原由是

A.高血糖

B.脑动脉硬化

C.颈动脉硬化

D.脑动脉瘤

E.脑血管畸形

1

1."高血压脑出血的最常有的破碎血管是

A.大脑中动脉

B.颈内动脉

C.颈外动脉

D.豆纹动脉

E.基底动脉

1

2."高血压脑出血最易发生在

A.内囊

B.中脑

C.桥脑

D.延脑

E.小脑

1

3."男性，25岁，突发强烈头痛，伴屡次呕吐，继之神志不清。检查：

体温

36."8℃,颈抗，肺无异样，肢体无偏瘫，您考虑为

A.脑出血

B.脑血栓形成

C.脑肿瘤

D.蛛网膜下腔出血

E.脑栓塞

14、"脑血栓形成的临床表现不包含:

- A.失语
- B.意识阻拦
- C.血性脑脊液
- D.偏瘫
- E.偏盲

15、"患者意识不清,伴有躁动不安,错睡,幻觉或信口雌黄等精神症状,属于:

- A.昏倒
- B.谵妄
- C.妄图
- D.昏睡
- E.晕厥

16、"蛛网膜下腔出血急性期应绝对卧床歇息:

- A.48 小时
- B.7 天
- C.2 周
- D.3 周
- E.4 周

17、"癫痫发生时护理错误的选项是:

- A.让患者就地平卧
- B.立刻喂抗癫痫药

C.实时给氧

D.防备舌咬伤

E.专人陪同

18、"脑拥堵发病时间常在:

A.强烈运动时

B.睡眠或沉静时

C.情绪激动时

D.感觉风寒时

E.血压强烈高升时

19、"患者出现病理性倦睡时可被唤醒,但一旦刺激停止后又快速入眠,此种意识阻拦是:

A.嗜睡

B.昏睡

C.昏倒

D.幻觉

E.错觉

2

0."以下那项检查不可以鉴别中枢性瘫和四周性瘫:

A.肌萎缩

B.腱反射

C.病理反射

D.肌力

E.肌张力

21."以下那项不属于一般感觉:

A.痛温觉

B.触觉

C.视,听觉

D.地点觉,震动觉

E.两点鉴别觉

22."最能反映昏倒病人病情的体征变化是

A. 体温

B. 脉搏

C. 呼吸

D. 瞳孔

E. 神志

23."短暂性脑缺血发生

A. 连续时间不超出 1h

B. 连续时间不超出 24h

C. 连续时间不超出 2 天

D. 连续时间不超出 1 周

E. 连续时间不超出 3 周

24."一面神经瘫患者依据下边那项可诊为中枢性面瘫:

- A.患侧鼻唇沟变浅
- B.额纹对称,双目闭合不全
- C.患侧不可以鼓腮
- D.食品贮留于患侧齿颊间
- E.口角向健侧倾斜

25."下边那种药物易惹起多发性神经炎:

- A.青霉素
- B.土霉素
- C.链霉素
- D.红霉素
- E.痢特灵

26."对于格林---巴利氏综合症正确的选项是:

- A.瘫痪只限于四肢肌
- B.常有括约肌阻拦
- C.常有腓肠肌悲伤
- D.颅神经伤害少见
- E.发病即见脑脊液蛋白---细胞分别

27."格林---巴利氏综合症最危险的表现:

- A.四肢缓和性瘫痪
- B.呼吸肌受累
- C.面神经瘫



D. 吐咽困难

E. 发生褥疮

28." 依据下边哪项可最后确诊为格林---巴利氏综合症:

A. 发病前 1~3 周有感染史

B. 四肢缓和性瘫痪

C. 呼吸肌麻木

D. 颅神经瘫痪

E. 脑脊液蛋白----细胞分离

29." 男患 62 岁, 血压 184/94mmHg, 晚间出现右边肢体麻木, 次晨右肢无力, 夜晚右肢不可以行动, 神志清可自述病史, 可能为:

A. 脑出血

B. 蛛网膜下腔出血

C. 脑血栓形成

D. 脑栓塞

E. 急性脊髓炎

30." 癫痫病人的发生种类, 临床上最常有的是

A. 简单部分性发生

B. 复发部分性发生

C. 纯真失神发生

D. 强直阵挛发生

E. 癫痫连续状态

31."内囊出血的表现正确的选项是:

- A.深昏倒少见
- B.初期软瘫,恢复期硬瘫
- C.瞳孔常对称等大
- D.脑脊液清明无色
- E.一般在2~3周均可恢复

32."防备脑出血病人出血加重应:

- A.切勿任意挪动病人
- B.大批给止血药物
- C.适合控制高血压
- D.降低颅内压
- E.吸氧

33."惹起蛛网膜下腔出血的常有的原由是:

- A.颅内先本性动脉瘤破碎
- B.动脉粥样硬化
- C.脑血管畸形
- D.血液病
- E.以上都不是

34."蛛网膜下腔出血的主要诊疗依据是:

- A.起病急骤
- B.头痛强烈, 呕吐屡次

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667050035153006041>