

1、偏瘫患者重要的姿势反射不包括 **E**

- A、非对称性紧张性颈反射
- B、对称性紧张性颈反射
- C、紧张性迷路反射
- D、紧张性腰反射
- E、吸吮反射

2、脑卒中的分类不包括 **D**

- A、TIA
- B、脑出血
- C、蛛网膜下腔出血
- D、硬膜外血肿
- E、脑梗死

3、手法肌力检查时，肢体活动是 **A**

- A、主动运动
- B、被动运动
- C、借助运动
- D、主动借助运动
- E、抗阻运动

4、脑卒中是什么原因造成的疾病 **A**

- A、脑血管病变
- B、脑外伤
- C、脑肿瘤
- D、脑炎症

E、脑部寄生虫

5、脑卒中患者去向最多的是 **C**

A、死亡

B、转入护理之家

C、转入家庭

D、转入康复机构

E、入疗养院

6、下列哪个是中频电疗法 **D**

A、直流电疗法

B、间动电疗法

C、分米波疗法

D、干扰电疗法

E、微波

7、偏瘫患者重要的姿势反射不包括 **E**

A、非对称性紧张性颈反射

B、对称性紧张性颈反射

C、紧张性迷路反射

D、紧张性腰反射

E、吸吮反射

8、偏瘫患者痉挛减弱，共同运动进一步减弱，分离运动增强：立位.髋伸展位能屈膝；立位.膝伸直.足稍向踏出.踝能背屈。此时为Brunnstrom分期 **E**

A、Ⅱ期

B、Ⅲ期

C、Ⅱ期

D、Ⅲ期

E、Ⅳ期

9、下面评定方法中哪项是评定偏瘫运动功能的 **D**

A、关节活动度

B、肌张力评定

C、痉挛评定

D、Brunnstrom 评定法

E、巴氏指数评定法

10、运动处方主要包括哪些要素 **E**

A、运动类型

B、运动强度

C、运动持续时间

D、运动频度

E、以上均是

11、为训练膀胱肌的功能，尿失禁的留置导尿管，定时开放尿管的时间应该是 **B**

A、每 1 小时一次

B、每 2 小时一次

C、每 3 小时一次

D、每 4 小时一次

E、每半小时一次

12、膝骨关节炎患者，膝部肿痛加重 2 天，皮温增高，首选的物理治疗为 **D**

A、蜡疗

- B、红外线
- C、干扰电疗法
- D、无热量超短波
- E、红斑量紫外线

13、康复治疗的五大支柱指 **B**

- A、理疗.体疗.针灸.按摩.作疗
- B、物理/运动疗法.作业疗法.言语矫治.心理治疗.康复工程
- C、理疗.体疗.矫形外科.假肢与矫形器.护理
- D、医疗康复.教育康复.职业康复.心理康复.社会康复
- E、理疗.体疗.心理.言语.社会服务

14、Brunnstrom 脑卒中恢复分为 **C**

- A、4 个阶段
- B、5 个阶段
- C、6 个阶段
- D、7 个阶段
- E、8 个阶段

15、正常人的运动形式来源于 **A**

- A、大脑皮层
- B、脑干
- C、脊髓
- D、外周神经
- E、肌肉

16、偏瘫患者痉挛开始减弱，出现一些脱离共同运动模式的分离运动：手能置于腰后；上肢前屈 90°（肘伸展）；屈肘 90°，前臂能旋前.旋后。此时为 Brunnstrom 分期 **D**

A、Ⅱ期

B、Ⅲ期

C、Ⅳ期

D、Ⅴ期

E、Ⅵ期

17、脑卒中恢复期坐位训练包括 **E**

A、正确姿势训练

B、头颈.躯干控制训练

C、偏瘫上肢训练

D、偏瘫下肢训练

E、以上都是

18、脑卒中患者进行插件治疗可产生哪些活动 **E**

A、肩前屈.肩外展

B、肩后伸

C、肩内旋

D、肩外旋

E、以上均是

19、肩周炎急性期的治疗原则包括 **E**

A、消炎镇痛

B、缓解痉挛

C、改善血液循环

D、预防功能障碍

E、以上都是

20、有一侧肢体功能障碍者脱衣物的顺序应该是 **A**

A、先健侧后患侧

B、先患侧后健侧

C、按操作者方便

D、按患者的习惯

E、以上均可

21、脑卒中患者进行圈和叉活动可利用那些工具 **E**

A、纸.地板

B、黑板

C、沙地

D、铅笔

E、以上均是

22、脑卒中康复治疗计划应在什么基础上建立 **B**

A、患者主诉

B、康复评定

C、CT 检查

D、MRI 检查

E、治疗师意见

23、脑卒中病人要完成独立步行需具备的条件不包括 **E**

A、单腿可独立负重

B、可主动屈髋

C、可主动屈膝

D、可主动屈踝

E、会利用拐杖

24、电疗分类正确的是 **A**

A、直流电.低频.中频.高频.静电疗法

B、直流电.低频.中频.脉冲.静电疗法

C、交流电.低频.中频.高频.静电疗法

D、交流电.低频.中频.脉冲.静电疗法

E、直流电.低频.中频.交流电.静电疗法

25、脑卒中急性期桥式运动的主要目的是 **A**

A、为以后改善偏瘫步态打基础

B、防治骨质疏松

C、防止血栓

D、防止肌肉萎缩

E、提高排便能力

26、可促进患者口语表达能力发展的活动是 **A**

A、社交活动

B、下棋

C、打篮球

D、绘画

E、打乒乓球

27、关节活动度检查可允许的误差范围是 **B**

A、2~4°

B、3~5°

C、4~6°

D、5~7°

E、6~8°

28、康复评定内容不包括 **B**

A、躯体功能评定

B、疾病性质评定

C、语言功能评定

D、精神心理功能评定

E、社会功能评定

29、脑卒中患者从坐位到立位训练的动作中哪项是错误的 **B**

A、患者坐直

B、双脚前后放在地上

C、足尖与膝盖成一直线

D、双手叉握带动躯干前伸

E、臀部移动站起

30、运动处方包括的内容，但除外 **C**

A、运动项目

B、运动强度

C、运动量的大小

D、运动的频率

E、运动的持续时间

31、Rood 技术中具有促进作用的感觉刺激方法为 **C**

A、轻微关节挤压

B、中度的温热刺激

C、快速擦刷

D、对肌腱止点处加压

E、持续牵伸

32、高位颈髓损伤病人可能达到的功能预后是 **A**

A、高度依赖

B、大部分依赖

C、生活大部分自理

D、生活完全不能自理

E、生活基本自理

33、脑卒中轻度失语症整体的长期目标是 **D**

A、回归家庭

B、生活自理

C、社区内交流

D、恢复职业

E、不设定目标

34、综合医院康复医学科至少应有 **D**

A、物理治疗

B、物理治疗与言语治疗

C、作业治疗

D、物理治疗与作业治疗

E、传统康复治疗

35、脑卒中患者进行插件治疗可产生哪些活动 **E**

A、肩前屈

B、肩外展

C、肩后伸

D、肩内旋外旋.

E、以上均是

36、用于描述治疗用紫外线照射剂量的单位为 **D**

A、时间单位

B、距离单位

C、面积单位

D、生物剂量

E、红斑量

37、脑卒中言语治疗的原则有 **E**

A、早期开始.及时评定

B、循序渐进

C、及时反馈

D、调动动机

E、以上均是

38、Brunnstrom 脑卒中恢复分为 **C**

A、4 个阶段

- B、5 个阶段
- C、6 个阶段
- D、7 个阶段
- E、8 个阶段

39、不属于康复主要领域的是 **C**

- A、医疗康复
- B、教育康复
- C、工程康复
- D、残疾康复
- E、社区康复

40、骨关节病软骨的生化改变，下列说法不正确的是 **E**

- A、水份含量明显减少
- B、I 型胶原蛋白增多
- C、胶原纤维变小，排列松弛紊乱
- D、蛋白聚糖含量减少
- E、透明质酸成分增多

41、关于一般日常生活活动对上肢活动度的要求，以下说法错误的有 **E**

- A、肩屈 5° - 45° （活动度 40° ）
- B、外展 5° - 30° （ 25° ）
- C、内旋 5° - 25° （ 20° ）
- D、以上都正确
- E、肘屈曲 90° - 130°

42、腰椎间盘突出症的康复首要方法 **A**

- A、卧床休息
- B、牵引
- C、手法治疗
- D、关节松动术
- E、电疗

43、好的作业疗法应具备哪些特点 **E**

- A、有明确目标.对改善功能可发挥作用
- B、患者可获得满足感
- C、训练项目与生活内容结合
- D、患者有兴趣
- E、以上均是

44、属于辐射热的物理治疗为 **E**

- A、蜡疗
- B、磁疗
- C、紫外线
- D、超短波
- E、红外线

45、脑卒中患者肢体功能恢复的标志是 **A**

- A、分离运动出现
- B、联合反应出现
- C、共同运动出现
- D、姿势反射出现

E、联合运动出现

46、紫外线治疗以生物剂量为单位，一个生物剂量也就是 **D**

A、最小照射距离

B、最大照射距离

C、最大红斑量

D、最小红斑量

E、以上都不是

47、肩周炎等临床分期不包括 **D**

A、疼痛期

B、急性期

C、粘连期

D、后遗症期

E、缓解期

48、绝大部分高频电疗的禁忌症 **A**

A、局部金属异物.植有心脏起搏器

B、慢性消化系统疾病

C、慢性炎症

D、骨关节炎

E、伤口愈合迟缓

49、脑卒中患者穿裤子的方法正确的是 **B**

A、先穿健侧

B、先穿患侧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668073114123006036>