

目 录

社会药房常见抗感染药物的合理选择与使用	1
名贵中药燕窝	3
上呼吸道感染、鼻炎	4
抗结核药物研究进展	7
化妆品经营管理实务	11
咳嗽变异性哮喘的诊治	13
零售药店常见质量管理问题及对策	14
《医疗器械经营监督管理办法》解析	17
高血压的药物治疗管理技能	19
肺胀的中药治疗	21
居家药学服务规范解读	23
我国现行药事法律责任解读及典型案例分析	26
中药与中药分类、中药材管理	28
妊娠期妇女用药安全及药学服务新模式	29
中医药防治艾滋病	30
药物制剂新技术	32
慢病患者药物治疗管理	34
居家合理用药和处方点评	36

如何做药学科普传播.....	39
糖尿病常见用药咨询问题.....	41
药品信息管理.....	43
《老年性高血压》.....	44
临床常用抗菌药物的规范使用及注意事项.....	45

2022 年四川执业药师继续教育试题和答案

社会药房常见抗感染药物的合理选择与使用

1

关于阿莫西林/克拉维酸，说法不正确的是（单选）

- A. 阿莫西林/克拉维酸抗菌谱广，且耐酶
- B. 克拉维酸不易透过中枢
- C. 口服吸收较好，不受胃酸和食物的影响
- D. 阿莫西林/克拉维酸不会诱导细菌产头孢菌素酶**

2

关于头孢呋辛、头孢克洛、头孢丙烯，说法正确的是（单选）

- A. 头孢克洛有静脉剂型，可序贯治疗
- B. 头孢呋辛对 β - 内酰胺酶高度稳定**
- C. 头孢克洛对肺炎链球菌效果良好
- D. 头孢丙烯是头孢菌素中最容易导致速发型超敏感反应的药物

3

患者，女性，28 岁，自诉哺乳期，右侧乳房疼痛、发红，伴发热

38.3℃，未形成脓肿且疼痛在可控的范围，患者表示不愿意暂停哺

乳，下列不适宜的治疗是（单选）

- A. 头孢克洛
- B. 头孢氨苄
- C. 左氧氟沙星**

D. 增加哺乳次数

4

患者，男性，32岁，自诉尿频、尿急、尿痛，下列治疗方案中不适宜的是（单选）

- A. 磷霉素氨丁三醇
- B. 左氧氟沙星
- C. 莫西沙星
- D. 环丙沙星

5

患者，男性，45岁，自诉不成型便7次/日，体温38.5℃，有里急后重感，大便常规查见白细胞，无腹部压痛，下列说法正确的是（单选）

- A. 患者属于重度腹泻，可选择三代头孢治疗
- B. 患者属于中度腹泻
- C. 患者可止泻+补液治疗即可
- D. 患者属于轻度腹泻

6

关于大环内酯类药物，下列说法不正确的是（单选）

- A. 红霉素为抑菌剂，对非典型菌有效
- B. 红霉素对胃酸稳定，因此有红霉素的口服制剂
- C. 克拉霉素可用于治疗幽门螺杆菌感染
- D. 阿奇霉素有抗生素后效应

7

关于妊娠期患者用药，下列说法正确的是（单选）

- A. 青霉素和头孢菌素类药物临床应用较多，妊娠期患者使用较为安全
- B. 法罗培南为β内酰胺类药物，因此其临床应用较多，妊娠期患者使用较为安全
- C. 喹诺酮类药物在任何情况下都不会影响胎儿发育
- D. 克拉霉素为妊娠B级药物

8

下列药物中，老年患者使用对心功能和肾功能影响最小的是（单选）

- A. 头孢氨苄
- B. 莫西沙星
- C. 头孢克肟
- D. 阿米卡星

9

喹诺酮类药物中，对结核分枝杆菌无效的是（单选）

- A. 左氧氟沙星
- B. 环丙沙星
- C. 莫西沙星
- D. 奈诺沙星

10

在制定抗感染治疗方案时，我们需要考虑的因素有（多选）

- A. 感染的部位和感染的过程
- B. 抗感染药物的抗菌谱和药代动力学特点
- C. 可能感染的致病菌
- D. 患者的病史和用药史

名贵中药燕窝

1

产燕窝的金丝燕大都分布在：（多选）

- A. 印尼
- B. 马来西亚
- C. 泰国
- D. 越南

2

燕窝的加工流程不包括以下的哪个步骤？（单选）

- A. 分类
- B. 磨削
- C. 洗刷
- D. 晒干
- E. 挑毛
- F. 风干

3

燕窝按形状分，主要包含：（多选）

- A. 三角盏
- B. 平盏
- C. 圆盏
- D. 大三角盏

4

燕窝按颜色分，主要包含：（多选）

- A. 白燕
- B. 黄燕
- C. 血燕/红燕
- D. 紫燕

5

燕盏的挑毛方式：（多选）

- A. 干挑
- B. 半干挑
- C. 湿挑

6

燕窝的制成品包括以下哪些形式？（多选）

- A. 固体燕窝
- B. 冲泡型纯燕窝
- C. 即时型燕窝

7

燕窝常见的掺伪造假手段有？（多选）

- A. 染色
- B. 混淆
- C. 漂白
- D. 增重

8

燕窝的重量特征为：（单选）

- A. 4-7g
- B. 5-8g
- C. 7-9 个
- D. 9-10g

9

以下不属于涂胶燕窝鉴别特征的有：（单选）

- A. 燕盏密不透风
- B. 具有不正常反光特点
- C. 质感略硬
- D. 水浸后稍膨胀、略具胶性

10

干燕窝的保存条件应为：（多选）

- A. 冰箱冷藏密封保存（0-3 摄氏度）
- B. 每 15 天检查是否受潮，并更换朝向

C. 阴凉干燥通风，密封保存。

上呼吸道感染、鼻炎

1

急性上呼吸道细菌感染最常见的病原菌是：（单选）

- A. 溶血性链球菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 铜绿假单胞菌

2

哪些症状不符合急性鼻炎（单选）

- A. 发热、头痛
- B. 鼻塞及嗅觉障碍
- C. 鼻腔内有黄绿色脓性痂皮
- D. 流水样或粘性鼻涕
- E. 鼻黏膜充血

3

关于治疗急性扁桃体炎，错误的是：（单选）

- A. 应用抗生素首选青霉素
- B. 口咽局部用漱口水
- C. 必要时可用糖皮质激素
- D. 在炎症期可紧急手术，切除扁桃体
- E. 可行中医中药治疗

4

急性咽炎的主要症状是：（单选）

- A. 高热
- B. 头疼，咽干
- C. 咽干，鼻塞
- D. 咽痛，吞咽痛
- E. 咳嗽，声嘶，耳痛

5

引起过敏性鼻炎的主要介质是以下哪一种（单选）

- A. IgE

- B. IgG
- C. 乙酰胆碱
- D. 组胺
- E. IgA

6

常年性过敏性鼻炎鼻腔检查可见（单选）

- A. 鼻黏膜呈苍白色，明显水肿**
- B. 粘膜肥厚，暗红色，表面不平，呈桑葚状，鼻甲骨肥大
- C. 粘膜肿胀，暗红色，表面光滑
- D. 鼻和鼻道内多脓涕，豆腐渣样堆积物，有恶臭
- E. 鼻腔增大

7

过敏性鼻炎发作时，鼻粘膜苍白的的原因是：（单选）

- A. 鼻腔阻力血管收缩**
- B. 鼻腔容量血管扩张
- C. 毛细血管通透性增加
- D. 感觉神经敏感性增强
- E. 迷走神经敏感性增强

8

在诊断过敏性鼻炎时最有价值的是：（单选）

- A. 皮肤试验
- B. 血清 RAST
- C. 病史及临床检查**
- D. 食物激发试验
- E. 食谱排除试验

9

萎缩性鼻炎的治疗中不正确的是：（单选）

- A. 鼻腔冲洗：温生理盐水等，每日 1~2 次
- B. 鼻内用药：0.5%麻黄碱滴鼻**
- C. 手术治疗：鼻腔外侧壁内移加固定术、前鼻孔闭合术
- D. 全身治疗：补充维生素 A、B、C、D、E 等微量元素
- E. 禁烟、防尘

10

哪一个鼻窦发病机会相对较少？（单选）

- A. 上颌窦
- B. 额窦
- C. 筛窦
- D. 蝶窦**

11

急性上颌窦炎头痛有一定时间规律的原因是：（单选）

- A. 窦口位置与体位引流的关系
- B. 疾病严重程度
- C. 神经调节反射
- D. 致病菌不同
- E. 精神因素

12

急性化脓性额窦炎头痛特点：（单选）

- A. 晨起即有，逐渐加重，午后减轻，晚间消失
- B. 晨起即有，逐渐加重，午后减轻，晚间加重
- C. 晨起轻，午后加重
- D. 晨起轻，午后加重，晚间减轻
- E. 晨起即有，逐渐减轻，午后消失

13

急性筛窦炎典型的压痛部位：（单选）

- A. 鼻尖部
- B. 眉弓部
- C. 眶上部
- D. 前额部
- E. 内眦部

14

下列哪项不是慢性鼻窦炎的常见临床症状（单选）

- A. 鼻塞
- B. 嗅觉减退
- C. 恶臭
- D. 头面部胀痛
- E. 粘脓涕

15

慢性鼻窦炎最常用的药物治疗方式是：（单选）

- A. 白三烯拮抗剂
- B. 抗生素
- C. 鼻用减充血剂
- D. 鼻用糖皮质激素
- E. 黏液促排药物

抗结核药物研究进展

1

一线抗结核药物是治疗结核病的首选药物，一线抗结核药物不包括
() (单选)

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 阿米卡星

2

一线抗结核药物的特点包括 () (多选)

- A. 抗菌活性强
- B. 不良反应小
- C. 虽然不能杀灭快速增殖期的分枝杆菌，但可以杀灭慢速增殖期的分枝杆菌
- D. 患者比较容易耐受

3

下列抗结核药物中，必须与其他抗结核联合应用的是 () (单选)

- A. 对氨基水杨酸
- B. 利福平
- C. 异烟肼
- D. 链霉素

4

结核病的一线抗结核药物 () (单选)

- A. 结核菌素试验
- B. 利福平
- C. 占其干重的 60%
- D. 盐酸酒精

5

髋关节结核抗结核药物一般维持 () (单选)

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 2 年

6

结核病短程疗法联用高效抗结核药物一般不包括为（）（单选）

- A. 异烟肼
- B. 乙胺丁醇**
- C. 利福平
- D. 吡嗪酰胺

7

抗结核药物中不是杀菌药物有（）（单选）

- A. 对氨基水杨酸钠**
- B. 利福平
- C. 异烟肼
- D. 链霉素

8

下列药物不是二线抗结核药物的是（）（单选）

- A. 乙胺丁醇**
- B. 阿米卡星
- C. 异烟肼对氨基水杨酸盐
- D. 氧氟沙星

9

利福平抗结核杆菌的作用原理是（）（单选）

- A. 抑制 RNA 多聚酶**
- B. 抑制蛋白质合成
- C. 抑制分枝菌酸合成
- D. 抑制结核杆菌叶酸的代谢

10

异烟肼抗结核杆菌的作用原理是（）（单选）

- A. 抑制 RNA 多聚酶
- B. 抑制蛋白质合成
- C. 抑制分枝菌酸合成
- D. 抑制结核杆菌叶酸的代谢**

老年综合征及评估返回

1

老年综合评估的终极目标是：（单选）

- A. 及时发现患者潜在的功能缺陷
- B. 明确患者的医疗和护理需求
- C. 制定可行的治疗干预策略,随访疗效和调整治疗计划
- D. 安排患者合理使用慢性长期的医疗和护理服务
- E. 改善虚弱老年人的躯体、功能、心理和社会等方面的问题**

2

老年综合评估的适宜人群包括: (单选)

- A. 健康老人
- B. 疾病终末期老年人
- C. 痴呆末期老年人
- D. 卧床失能老年人
- E. 共病老年人

3

多重用药是指病人同时使用: (单选)

- A. 五种药物以上
- B. 五个药物以上
- C. 三种药物以上
- D. 六种药物以上
- E. 十种药物以上

4

综合评估患者的下肢肌力、平衡以及步态的检测方法是: (单选)

- A. 全足距试验
- B. 半足距试验
- C. 5次起坐试验
- D. 起立行走测试
- E. 并足试验

5

对老年痴呆进行评估的量表是: (单选)

- A. MMSE
- B. ADL
- C. IADL
- D. Barthel-ADL
- E. KPS

6

由丹麦肠外肠内营养协会于 2003 年发表, 为 ESPEN 推荐, 适用于

住院患者营养风险筛查的是: (单选)

- A. MOCOL
- B. NRS-2002
- C. MNA
- D. MNS-SF
- E. SAS

7

能够更为准确的预测近期营养状态的指标是 (单选)

- A. 白蛋白
- B. 胆固醇
- C. 前白蛋白
- D. 肌酐
- E. 皮下脂肪厚度

8

吞咽功能评估的金标准方法是: (单选)

- A. 洼田饮水试验
- B. 吞咽 X 线荧光透视检查
- C. 纤维鼻咽喉镜检查
- D. 反复唾液吞咽试验
- E. 染料试验

9

急性期的医疗服务有明确的住院时间限制, 一般为: (单选)

- A. 最长应不超过 3 周
- B. 限制在一周之内
- C. 最长五天
- D. 一般十天之内
- E. 最短十天

10

关于安宁疗护, 正确的说法是: (单选)

- A. 安宁疗护是一种提前死, 也是安乐死的一种
- B. 安宁疗护是主张尽一切可能救治患者延长生命
- C. 生前预嘱改变了人们对生命的看法, 正视死亡的客观存在, 做到对生命的最大尊重
- D. 安宁疗护机构不需要对患者进行转诊服务
- E. 安宁疗护实施过程中不需要专业的医生护士

化妆品经营管理实务

1

《化妆品监督管理条例》已经 2020 年 1 月 3 日国务院第 77 次常务会议通过, 现予公布, 自 () 起施行 (单选)

- A. 2020 年 1 月 1 日
- B. 2021 年 1 月 1 日
- C. 2020 年 6 月 16 日

2

国产特殊用途化妆品批准文号的格式: (单选)

- A. 卫妆特进字J(××××)××××号
- B. 国妆特进字J(××××)××××号
- C. 国妆特字G(××××)××××号

3

从事化妆品生产活动,应当向所在地()提出申请,提交其符合本条例第二十六条规定条件的证明资料,并对资料的真实性负责。(单选)

- A. 国家药品监督管理局
- B. 省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
- C. 县人民政府药品监督管理部门

4

依据国家药监局关于发布《儿童化妆品监督管理规定》的公告,自()起,申请注册或进行备案的儿童化妆品,必须标注“小金盾”;此前申请注册或进行备案的儿童化妆品,未按照规定进行标签标识的,化妆品注册人、备案人应当在()前完成产品标签更新。(单选)

- A. 2022年5月1日,2023年5月1日
- B. 2022年12月1日,2023年1月1日
- C. 2022年10月1日,2022年12月31日

5

化妆品分为()和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理,对普通化妆品实行备案管理。(单选)

- A. 特殊用途化妆品
- B. 特殊化妆品
- C. 一般化妆品

6

牙膏()本条例有关普通化妆品的规定进行管理(单选)

- A. 参照
- B. 不属于
- C. 属于

7

化妆品广告（）明示或者暗示产品具有医疗作用，不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。（单选）

- A. 不得
- B. 可以
- C. 允许

8

化妆品的最小销售单元应当有标签。进口化妆品可以直接使用中文标签，也可以加贴中文标签；加贴中文标签的，中文标签内容（）与原标签内容一致。（单选）

- A. 应当
- B. 不用
- C. 不得

9

用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为（）（单选）

- A. 普通的化妆品
- B. 特殊的化妆品
- C. 一般的化妆品

10

化妆品标签禁止标注下列内容：（单选）

- A. 明示或者暗示具有医疗作用的内容
- B. 产品执行的标准编号
- C. 净含量

咳嗽变异性哮喘的诊治

1

咳嗽变异性哮喘的典型症状有：（多选）

- A. 刺激性干咳
- B. 咳嗽通常比较剧烈，夜间咳嗽为其中药特征
- C. 感冒可诱发或加重咳嗽

D. 冷空气、灰尘、油烟等也容易诱发或加重咳嗽

2

咳嗽变异性哮喘的诊断依据有: (多选)

- A. 慢性咳嗽, 常伴有明显的夜间刺激性咳嗽
- B. 支气管激发试验阳性, 或呼吸峰流速日间变异率大于 20%, 或支气管舒张试验阳性
- C. 支气管舒张剂治疗有效
- D. 支气管舒张剂治疗无效

3

有效预防 CVA 进展为典型哮喘的手段为: (单选)

- A. 吸入性糖皮质激素
- B. 外用糖皮质激素
- C. 口服抗生素
- D. 静脉注射抗生素

4

咳嗽变异性哮喘的治疗原则与典型哮喘 (单选)

- A. 完全不同
- B. 较为相似

5

针对咳嗽变异性哮喘, 可参考以下哪些指南 (多选)

- A. 《中国咳嗽指南》(2009 年)
- B. 《ACCP 的 CVA 指南》(2006 年)
- C. 《日本咳嗽指南》(2006 年)
- D. 《欧洲慢性咳嗽诊断及治疗指南》(2004 年)

6

在哮喘治疗的药物选择上, 对于 6-11 岁儿童, 茶碱的使用 () (单选)

- A. 推荐
- B. 不推荐

7

在咳嗽变异性哮喘治疗中, 大多数患者 ICS 或 ICS+LABA 治疗 () (单选)

- A. 有效
- B. 无效

零售药店常见质量管理问题及对策

1

经营过程中的所有记录及凭证应当至少保存（）（单选）

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 5 年**
- D. 超过药品有效期 1 年

2

储存药品相对湿度为:（单选）

- A. 30%-70%
- B. 35%-75%**
- C. 35%-70%
- D. 30%-75%

3

现行《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的发布时间为:（单选）

- A. 2012 年 12 月
- B. 2013 年 6 月
- C. 2016 年 12 月**
- D. 2019 年 6 月

4

（）应当对库房温湿度进行有效监测、调控（单选）

- A. 养护人员**
- B. 验收人员
- C. 收货人员
- D. 库管人员

5

新版《药品管理法》施行时间为:（单选）

- A. 2019 年 12 月 1 日**
- B. 2019 年 12 月 31 日
- C. 2020 年 1 月 1 日
- D. 2020 年 1 月 31 日

6

企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行（单选）

- A. 维护
- B. 保养
- C. 检查
- D. 校准或者检定

7

下列哪个区域需用红色色标标识？（单选）

- A. 待验区
- B. 退货区
- C. 不合格品区
- D. 发货区

8

下列哪类药品零售药店可以销售？（单选）

- A. 一类精神药品
- B. 麻醉药品
- C. 含麻黄碱复方制剂
- D. 毒性药品

9

零售药店中下列哪个岗位必须要执业药师资格？（单选）

- A. 法定代表人
- B. 企业负责人
- C. 处方审核员
- D. 质量管理员

10

现行《药品经营质量管理规范》是国家食品药品监督管理局令？（单选）

- A. 第 28 号
- B. 第 13 号
- C. 第 90 号
- D. 第 23 号

11

药店下列那种情况不属于违法行为？（单选）

- A. 经营假劣药品
- B. 出租出借证照、资质证明文件
- C. 未如实记录经营场所温湿度记录

D. 分装、生产中药饮片

12

药店下列那种情况不符合质量管理相关规定? (单选)

- A. 处方药开架销售
- B. 中药与西药分开陈列
- C. 外用药与内服药分开陈列
- D. 处方药与非处方药分开陈列

13

药店下列哪个岗位人员可不必进行辨色力的检查 (单选)

- A. 处方审核员
- B. 企业法人
- C. 销售员
- D. 验收员

14

常温储存的药品, 其温度要求是 (单选)

- A. 20°C以下
- B. 0-20°C
- C. 30°C以下
- D. 10-30°C

15

《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》中药品零售企业部分的

附录有 () 个 (单选)

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

《医疗器械经营监督管理办法》解析

在中国（ ）从事医疗器械（ ）活动及其监督管理应当遵守本办法。

（单选）

- A. 境内、经营
- B. 境外、经营
- C. 境外、生产
- D. 境内、生产

2

《医疗器械经营监督管理办法》是 2022 年 3 月 10 日国家市场监督管理总局令（ ）公布，自 2022 年 5 月 1 日起施行。（单选）

- A. 28 号
- B. 18 号
- C. 68 号
- D. 54 号

3

主管全国医疗器械经营监督管理工作的是（ ）。（单选）

- A. 国家药品监督管理局
- B. 医疗器械标准管理中心
- C. 医疗器械技术审评中心
- D. 中国医疗器械行业协会

4

医疗器械按照风险程度，经营实施分类管理，经营第（ ）类医疗器械不需许可和备案、经营第（ ）类医疗器械实行备案管理、经营第（ ）类医疗器械实行许可管理。（单选）

- A. 一、二、三
- B. 二、一、三
- C. 三、二、一
- D. 一、二和三、二或三

5

《医疗器械经营许可证》有效期为（ ）年（单选）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

6

第三类医疗器械经营企业停业（ ）年以上，恢复经营前，应当进行必要的验证和确认，并书面报告所在地设区的市级负责药品监督管理的部门。（单选）

- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年
- D. 五年

7

《医疗器械经营许可证》的有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期前（ ）个工作日至（ ）个工作日内，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。逾期未提出延续申请的，不再受理其延续申请。（单选）

- A. 90,30
- B. 60,90
- C. 30,90
- D. 60,60

8

从事第二类医疗器械经营的，经营企业应当向（ ）备案，并提交符合本办法第十条规定的资料（第七项除外），即完成经营备案，获取经营备案编号。（单选）

- A. 省药品监督管理局
- B. 国家药品监督管理局
- C. 所在地设区的市级负责药品监督管理部门
- D. 总局医疗器械标准管理中心

9

医疗器械经营企业应当建立并执行进货查验制度，进货查验记录应当保存至医疗器械有效期满后（ ）年；没有有效期的，不得少于（ ）年。植入类医疗器械进货查验记录应当（ ）保存。（单选）

- A. 2、5、永久
- B. 1、3、5
- C. 2、5、5

D. 1、3、永久

10

医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度，按照医疗器械经营质量管理规范要求进行自查，每年（ ）前向所在地市县级负责药品监督管理的部门提交上一年度的自查报告。（单选）

- A. 6 月
- B. 9 月
- C. 年底
- D. 3 月 31 日**

高血压的药物治疗管理技能

1

患者的收缩压是 167 mmHg，舒张压是 102 mmHg，其高血压类型是（ ）（单选）

- A. 1 级高血压
- B. 2 级高血压**
- C. 3 级高血压
- D. 单纯收缩期高血压

2

患者测量血压的正确方式不包括（ ）（单选）

- A. 双脚平放在地面
- B. 坐在有靠背的座椅上
- C. 不憋尿
- D. 袖带要勒紧**

3

高血压患者不可改变的危险因素是（ ）（单选）

- A. 肥胖
- B. 饮酒
- C. 遗传史**
- D. 高钠饮食

4

不属于 DASH 饮食的是（ ）（单选）

- A. 高胆固醇食品
- B. 富含微量元素
- C. 富含优质蛋白质和纤维素
- D. 少饱和脂肪

5

妊娠高血压患者首选的降压药是（ ）（单选）

- A. 拉贝洛尔
- B. 氢氯地平
- C. 美托洛尔
- D. 缬沙坦

6

伴有痛风的高血压患者，应避免使用的降压药是（ ）（单选）

- A. 比索洛尔
- B. 吲达帕胺
- C. 特拉唑嗪
- D. 氯沙坦钾

7

伴有哮喘的高血压患者，应避免使用的降压药是（ ）（单选）

- A. 厄贝沙坦
- B. 硝苯地平
- C. 美托洛尔
- D. 氢氯噻嗪

8

服用降压药后，患者出现踝部水肿，最可能的降压药是（ ）（单选）

- A. 依那普利
- B. 美托洛尔
- C. 非洛地平
- D. 氢氯噻嗪

9

ARB 类和 ACEI 类降压药的优点不包括（ ）（单选）

- A. 逆转心室重构
- B. 改善胰岛素抵抗
- C. 减少蛋白尿
- D. 可降低血脂

10

长期服用可能会导致男性患者乳房发育，血钾升高的利尿药是（ ）
（单选）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/678110017103007005>