

2021 年春季执业护士资格考试实践能力检测卷 (附答案)

一、单项选择题（共 100 题，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）。

1、患者，女学生，16 岁，平素体健，学校体检时心率 96 次/分，律齐，心尖区闻及舒张期隆隆样杂音，心界增大不明显。恰当的保健指导是

- A、保持卧床休息
- B、及早洋地黄治疗
- C、宜口服利尿剂
- D、避免重体力活动，防止感染，经常随访
- E、住院进行治疗

【参考答案】：D

2、对开放性损伤早期最重要的处理措施是

- A、实施清创术
- B、应用抗生素
- C、止痛
- D、镇静
- E、补液

【参考答案】：A

3、正常 1 岁小儿胃容量为

- A、120~150ml

B、150~180ml

C、180~200ml

D、200~250ml

E、250~300ml

【参考答案】：E

4、原发性肾病综合征的常见并发症是

A、血栓及栓塞

B、动脉粥样硬化

C、肾功能不全

D、感染

E、心肌梗死

【参考答案】：D

5、为昏迷患者做口腔护理，特别应注意

A、压舌板轻轻撑开颊部

B、血管钳夹紧棉球，棉球不可过湿

C、操作时动作要轻

D、有无异味

E、口唇干裂，涂石蜡油

【参考答案】：B

6、属于保护胃黏膜的药物是

A、硫糖铝

- B、氢氧化铝
- C、西咪替丁
- D、雷尼替丁
- E、奥美拉唑

【参考答案】： A

7、急性心肌梗死病人起病后 24 小时内死亡的最主要原因是

- A、心脏破裂
- B、心力衰竭
- C、心律失常
- D、心源性休克

【参考答案】： C

8、对特发性血小板减少性紫癜病人进行健康教育不妥的是

- A、了解本病的有关知识
- B、坚持服药
- C、定期复查血小板
- D、避免活动减少外伤
- E、不用阿司匹林

【参考答案】： D

9、护士下午来医院上班，病区护士长安排她为患者做各项治疗工作，这种护理工作方式属于

- A、个案护理

- B、小组制护理
- C、功能制护理
- D、责任制护理
- E、整体护理

【参考答案】： C

10、为防止腹泻患儿交叉感染，错误的措施是

- A、对被粪便污染的物品进行处理
- B、食具、衣物、尿布专用
- C、护理患儿前后洗手
- D、使用磺胺或抗生素预防感染
- E、与其他患儿分室居住

【参考答案】： D

11、对诊断急性肾炎血生化改变意义较大的是

- A、抗O升高
- B、血浆蛋白明显下降
- C、血清补体下降
- D、胆固醇升高
- E、血沉增快

【参考答案】： C

12、插管操作结束后，为证实胃管是否确在胃内，进行检查时，错误的方法是

- A、注入少量空气，同时听胃部有无气过水声
- B、抽吸出胃液
- C、注入少量温开水，同时听胃部有无气过水声
- D、胃管末端放入水杯有无气体溢出
- E、抽吸出液体用 pH 试纸测试

【参考答案】： C

13、甲状腺危象的首选药物是

- A、卡比马唑
- B、甲巯咪唑
- C、普萘洛尔
- D、丙硫氧嘧啶
- E、甲硫氧嘧啶

【参考答案】： D

14、毕 II 氏胃大部切除术后最严重的并发症是

- A、吻合口出血
- B、十二指肠残端瘘
- C、吻合口梗阻
- D、倾倒综合征

【参考答案】： B

15、盆腔超声检查前多饮水并憋尿的目的是

- A、让肠道充盈

- B、使肠部上抬
- C、成像更加清晰
- D、更好显示后位卵巢
- E、便于检查膀胱肿瘤

【参考答案】： B

16、患者，男性，起病较缓慢，有全身不适、乏力、食欲不振、厌油、恶心、呕吐、上腹不适、肝区隐痛、肝脏肿大，无黄疸，病程在3个月以内，该患者可能患的疾病是

- A、急性黄疸型肝炎
- B、急性无黄疸型肝炎
- C、慢性肝炎
- D、瘀胆型肝炎
- E、肝炎后肝硬化

【参考答案】： B

17、关于心肺复苏术时中途换人的叙述，正确的是

- A、抢救中断时间不得超过2~3秒
- B、随时可换人
- C、吹气间隙换人
- D、心脏按压间隙换人

E、按压、吹气间隙换人心肺复苏操作中换人，中断时间不超过5~7秒。操作过程中换人应在心脏按压、吹气间隙进行。

【参考答案】： E

18、小儿前囟闭合时间一般为

- A、4~6 个月
- B、1~2 个月
- C、24 个月
- D、12~18 个月

【参考答案】：D

19、酒精擦浴禁擦足底，是为了防止

- A、防止腹泻
- B、呼吸不畅
- C、体温骤降
- D、发生寒战
- E、一过性冠状动脉收缩

【参考答案】：E

20、应用异烟肼进行预防性治疗的小儿是

- A、家庭中曾有肺结核病人
- B、PPD 试验新近由阴性转阳性者
- C、3 岁以下小儿未接种过卡介苗者
- D、麻疹患儿
- E、需长期使用肾上腺皮质激素者

【参考答案】：B

21、患者男，45岁。脑外伤昏迷2周，为其插鼻饲管协助进食，以满足营养需要。在为患者行鼻饲插管时，为提高插管成功率，应重点采取的措施是

- A、患者取平卧位，利于胃管插入
- B、先稍向上而后平行再向下缓慢轻轻地插入
- C、插管时动作要准确，让胃管快速通过咽部
- D、插入15cm时，托起患者头部使下颌靠近胸骨柄
- E、边插边用注射器抽吸有无胃液，检验胃管是否在胃内

【参考答案】：D

22、疝内容物与疝囊发生粘连而不能完全回纳入腹腔的疝是指：

- A、易复性疝
- B、滑动性疝
- C、难复性疝
- D、嵌顿性疝
- E、绞窄性疝

【参考答案】：C

23、男，51岁。全麻手术后未清醒，突然出现鼾声，这是因为

- A、呼吸道被痰堵塞
- B、舌后坠
- C、喉痉挛
- D、即将苏醒

E、以上都不是

【参考答案】： B

24、心肺复苏后处理不对的是

A、防治脑水肿

B、防治肺水肿

C、防止失钠

D、防止心衰

E、防止肾衰

【参考答案】： A

25、化学治疗用药护理下列正确的一项为

A、药物仔细核对并配好后以备用

B、注意保护静脉，从远端开始穿刺

C、一旦发现外漏立即热敷促进吸收

D、用化学治疗药物直接穿刺，穿刺应准确

E、化学治疗药物均用 5%葡萄糖溶解、稀释

【参考答案】： B

26、甲亢病人浸润性突眼下列描述中哪项不妥

A、眼内异物感

B、视物模糊或复视

C、流泪

D、易致角膜炎或角膜溃疡

E、突眼程度往往双侧对称

【参考答案】： E

27、使用燃烧法消毒灭菌时，不正确的操作是

A、锐利刀剪不能用燃烧法

B、燃烧时须远离易燃易爆物品

C、燃烧前容器应洗净擦干

D、在燃烧中可随时加入 95% 的酒精以提高灭菌效果

E、应使容器内面全部被火焰烧到

【参考答案】： D

28、病人姚某，伤寒，持续高热 5 天，每晨 8AmT39. 0℃左右，4PmT39. 6℃左右，此热型为

A、稽留热

B、弛张热

C、间歇热

D、不规则热

E、异常热

【参考答案】： A

29、病毒引起的急性上呼吸道感染的血象检查特点是

A、白细胞计数正常或偏低，淋巴细胞比例降低

B、白细胞计数正常或偏低，淋巴细胞比例升高

C、白细胞计数正常或增高，淋巴细胞比例降低

- D、白细胞计数正常或偏低，中性粒细胞比例降低
- E、白细胞计数正常或偏低，中性粒细胞比例增高

【参考答案】： B

30、留 24 小时尿标本时加入甲醛的作用是

- A、固定尿中有机成分
- B、防止尿液中的激素被氧化
- C、防止尿液被污染变质
- D、保持尿液中的化学成分不变
- E、防止尿液改变颜色

【参考答案】： A

31、女性，20 岁，乳房肿块，边缘清晰，活动度大，生长缓慢，最可能的是

- A、乳管内乳头状瘤
- B、乳腺癌
- C、乳腺纤维腺瘤
- D、乳腺炎性肿块
- E、乳腺囊性增生病

【参考答案】： C

32、大量咯血是指 24h 咯血量超过

- A、200ml
- B、300ml

C、400ml

D、500ml

E、600ml

【参考答案】：D

33、呼吸深而快是以下哪种酸碱失衡的特征：

A、代谢性酸中毒

B、代谢性碱中毒

C、呼吸性酸中毒

D、呼吸性碱中毒

E、混合性碱中毒

【参考答案】：A

34、为达到治疗效果，吸氧的浓度应超过

A、20%

B、25%

C、30%

D、35%

E、40%

【参考答案】：B

35、烧伤后补充液体分配以下哪项正确

A、8h内补充完全天的量

B、8h内补充全量的一半

- C、两个 8h 内补完全天的量
- D、三个 8h 均匀补完全天的量
- E、12h 内补完全天的量

【参考答案】： B

36、多数医院儿科就诊的年龄范围是

- A、0~12 岁
- B、0~13 岁
- C、0~14 岁
- D、0~15 岁
- E、0~16 岁

【参考答案】： C

37、护士在患者行“经尿道前列腺电切术”前，告诉患者术后会在尿道放置三腔气囊导尿管，并解释其目的是

- A、引流尿液
- B、压迫前列腺窝防止出血
- C、膀胱冲洗
- D、排尿功能训练
- E、方便用药

【参考答案】： B

38、滴虫性阴道炎的治愈标准为

- A、月经干净后复查 1 次为阴性

- B、每次月经干净后复查，连续 2 次为阴性
- C、每次月经干净后复查，连续 3 次为阴性
- D、每次月经干净后复查，连续 4 次为阴性
- E、每次月经干净后复查，连续 5 次为阴性

【参考答案】： C

39、急性心肌梗死患者血清心肌酶测定中最早升高的是

- A、门冬氨酸转移酶
- B、乳酸脱氢酶
- C、缓激肽酶
- D、细胞色素氧化酶
- E、肌酸磷酸激酶

【参考答案】： E

40、患者出现右心功能不全最早出现的体征是

- A、肝颈静脉回流征呈阳性
- B、腹水
- C、胸水
- D、双下肢水肿
- E、发绀

【参考答案】： D

41、原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A、TACD

- B、免疫治疗
- C、放射性治疗
- D、冰冻治疗
- E、手术治疗

【参考答案】： E

42、休克早期病人的微循环变化是

- A、前毛细血管括约肌麻痹
- B、弥散性血管内凝血
- C、周围血管收缩，短路开放
- D、组织内乳酸积聚

【参考答案】： C

43、患者李某，将于下个月底做甲状腺摄碘率测定，护士嘱其在检查前1个月禁食的食物是

- A、河鱼
- B、白菜
- C、土豆
- D、紫菜
- E、鸡蛋

【参考答案】： D

44、化学治疗用药护理下列正确的一项为

- A、药物仔细核对并配好后以备用

- B、注意保护静脉，从远端开始穿刺
- C、一旦发现外漏立即热敷促进吸收
- D、用化学治疗药物直接穿刺，穿刺应准确
- E、化学治疗药物均用 5%葡萄糖溶解、稀释

【参考答案】： B

45、细菌性肝脓肿患者最常见的早期症状是

- A、右上腹肌紧张，局部触痛明显
- B、黄疸
- C、贫血
- D、恶心

E、寒战、高热寒战和高热是细菌性肝脓肿最常见的早期症状，体温可达 39~40℃。

【参考答案】： E

46、给儿童使用人工呼吸机，潮气量的标准是每公斤体重

- A、5ml
- B、8ml
- C、10ml
- D、12ml
- E、15ml

【参考答案】： C

47、国际红十字会首次颁发南丁格尔奖是在

- A、1892 年
- B、1902 年
- C、1912 年
- D、1920 年
- E、1922 年

【参考答案】： C

48、诱发支气管哮喘的原因不包括

- A、受凉
- B、过敏
- C、自主神经功能紊乱
- D、高血压
- E、呼吸道感染

【参考答案】： D

49、为阿米巴痢疾患者行保留灌肠时患者的体位是

- A、左侧卧位
- B、右侧卧位
- C、半卧位
- D、头低脚高位
- E、膝胸卧位

【参考答案】： B

50、采全血标本测血糖含量，正确的是

- A、饭后 2h 采血
- B、标本容器用抗凝试管
- C、从输液针头处抽血
- D、采血后将针头靠近管壁缓慢注入
- E、血液注入试管后不能摇动

【参考答案】： B

51、作透视检查前，下列哪种随身物品没必要去除

- A、发卡
- B、内衣
- C、金属饰品
- D、膏药
- E、敷料

【参考答案】： B

52、李女士娩一女婴，身长 35cm，体重 1000g，皮下脂肪少，头发、指甲已长出。新生儿娩出后能啼哭、吞咽，但生活能力很差。估计该新生儿娩出时孕周为

- A、8 周
- B、16 周
- C、20 周
- D、28 周
- E、40 周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686154033031010043>