

2021年泗洪县人民医院实习生理论考试（内科）

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
学校：	_____

1.下列心脏病中，不宜使用血管扩张药的是：（） [单选题] *

- A . 二尖瓣关闭不全
- B . 肺动脉高压
- C . 主动脉瓣关闭不全
- D . 高血压性心脏病
- E . 心包压塞征(正确答案)

2.下列关于急性胰腺炎并发症的判断，错误的是：（） [单选题] *

- A . 可并发消化道出血
- B . 可并发假性囊肿
- C . 可并发慢性胰腺炎
- D . 可并发糖尿病
- E . 可并发心肌梗死(正确答案)

3.食管胃底静脉曲张破裂出血时的止血用药是：（） [单选题] *

A . 雷尼替丁

B . 利血平

C . 垂体后叶素(正确答案)

D . 阿托品

E . 地高辛

4.闭锁综合征系病变累及：（） [单选题] *

A . 边缘系统

B . 上行网状激活系统

C . 桥脑基底部病变(正确答案)

D . 广泛大脑皮质层

5.区别细菌性脑膜炎与病毒性脑膜炎最有意义的CSF改变为：（） [单选题] *

A . 压力

B . 细胞数

C . 蛋白

D . 糖和氯化物(正确答案)

6.能够确诊感染性心内膜炎的检查是：（） [单选题] *

A . 超声心动图

B . X线检查

C . 免疫学检查

D . 心电图

E . 血培养(正确答案)

7.消化性溃疡具有诊断价值的检查方法是：（） [单选题] *

A . 胃镜检查及活检(正确答案)

B . 粪便隐血检查

C . 胃液分析

D . 腹部 CT 检查

8.急性脊髓横贯性损害的鉴别主要包括下列疾病，但除外：（） [单选题] *

A . 急性硬膜外脓肿

B . 原发性侧索硬化(正确答案)

C . 脊髓转移性肿瘤

D . 脊髓血管病

9.关于治疗结核性腹膜炎激素的应用，下列说法不对的是：（） [单选题] *

A . 可减轻全身中毒症状

B . 减少渗出和促进腹水吸收

C . 防止或减轻腹腔粘连

D . 宜短期应用

E . 应用激素时可减少抗痨药物的种类和用量(正确答案)

10.如果一患者外周血出现幼红幼粒细胞、泪滴状红细胞，骨髓干抽，脾肿大。主要考虑为：（） [单选题] *

- A . 脾淋巴瘤
- B . 慢性粒细胞性白血病
- C . 骨髓纤维化(正确答案)
- D . 溶血性贫血
- E . 再生障碍性贫血

11.下列选项中不是 DIC 的临床表现的一项是：（） [单选题] *

- A . 出血
- B . 休克
- C . 栓塞症状
- D . 溶血
- E . 阻塞性黄疸(正确答案)

12.渗出性心包炎最突出的症状是：（） [单选题] *

- A . 发绀
- B . 干咳
- C . 呼吸困难(正确答案)
- D . 声嘶
- E . 吞咽困难

13.下列有关主动脉瓣关闭不全的叙述，错误的是：（） [单选题] *

A . 主动脉瓣区出现中晚期递增型舒张期杂音(正确答案)

B . 主动脉瓣第二心音减弱或消失

C . 可有毛细血管搏动征

D . 心浊音界靴形扩大

E . 心尖区可听到 Austin—Flint 加杂音

14.下列检查对结核性腹膜炎有确诊价值的是：（） [单选题] *

A . 血象检查

B . 血沉检查

C . 粪便检查

D . 腹部 X 线检查

E . 腹腔镜检查+腹膜活检(正确答案)

15.缺铁性贫血口服铁剂后，最早升高的是：（） [单选题] *

A . 血红蛋白

B . 白细胞数

C . 网织红细胞数(正确答案)

D . 红细胞数

E . 以上都不是

16.血友病 A 实验室检查中，错误的一项是：（） [单选题] *

A . 凝血时间延长

- B . 活化部分凝血活酶时间延长
- C . 出血时间延长(正确答案)
- D . 血小板计数正常
- E . 凝血酶原时间正常

17.下列疾病中适于使用复方碘剂治疗的是：（） [单选题] *

- A . 甲亢术前准备和甲状腺危象(正确答案)
- B . 甲亢合并妊娠
- C . 甲亢性心脏病
- D . 甲亢术后复发
- E . 甲亢伴重度浸润性突眼

18.下列选项不符合急进性肾小球肾炎的特征：（） [单选题] *

- A . 绝大多数患者临床上表现为肾病综合征(正确答案)
- B . 常伴中度贫血
- C . 早期出现少尿性急性肾衰竭
- D . 病理呈新月体肾小球肾炎
- E . B超提示双肾体积增大

19.下述原发性支气管肺癌临床表现中，最常见的早期症状是：（） [单选题] *

- A . 咳嗽(正确答案)
- B . 咯血

C . 胸痛

D . 呼吸困难

E . 发热

20.结核性渗出性胸膜炎与癌性胸膜炎鉴别,最主要的是: () [单选题] *

A . 年龄的大小

B . 草黄色渗出液

C . 有无畏寒、发热

D . 血性渗出液

E . 胸水细胞学检查(正确答案)

21.不是应用机械通气的指征是: () [单选题] *

A . 意识障碍,呼吸不规则

B . 气道分泌物多且排痰障碍

C . 极易发生呕吐及误吸

D . 肺大疱(正确答案)

E . 严重缺氧或(和)CO₂ 潴留

22.男性,24岁,间歇性上腹痛3年,近日腹痛加重,伴呕吐,呕吐物量多,为隔日食物。查体:上腹部有振水音。最可能的诊断是: () [单选题] *

A . 消化性溃疡合并幽门梗阻(正确答案)

B . 急性胃炎

C . 急性肠梗阻

D . 胃癌

E . 胃下垂

23.支气管肺癌患者出现 Horner 综合征，病侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，同侧颈部与胸部无汗或少汗，是因为：() [单选题] *

A . 肿瘤压迫膈神经(正确答案)

B . 肿瘤压迫臂丛神经

C . 肿瘤压迫上腔静脉

D . 肿瘤压迫颈交感神经

E . 肿瘤压迫肋间神经

24.治疗胃癌最主要且最有效的方法是： () [单选题] *

A . 手术根治性切除(正确答案)

B . 抗癌药物化疗

C . 激光治疗

D . 微波治疗

E . 中医中药治疗

25.下列因素中不会影响胃酸分泌的是： () [单选题] *

A . 生长抑素

B . 胃蛋白酶(正确答案)

- C . 胃泌素
- D . 组胺
- E . 前列腺素

26.对肝硬化肝功能诊断最有意义的是：（） [单选题] *

- A . 丙氨酸氨基转移酶(ALT)
- B . 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
- C . 白蛋白/球蛋白比例(正确答案)
- D . γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT)
- E . 腺苷脱氨酶(ADA)

27.脑动脉瘤的体积是决定 SAH 是否出血的危险因素，出血机会较少的是瘤体直径小于：（） [单选题] *

- A . 1mm
- B . 2mm
- C . 3mm(正确答案)
- D . 4mm

28.下列有关抗可提取核抗原抗体的临床意义中，错误的是：（） [单选题] *

- A . 抗 Sm 抗体是 SLE 特异性抗体，并与病情活动性相关(正确答案)
- B . 抗 SSA、抗 SSB 抗体在干燥综合征中有较高阳性率
- C . 抗 jo 抗体出现在多发性肌炎、皮肌炎及合成酶综合征

D . 高滴度 u1RNP 抗体阳性常出现于混合结缔组织病

E . 抗 ScL-70 抗体是硬皮病的特异性抗体

29.下面选项不是继发型肺结核所具备的：（） [单选题] *

A . 肺尖部最常受累

B . 可形成纤维性空洞

C . 病程长，时好时坏

D . 淋巴道传播为主(正确答案)

E . 可有干酪样坏死

30.心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是：（） [单选题] *

A . 妊娠 20 ~ 22 周

B . 妊娠 24 ~ 26 周

C . 妊娠 28 ~ 30 周

D . 妊娠 32 ~ 34 周(正确答案)

E . 妊娠 36 ~ 38 周

31.支气管哮喘应用拟肾上腺素类药物的目的，在于取得何种主要药理效应：（）

[单选题] *

A . 兴奋 α 受体

B . 兴奋 β 受体

C . 兴奋 α 、 β 受体

D . 兴奋 β_2 受体(正确答案)

E . 兴奋 β_1 、 β_2 受体

32.动脉炎经常累及的动脉不包括：（） [单选题] *

A . 颈动脉

B . 锁骨下动脉

C . 肾动脉

D . 肋间动脉(正确答案)

E . 髂动脉

33.蛋白质和肽类激素传递信息借助的是离子：（） [单选题] *

A . K^+

B . Na^+

C . Cl^-

D . Ca^{2+} (正确答案)

E . H^+

34.下列关于银屑病关节炎的叙述正确的是：（） [单选题] *

A . 不属脊柱关节病

B . 病理改变可见滑膜炎

C . 与 HLAB27 无关

D . 对称性侵犯近端指间关节(正确答案)

E . 与感染无关

35.胰岛素低血糖兴奋试验可用于诊断：（） [单选题] *

A . 尿崩症

B . 糖尿病

C . GH 缺乏性侏儒症(正确答案)

D . 甲亢

E . 肢端肥大症

36.下列选项中，不是上消化道出血手术治疗指征的是：（） [单选题] *

A . 过去有多次大出血，近期反复大出血

B . 年龄超过 45 岁(正确答案)

C . 大出血时伴有幽门梗阻

D . 大出血同时伴有急性穿孔

E . 大出血同时伴有急性弥漫性腹膜炎

37.下列疾病会引起骨髓巨核细胞减少的是：（） [单选题] *

A . 血友病

B . 缺铁性贫血

C . ITP

D . 再生障碍性贫血(正确答案)

E . 巨幼细胞贫血

38.慢性房颤患者，应用口服华法林治疗，应使凝血酶原时间国际正常化比值(INR)维持在：（） [单选题] *

A . 1.5 ~ 2.5

B . 2.0 ~ 3.0(正确答案)

C . 2.5 ~ 3.5

D . 1.0 ~ 2.0

E . 2.5 ~ 3.0

39.对鉴别原因未明的病毒性脑炎与功能性精神病，较有意义的检查是：（） [单选题] *

A . 脑超声检查

B . 脑电图检查

C . 脑脊液检查(正确答案)

D . 脑血管造影

40.糖尿病的诊断标准是：症状+静脉血浆葡萄糖值：（） [单选题] *

A . 随机 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或 OGTT 中 2h $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (正确答案)

B . 随机 $\geq 7.8\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$

C . 随机 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.8\text{mmol/L}$

D . 随机 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$

E . 随机 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.8\text{mmol/L}$

41.下列关于风湿病的病理表现的说法中，错误的是：（） [单选题] *

- A . 骨关节炎以软骨损害为主要病理改变
- B . 类风湿关节炎以滑膜炎为主伴血管炎
- C . SLE 以浆膜炎为主要病理改变(正确答案)
- D . 干燥综合征以小唇腺淋巴细胞灶性增生为主要表现
- E . 强直性脊柱炎有附着点炎为病理特点

42.手术治疗甲亢，下列选项中属于禁忌证的是：（） [单选题] *

- A . 中、重度甲亢，药物治疗无效
- B . 甲亢复发或不愿长期服药
- C . 妊娠早期和晚期(正确答案)
- D . 结节性甲状腺肿伴甲亢
- E . 胸骨后甲状腺肿伴甲亢

43.脊髓亚急性联合变性是由于下列哪种物质缺乏：（） [单选题] *

- A . 维生素 C
- B . 维生素 E
- C . 多种维生素
- D . 维生素 B12(正确答案)

44.结核性腹膜炎最常见的直接原发病灶为：（） [单选题] *

- A . 肺结核
- B . 肠结核(正确答案)

C . 肺结核

D . 肾结核

E . 脾结核

45.溃疡性结肠炎最严重的并发症是：（） [单选题] *

A . 结肠假息肉形成

B . 结肠狭窄

C . 慢性活动性肝炎

D . 中毒性巨结肠(正确答案)

E . 肛门直肠周围脓肿

46.出血坏死型胰腺炎的早期治疗药物可使用：（） [单选题] *

A . 胰岛素

B . 止血剂静滴

C . 胰酶抑制剂静滴(正确答案)

D . 升压药

E . 利尿剂

47.下列关于上消化道出血的处理，有误的一项是：（） [单选题] *

A . 使患者保持安静

B . 注意观察尿量变化

C . 一律禁食(正确答案)

- D . 定期复查血象
- E . 防治失血性休克

48.下列关于急性肾小管坏死病因和病理的叙述， 错误的是：（） [单选题] *

- A . 各种原因导致有效循环血容量减少， 肾灌注不足， 可导致急性肾小管坏死
- B . 肾缺血可导致肾前性急性肾衰竭， 不会引起急性肾小管坏死(正确答案)
- C . 血红蛋白可作为一种内源性毒素引起急性肾小管坏死
- D . 常见的外源性毒素有抗菌药物、 造影剂
- E . 肾毒素引起者， 病变主要在近曲小管； 肾缺血所致者， 小管髓袢升段和远端小管的病变最为明显

49.治疗有中央-颞部或枕部棘波的良好儿童期癫痫的首选药物是：（） [单选题] *

- A . 卡马西平(正确答案)
- B . 氯硝安定
- C . 乙酰唑胺
- D . ACTH

50.典型心绞痛发作错误的是：（） [单选题] *

- A . 体力活动是常见诱因
- B . 部位在胸骨中上段， 界线清楚(正确答案)
- C . 疼痛可放射至左肩
- D . 为压榨性疼痛
- E . 通常持续 3 ~ 5min

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688132130005006037>