

口腔医学主治医师：口腔颌面外科学题库考点六

1、单选 儿童颌骨骨折治疗原则错误的是（）

- A. 尽早复位
- B. 固定时间较成人短
- C. 尽可能采用保守治疗
- D. 必须恢复伤前的咬合关系
- E. 如要手术治疗，术中应避免损伤牙胚（江南博哥）

正确答案：D

2、单选 患者男性，63岁，右耳垂前肿性胀大8个月。近期肿物增长较快，痛向耳颞部放散。检查发现肿物约3.5cm、质地硬、有触痛、边界不清。活动度差，右眼睑闭合较对侧迟钝。以下哪项辅助检查对患者来说是不恰当的（）

- A. CT检查
- B. 胸部X线片
- C. 腮腺造影
- D. 细针吸细胞学检查
- E. 切除活组织检查 **正确答案：**E

3、单选 唇外伤清创术中哪条措施是不正确的（）

- A. 注意缝合口轮匝肌
- B. 按唇弓的形态对位缝合
- C. 必要时用组织瓣修复
- D. 如有贯通伤应先缝合口腔面
- E. 组织缺损大时可直接拉拢分层缝合

正确答案：E

4、单选 根治舌下腺囊肿根本的措施是（）

- A. 完整摘除囊肿
- B. 完整摘除舌下腺
- C. 吸尽囊液
- D. 结扎导管
- E. 去除所有囊壁组织

正确答案：B

5、单选 患者，女，50岁。左侧腮腺区反复肿胀3年，平时有胀感，口内时有咸味。较符合慢性阻塞性腮腺炎的X线造影表现为（）

- A. 主导管不整型扩张
- B. 末梢导管扩张
- C. 腺内分支导管变细
- D. 腺内有占位性病变
- E. 主导管中断，造影剂外溢 **正确答案：**B

6、单选 成人口腔颌面部感染最常见来源于（）

- A. 腺源性
- B. 牙源性
- C. 血源性
- D. 损伤性
- E. 医源性

正确答案：B

7、单选 化脓性下颌骨骨髓炎最常见的原因是（）

- A. 外伤
- B. 血源性感染
- C. 牙源性感染
- D. 呼吸道感染
- E. 腺源性感染

正确答案：C

8、单选 儿童复发性腮腺炎可见于任何儿童期，最常见于（）

- A. 2 岁左右
- B. 5 岁左右
- C. 8 岁左右
- D. 10 岁左右
- E. 14 岁

正确答案：B

9、单选 男，11 岁，因牙齿排列不齐要求正畸治疗，检查发现前牙拥挤。如果拍片时发现颌骨体内边缘清楚的卵圆形致密影附着于下颌磨牙牙根部，周围可见环状密度减低的影像，应诊断为（）

- A. 内生骨疣
- B. 根尖囊肿
- C. 真性牙骨质瘤
- D. 致密性骨炎
- E. 根尖肉芽肿

正确答案：C

10、单选 婴幼儿颌骨骨髓炎多见于（）

- A. 牙源性感染
- B. 医源性感染
- C. 上呼吸道感染
- D. 血源性感染
- E. 腺源性感染

正确答案：D

11、单选 患者男性，21 岁。在某施工工地干活时不慎绊倒，造成右侧面部贯通伤，出血较多。如果没有组织缺损或缺损较少，应采取的措施是（）

- A. 清创后将口腔黏膜、肌肉和皮肤分层缝合
- B. 清创后将口腔黏膜与皮肤相对缝合，消灭创面

C. 清创后严密缝合皮肤与肌层，黏膜侧放引流物

D. 清创后皮瓣转移，修复创口

E. 以上都不是 **正确答案：A**

12、单选 拔除下颌第一磨牙需要麻醉的神经为（）

A. 下齿槽神经

B. 下齿槽神经及舌神经

C. 下齿槽神经、舌神经、颊神经

D. 局部浸润

E. 下颌神经、舌神经、颊长神经 **正确答案：C**

13、单选 颌面外伤清创时只能清除下述哪种组织（）

A. 坏死组织

B. 污染组织

C. 多余组织

D. 不整齐的组织

E. 可能坏死的组织 **正确答案：A**

14、单选 腭裂手术两侧松弛切口内填塞的碘仿纱条抽除时间为术后（）

A. 2 天

B. 3~4 天

C. 4~6 天

D. 7~12 天

E. 15 天以后 **正确答案：D**

15、单选 患者男性，63 岁，右耳垂前肿性胀大 8 个月。近期肿物增长较快，痛向耳颞部放散。检查发现肿物约 3.5cm、质地硬、有触痛、边界不清。活动度差，右眼睑闭合较对侧迟钝。对于该病来说，以下哪种情况发生率较低（）

A. 区域淋巴结转移

B. 血行转移

C. 直接侵犯邻近淋巴结

D. 沿神经血管束扩展

E. 侵犯面神经 **正确答案：A**

16、单选 造釉细胞瘤好发于（）

A. 上颌前牙区

B. 上颌后牙区

C. 下前牙区

D. 下颌体及下颌角

E. 下颌骨升支部 **正确答案：D**

17、单选 患者右腮腺区恶性肿瘤，行局部扩大切除及胸大肌皮瓣修复，其术区未于口腔相通。此创口类型属于（）

A. 污染创口

B. 延期愈合创口

C. 感染创口

D. 无菌创口

E. 一期愈合创口 **正确答案: A**

18、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。若伤后时间超过 6 小时，撕脱组织瓣损伤过重，组织已不能利用，应进行（）

A. 松解创缘，减少张力尽量拉拢缝合

B. 撕脱的皮肤清创后，切削成全厚或中厚皮片再植

C. 立刻做血管吻合组织再植术

D. 采用局部皮瓣关闭创面

E. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面 **正确答案: E**

19、单选 女，23 岁，双侧颞下颌关节弹响 2 年，许勒位及经咽侧位显示髁状窝前斜面有明显的骨质改变。颞颌关节上腔造影可见上、下腔均有造影剂显影，应诊断为（）

A. 关节盘内移位

B. 关节上、下腔交通

C. 关节盘外移位

D. 关节盘穿孔

E. 关节囊松弛 **正确答案: B**

20、单选 舌后 1/3 的淋巴管引流至（）

A. 颞下和肩胛舌骨肌的淋巴结

B. 颌下和颈深淋巴结

C. 颈深淋巴结

D. 腮腺淋巴结

E. 锁骨上窝淋巴结 **正确答案: D**

21、单选 最不宜行活检的恶性肿瘤是（）

A. 舌癌

B. 唇癌

C. 肉瘤

D. 恶性淋巴瘤

E. 恶性黑色素瘤

正确答案: E

22、单选 某男，2 岁，左侧完全性腭裂拟行腭裂修复术。术后如需要配合系统性语音训练，最好在（）

A. 术后 1 个月进行

B. 术后半年进行

C. 4~6 岁时进行

D. 12 岁以后进行

E. 以上都不对 **正确答案: C**

23、单选 仅限于悬雍垂裂开的唇裂是 ()

- A. 软腭裂
- B. 不完全腭裂
- C. 单侧完全性腭裂
- D. I 度唇裂
- E. II 度唇裂 **正确答案: A**

24、单选 最理想的阻滞麻醉药是 ()

- A. 普鲁卡因
- B. 利多卡因
- C. 地卡因
- D. 可卡因
- E. 氯乙烷

正确答案: B

25、单选 婴儿颌骨骨髓炎治疗时应强调 ()

- A. 早期切开引流结合物理疗法
- B. 早期摘除和搔刮死骨
- C. 早期及时的全身与局部并重, 药物与适时的手术
- D. 及时的药物治疗及保守治疗
- E. 保守治疗, 避免切开引流 **正确答案: C**

26、单选 颌面部创口初期缝合最宽时间为 ()

- A. 6 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时
- E. 48 小时甚至更久的创口, 只要没有明显的化脓, 清创后仍可作初期缝合 **正确答案: E**

27、单选 下颌第 1、2 磨牙根尖感染向舌侧穿破, 最常引起下列哪个间隙感染 ()

- A. 舌下间隙
- B. 颌下间隙
- C. 翼颌间隙
- D. 咬肌间隙
- E. 下颌下间隙

正确答案: B

28、单选 翼外肌功能亢进时的临床表现为 ()

- A. 响而不痛
- B. 痛而不响

- C. 又痛又响
- D. 连续摩擦音

E. 绞锁现象 **正确答案: A**

29、单选 患者女性，40岁。双侧腮腺区反复肿大，伴双眼异物感、无泪、口干，饮水量增加。检查发现双侧腮腺肿大，质软，无压痛，张口度正常，口腔黏膜干燥，发红。腮腺导管口无红肿，分泌液清，但量少。为明确诊断，需进一步作一系列检查，其中对诊断帮助不大的是（）

- A. Schirmer 试验
- B. 腮腺平片
- C. 腮腺造影
- D. 唇腺活检
- E. 空腹血糖

正确答案: B

30、单选 关于麻醉效果，利多卡因比普鲁卡因维持的时间（）

- A. 要短
- B. 一样长
- C. 长1倍
- D. 长2倍
- E. 长3倍

正确答案: C

31、单选 患者，女性，8岁，因车祸颌面外伤而急诊，鼻翼扇动，发绀，脉弱、速，瞳孔略大，抢救措施首先是（）

- A. 立即静脉补液
- B. 应用抗生素和 T. A. T
- C. 拍片检查骨折情况
- D. 气管切开
- E. 输血

正确答案: D

32、单选 以下哪项最不符合成釉细胞瘤的 X 线特征（）

- A. 边缘常不整齐，有切迹
- B. 早期呈蜂房状后呈多房
- C. 牙根有不规则吸收
- D. 肿瘤内可见钙化影

E. 肿瘤所在的骨皮质膨隆 **正确答案: D**

33、单选 晚期骨肉瘤时（）

- A. 血清碱性磷酸酶增高
- B. 血沉加快，粘蛋白增高
- C. 血浆球蛋白增高，尿内出现凝溶蛋白
- D. 尿中黑色试验阳性

E. 以上都不是 **正确答案: A**

34、单选 面神经主要经（）

- A. 圆孔出颅
- B. 卵圆孔出颅
- C. 棘孔出颅
- D. 破裂孔出颅
- E. 茎乳孔出颅 正确答案：E

35、单选 称成釉细胞瘤为临界瘤的原因为（）

- A. 来源于牙源性上皮
- B. 长得特别大
- C. 瘤体内有牙根吸收
- D. 有局限性浸润生长
- E. 压迫三叉神经引起相应部位麻木 正确答案：D

36、单选 舌前 2 / 3 的边缘或外侧淋巴管引流至（）

- A. 颏下和肩胛舌骨肌的淋巴结
- B. 颌下和颈深淋巴结
- C. 颈深淋巴结
- D. 腮腺淋巴结
- E. 锁骨上窝淋巴结 正确答案：B

37、单选 以下不属于拔牙适应证的是（）

- A. 晚期牙周病牙已松动
- B. 影响恒牙萌出的滞留乳牙
- C. 复杂的阻生牙急性炎症期
- D. 牙外伤导致牙冠折断达牙根
- E. 颌骨良性肿瘤累及的牙

正确答案：C

38、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。行清创缝合术中，若血管条件允许，应进行（）

- A. 松解创缘，减少张力尽量拉拢缝合
- B. 撕脱的皮肤清创后，切削成全厚或中厚皮片再植
- C. 立刻做血管吻合组织再植术
- D. 采用局部皮瓣关闭创面
- E. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面 正确答案：C

39、单选 上颌骨骨折后复位固定的时间最迟不应超过（）

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 没有限制 正确答案：B

40、单选 汇合成面总静脉的静脉分支是（）

- A. 面静脉和下颌后静脉的前支
- B. 面静脉和下颌后静脉的后支
- C. 面静脉和耳后静脉
- D. 面静脉和颞浅静脉
- E. 颞浅静脉和上颌静脉

正确答案：A

41、单选 有关拔牙创的处理，错误的是（）

- A. 检查患牙是否完整、有无断根
- B. 搔刮牙槽窝、清除根尖病变及异物
- C. 检查创口有无牙碎片、骨碎片及牙结石
- D. 修整过高、过尖的骨嵴或牙槽中隔
- E. 所有拔牙创均不必缝合处理

正确答案：E

42、单选 始基囊肿好发于（）

- A. 上颌前牙区
- B. 下颌磨牙及升支区
- C. 上颌尖牙区
- D. 上颌磨牙区
- E. 上、下颌双尖牙区

正确答案：B

43、单选 下列牙位中常见双牙根的是（）

- A. 上下中切牙
- B. 上下侧切牙
- C. 上下尖牙
- D. 上第一双尖牙
- E. 下第一双尖牙

正确答案：D

44、单选 包扎止血主要适用于（）

- A. 毛细血管和小动、静脉的出血
- B. 知名动脉的出血
- C. 腔窦的出血
- D. 颈部大血管的出血
- E. 口腔内的出血

正确答案：A

45、单选 主要用于脓性引流的为（）

- A. 片状引流
- B. 纱条引流
- C. 管状引流

D. 负压引流

E. 加压引流 **正确答案：B**

46、单选 智齿冠周炎多发年龄是（）

A. 30~35 岁

B. 25~30 岁

C. 18~25 岁

D. 14~18 岁

E. 10~14 岁 **正确答案：C**

47、单选 一患有双侧完全性唇腭裂的患儿，否认家族中有类似病史，临床表现提示可能患有某种全身发育畸形综合征。耳的检查应注意（）

A. 外耳道分泌物

B. 乳突压痛

C. 耳郭缺损及听力情况

D. 邻近部位的炎症

E. 邻近部位的畸形 **正确答案：C**

48、单选 女，23 岁，双侧颞下颌关节弹响 2 年，许勒位及经咽侧位显示髁状窝前斜面有明确的骨质改变。应进一步进行下列哪项检查（）

A. 下颌骨侧位

B. 曲面断层

C. 下颌骨开口后前位

D. 颞颌关节造影

E. 升支切线位 **正确答案：D**

49、单选 下颌骨骨折最常见的部位为（）

A. 髁颈部

B. 下颌升支

C. 下颌角

D. 下颌体部

E. 下颌的颏部

正确答案：D

50、单选 患者，女，56 岁。双侧腮腺肿大，口、眼干燥 5 年，类风湿关节炎 3 年，口内导管口无唾液分泌。诊断舍格伦综合征的条件是（）

A. 具备以上三大症状之一

B. 具备以上三大症状之二

C. 具备以上三大症状

D. 仅三大症状不能诊断

E. 以上都不对 **正确答案：B**

51、单选 患者，女，35岁，因左下颌区无痛性肿胀1年就诊，局部无麻木。临床见左下颌角膨隆，皮肤正常，无波动感，口内左下磨牙区龈颊沟丰满，舌侧膨隆明显，触之有乒乓球感，黏膜无破溃。以下X线片表现，哪项最不符合造釉细胞瘤的X线特征（）

- A. 多房且房室大小相差悬殊
- B. 牙根有锯齿状吸收
- C. 肿瘤边缘皮质骨局部硬化
- D. 肿瘤内可见钙化影
- E. 肿瘤所在的骨皮质膨隆 **正确答案：E**

52、单选 上下唇动脉位于唇部的层次为（）

- A. 皮下
- B. 浅筋膜上
- C. 口轮匝肌内
- D. 黏膜下层
- E. 黏膜中 **正确答案：D**

53、单选 挫裂伤表现为（）

- A. 皮肤表层及浅真皮层损伤
- B. 创缘不整齐，裂口广，可伴有骨折
- C. 入口小而深，常为盲管伤
- D. 皮下组织被损伤，但无开放性创口
- E. 创口边缘整齐 **正确答案：B**

54、单选 唇部手术体位是（）

- A. 平卧，头侧垂位
- B. 平卧，仰头位
- C. 平卧，头侧位
- D. 平卧，头正位
- E. 平卧，低头位 **正确答案：D**

55、单选 某男，2岁，左侧完全性腭裂拟行腭裂修复术。腭裂术中凿断翼钩的目的是（）

- A. 松弛腭帆张肌的张力
- B. 松弛腭帆提肌的张力
- C. 松弛咽上缩肌的张力
- D. 松弛腭舌肌的张力
- E. 松弛腭咽肌的张力 **正确答案：A**

56、单选 拔牙创内完全形成新骨的时间是（）

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月

D. 6 个月

E. 12 个月

正确答案：C

57、单选 颌下三角内的有关重要结构在舌骨舌肌浅面自下而上的依次排序是（）

- A. 舌下神经、颌下腺导管、舌神经
- B. 舌神经、颌下腺导管、舌下神经
- C. 舌下神经、舌神经、颌下腺导管
- D. 舌神经、舌下神经
- E. 颌下腺导管、舌神经、舌下神经

正确答案：B

58、单选 交叉十字绷带用于（）

- A. 临时固定颌骨
- B. 颌面部经常采用的绷带
- C. 使用于上颌骨、面、脸部手术后
- D. 各种骨折及术后颌骨制动用
- E. 适合上颌骨骨折的牵引

正确答案：B

59、单选 面部外伤患者，面部肿胀，张口受限最可能的诊断是（）

- A. 下颌角骨折
- B. 颧弓骨折
- C. 上颌骨骨折
- D. 下颌骨髁突骨折
- E. 下颌骨正中骨折

正确答案：B

60、单选 区域性淋巴结转移率最低的是（）

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺上皮癌
- C. 基底细胞癌
- D. 未分化癌
- E. 淋巴上皮癌

正确答案：C

61、单选 移植皮片自身嵌接处缝合采用（）

- A. 一般间断缝合法
- B. 双圈式缝合法
- C. 反缝法
- D. 各种连续缝合法
- E. 褥式缝合法

正确答案：D

62、单选 下齿槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的原因是（）

- A. 注射点过高
- B. 注射点过前
- C. 注射点过低

D. 注射点过后

E. 注射入血管内 **正确答案: D**

63、单选 牙冠第五牙尖通常位于 ()

A. 近中颊尖的颊侧

B. 远中颊尖的颊侧

C. 近中舌尖的舌侧

D. 远中舌尖的颊侧

E. 远中舌尖与颊尖之间

正确答案: C

64、单选 对颧骨颧弓复合体骨折采用 ()

A. 口内切开复位固定

B. 保守治疗

C. 冠状切口切开复位固定

D. 颞部切开复位

E. 颌间牵引复位固定 **正确答案: C**

65、单选 以下关于可复性关节盘前移位临床特点的叙述, 哪项是错误的 ()

A. 典型的关节弹响病史, 继之有间断性关节绞锁史

B. 关节弹响消失, 开口受限

C. 开口时下颌偏向健侧

D. 测被动开口度时, 开口度不能增大

E. 开口运动时髁突挤压变形的关节盘不能复位 **正确答案: C**

66、单选 颌面部损伤出现脑脊液漏时, 对下列哪一项颅脑损伤具有诊断意义 ()

A. 脑震荡

B. 硬脑膜外血肿

C. 颅中窝骨折

D. 脑挫裂伤

E. 颅前窝骨折 **正确答案: C**

67、单选 患者右腮腺区恶性肿瘤, 行局部扩大切除及胸大肌皮瓣修复, 其术区未于口腔相通。创口的术后处理, 应该是 ()

A. 每日至少打开 1 次敷料, 观察创口情况

B. 除拔除引流物外, 拆线前至少还要换两次

C. 一般不宜打开敷料观察, 但其创口也可早期暴露

D. 主要根据病人的主观感觉, 判断是否存在感染

E. 无明显的感染现象, 不必全身预防性的使用抗生素 **正确答案: C**

68、单选 腮腺淋巴结的淋巴液引流到 ()

A. 枕淋巴结

B. 颌上淋巴结

- C. 颌下淋巴结
- D. 颈深上淋巴结

E. 颈深下淋巴结 **正确答案: D**

69、单选 腺样囊性癌最常发生远处转移的脏器是 ()

- A. 肺
- B. 脑
- C. 骨
- D. 肝

E. 肾 **正确答案: A**

70、单选 髁颈部骨折常伴有 ()

- A. 上颌骨折
- B. 下颌角骨折
- C. 下颌升支骨折
- D. 颧弓骨折
- E. 对侧颞孔区或颈部骨折

正确答案: E

71、单选 根治反复发作的水平阻生第三下颌磨牙冠周炎，应采取的治疗措施是 ()

- A. 冠周龈瓣上药
- B. 及时给予抗生素
- C. 注意口腔卫生，止痛
- D. 适时休息
- E. 拔除患牙 **正确答案: E**

72、单选 腭裂的手术原则不包括 ()

- A. 封闭裂隙
- B. 延伸软腭
- C. 将移位的组织结构复位
- D. 切除多余组织
- E. 重建良好的腭咽闭合功能

正确答案: D

73、单选 患者男性，63岁，右耳垂前肿性胀大8个月。近期肿物增长较快，痛向耳颞部放散。检查发现肿物约3.5cm、质地硬、有触痛、边界不清。活动度差，右眼睑闭合较对侧迟钝。对于该病的治疗，宜采用 ()

- A. 腮腺肿物切除术
- B. 保留面神经，腮腺浅叶及肿物切除
- C. 腮腺、肿物及受累面神经切除后放疗
- D. 腮腺、肿物及受累面神经切除及同侧根治性颈清
- E. 保留面神经，腮腺浅叶及肿物切除+术后放疗 **正确答案: C**

74、单选 最容易引起呼吸困难和窒息的骨折是（）

- A. 颞部粉碎性骨折
- B. 髁突颈骨折
- C. 上颌骨骨折
- D. 下颌角骨折
- E. 下颌单发正中骨折

正确答案：A

75、单选 涎腺造影检查的禁忌症是（）

- A. 腮腺慢性反复肿胀
- B. 腮腺恶性肿瘤
- C. 阴性涎石症
- D. 急性化脓性腮腺炎
- E. 外伤性涎痿 正确答案：D

76、单选 十四岁男性患者，进行性开口困难7年，面部明显不对称。5岁时曾发生颞部对冲性损伤。治疗方法宜采用（）

- A. 外科手术
- B. 局部理疗
- C. 张口训练
- D. 针灸治疗
- E. 以上都不是 正确答案：A

77、单选 急性冠周炎时，应主要以（）

- A. 全身药物治疗为主
- B. 局部冲洗上药为主
- C. 全身治疗结合局部处理为主
- D. 拔除病灶牙为主
- E. 口腔清洁为主 正确答案：C

78、单选 患者，男，45岁，因右上颌肿物行右上颌骨切除+植皮术，术后所植皮片大部分坏死，遗留较大肉芽创面，准备再行皮肤移植消灭创面。此病例植皮时最好采用（）

- A. 中厚皮片
- B. 表层皮片
- C. 全厚皮片
- D. 皮瓣
- E. 带真皮下血管网的全厚皮片 正确答案：B

79、单选 混合牙列其年龄范围一般在（）

- A. 3~7岁之间
- B. 5~10岁之间
- C. 6~12岁之间

- D. 8~15 岁之间
- E. 10~18 岁之间

正确答案：C

80、单选 哪种肿瘤属于临界瘤（）

- A. 鳃裂囊肿
- B. 成釉细胞瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 骨化纤维瘤

正确答案：B

81、单选 不是真性囊肿的是（）

- A. 角化囊肿
- B. 球上颌囊肿
- C. 始基囊肿
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 表皮样囊肿 正确答案：D

82、单选 腮腺导管口位于（）

- A. 颊部黏膜的下 1/3 处
- B. 下颌第二磨牙牙冠部平对的颊黏膜上
- C. 平对上颌第二磨牙牙冠部的颊黏膜上
- D. 颊脂垫尖
- E. 翼下颌皱襞与颊垫尖之间 正确答案：C

83、单选 关于阻生牙的概念错误的是（）

- A. 阻力来源于邻牙
- B. 阻力来源于骨组织
- C. 阻力来源于牙龈
- D. 常见部位为下颌第三磨牙及上颌第一磨牙
- E. 只能部分萌出或完全不能萌出

正确答案：D

84、单选 通常颌面部随意瓣的长度比例为（）

- A. 1: 1
- B. 1.5: 1
- C. 2~3: 1
- D. 4~5: 1
- E. 6: 1 正确答案：C

85、单选 两侧髁状突水平轴的延长线相交于枕骨大孔前缘所成的角度为（）

- A. $145^{\circ} \sim 160^{\circ}$
- B. $145^{\circ} \sim 165^{\circ}$

- C. $145^{\circ} \sim 155^{\circ}$
- D. $140^{\circ} \sim 160^{\circ}$
- E. $140^{\circ} \sim 155^{\circ}$

正确答案：A

86、单选 牙与口腔颌面部创伤的关系哪种说法是不正确的（）

- A. 可作为第二次弹片
- B. 咬合关系错乱是诊断骨折的指标之一
- C. 牙脱位一定有骨折发生
- D. 可利用牙来固定骨折
- E. 增加感染机会 正确答案：C

87、单选 妊娠拔牙相对安全时间为（）

- A. 妊娠 1、2、3 个月
- B. 妊娠 4、5、6 个月
- C. 妊娠 7、8、9 个月
- D. 产前 1 个月
- E. 妊娠 1 个月之内 正确答案：B

88、单选 皮下组织缝合采用（）

- A. 一般间断缝合法
- B. 双圈式缝合法
- C. 反缝法
- D. 各种连续缝合法
- E. 褥式缝合法 正确答案：C

89、单选 只分泌浆液的腺体是（）

- A. 下颌下腺
- B. 唇腺
- C. 舌下腺
- D. 腮腺
- E. 腮腺 正确答案：E

90、单选 在发育良好的情况下，双侧唇裂患者整复术最适合的年龄是（）

- A. 3~6 个月
- B. 6~12 个月
- C. 1~2 岁
- D. 3~4 岁
- E. 6~7 岁 正确答案：B

91、单选 颜面部疖痈的病原菌主要是（）

- A. 大肠埃希菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 链球菌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695334011100011140>