

超声波医学与技术(主管技师)《胆道、胰腺和胃肠必看考点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 一急性腹痛的患者, 超声检查发现胆囊内多发结石, 胰腺弥漫性肿大, 回声减弱, 不均匀, 脾静脉细窄, 胰腺周围可见弱回声带, 肠管扩张, 腹腔见大量透声不好的积液, 最可能的诊断为 ()。A. 水肿型胰腺炎
B. 急性胆囊炎
C. 肠梗阻
D. 慢性胰腺炎
E. 出血坏死型胰腺炎
- 2、单项选择题: 关于胆囊结石的典型声像图表现, 不正确的是 ()。A. 胆囊腔内形态稳定的强回声团
B. 后方伴声影
C. 多呈类椭圆形或弧形
D. 强回声团随体位改变而移动
E. 胆囊壁呈双层结构
- 3、单项选择题: 一位新生儿生后 2 个月黄疸不退, 超声检查示肝脏回声稍增强, 胆囊未见显示, 肝内胆管显示不清, 胆总管呈索条状稍高回声, 最可能的诊断为 ()。A. 胆囊缺如
B. 异位胆囊
C. 胆道蛔虫
D. 新生儿肝炎
E. 胆道闭锁
- 4、单项选择题: 患者女性, 69 岁。右上腹剧烈疼痛 2 天, Murphy 征阳性, 伴发热、白细胞增高。超声检查显示: 胆囊增大, 大小约 10cm×4cm, 胆囊壁弥漫性增厚, 呈双层结构, 轮廓线模糊, 胆囊腔内充盈密集细小的斑点回声因病人身体条件不允许手术, 保守治疗 3 天后复查超声, 显示胆囊增大, 壁增厚, 不平整, 胆囊底部局部缺损, 周围形成局限性积液, 胆囊内见大量絮状物回声并可见气体强回声, 可能的诊断是 ()。A. 急性胆囊炎穿孔
B. 胆囊肿瘤
C. 胆汁淤积
D. 分隔胆囊伴胆囊积脓
E. 瓷器胆囊
- 5、单项选择题: 随年龄增加, 胰腺的声像图改变表现为 ()。A. 回声减低, 体积增大
B. 回声无改变, 体积缩小
C. 回声增高, 体积增大
D. 回声增高, 体积缩小

- E. 回声减低，体积缩小
- 6、单项选择题：胃恶性淋巴瘤超声表现为（ ）。A. 胃壁增厚，正常结构消失，胃腔狭窄，呈假肾征
B. 胃壁明显增厚，呈低弱回声，内可见大小不等的弱回声结节，血运丰富，胃腔狭窄不明显
C. 肿块突向胃腔内，形态不规则，表面黏膜隆起，不平整，边界尚清晰
D. 均匀低回声类圆形肿瘤，将黏膜层顶起，形成拱桥样黏膜
E. 大小约为 10cm 的边界模糊的分叶状肿瘤，内部有不规则液化坏死区，肿瘤实性部分未探及明显血流信号
- 7、单项选择题：下列关于胆总管的描述，不正确的是（ ）。A. 起于肝总管与胆囊管的汇合处
B. 长径为 4~8cm，直径为 0.6~0.8cm
C. 走行于门静脉前右侧和下腔静脉前方
D. 被肝十二指肠韧带包被
E. 与副胰管汇合形成膨大的肝胰壶腹
- 8、单项选择题：关于蕈伞型胆囊癌的声像图特点，错误的是（ ）。A. 边缘不整齐
B. 基底较窄
C. 可单发或多发，以多发常见
D. 弱回声或中等回声多见
E. 单发病变以乳头状为主
- 9、单项选择题：胆囊腺肌增生症和其他胆囊疾病鉴别的主要依据是（ ）。A. 胆囊壁增厚的范围
B. 胆囊腔的大小
C. 胆囊壁的破坏程度
D. 增厚胆囊壁内的小囊样结构
E. 胆囊壁增厚的程度
- 10、单项选择题：一男性患儿出生后 5 周，呕吐频繁，进食后明显，体检见患儿消瘦，右上腹可扪及橄榄形肿块对其声像图的表现，下列描述不正确的是（ ）。A. 幽门壁全周性增厚，范围较局限
B. 病变长度约在 2.0~2.5cm，壁厚度约 4~8mm
C. 胃腔内可见大量潴留物，胃壁偶见逆蠕动
D. 胃幽门管狭窄变形，内膜面不平整
E. 病变短轴呈靶环征，长轴呈子宫颈征
- 11、单项选择题：一患者因黄染一周就诊。超声示肝脏肿大，回声增强，肝内胆管树枝状扩张，肝外胆管未显示，胆囊未充盈，其梗阻部位最可能为（ ）。A. 胆总管十二指肠后段
B. 胆总管壶腹部
C. 胆总管胰腺段
D. 肝门部
E. 胆总管十二指肠上段
- 12、单项选择题：一患者因胃部不适行上消化道造影，显示胃部充盈缺损，内镜检查可见胃黏膜局限性隆起，临床拟诊黏膜下肿瘤该患行影像学检查时，需和哪种疾病相鉴别（ ）。A. 胃炎
B. 胃下垂
C. 胃外压性病变
D. 胃扭转
E. 贲门失弛缓症
- 13、单项选择题：关于胆囊的超声解剖，不正确的是（ ）。A. 胆囊壁自外向内由强-弱-强三层回声带组成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697112162105006111>