

妇产科测试题（附答案）

1、林女士，26岁，既往健康，月经周期规律，32~35天一次，推测其排卵期大约发生在月经来潮前的什么时候

- A、10天左右
- B、12天左右
- C、14天左右
- D、16天左右
- E、18天左右

答案：C

2、初产妇王某，孕足月规律宫缩16小时，肛查宫口开大6cm，宫缩转弱，每5~6分钟一次。每次持续25~30秒。1小时后，肛查宫口仍开大6cm，胎头在坐骨棘上0.5cm。此种异常情况，最可能的原因是

- A、扁平骨盆
- B、均小骨盆
- C、中骨盆狭窄
- D、宫颈水肿
- E、宫颈肌瘤

答案：C

3、林某，29岁，因停经54天、腹痛伴阴道流血2天、量多急诊入院，确诊为不全流产。值班护士采取的首要措施是

- A、安排患者获得良好的休息环境
- B、及时做好清除宫内残留组织的准备
- C、治疗操作应集中，减少刺激
- D、加强心理护理，增强保胎信心
- E、继续监测并记录病情变化情况

答案：B

4、患者林女士，被诊断患有滴虫性阴道炎，前来咨询。护士告知其治疗期间注意事项，下列不对的是

- A、治疗期间避免性交
- B、被褥、内裤勤洗晒
- C、已婚男女同时治疗
- D、白带检查阴性为治愈
- E、服用甲硝唑期间禁止饮酒

答案：D

5、患者，女性，62岁。诉阴道口有一肿物脱出1年余，医生诊断为子宫脱垂。护理评估生育史4-0-1-3，有难产史。考虑该患者导致子宫脱垂的最主要原因是

- A、雌激素水平下降
- B、盆底组织萎缩退化
- C、慢性咳嗽
- D、排便困难
- E、分娩损伤

答案：E

6、总产程和产程分期的概念，正确的是

- A、从宫口开全至胎儿娩出称总产程
- B、第一产程经产妇需14~16小时
- C、第一产程初产妇需6~8小时
- D、第二产程初产妇需1~2小时
- E、第三产程约需30分钟

答案：D

7、护士小李在为某孕妇进行电子胎心监护，观察过程中出现提示胎儿宫内缺氧的指标是

- A、胎心率的波动范围在10~25次/分
- B、变异的频率 ≥ 6 次/分
- C、早期减速
- D、变异减速
- E、晚期减速

答案：E

8、陈女士，30岁，孕40周，G1P0，临产4小时，宫缩25~35秒，间隔4~5分钟，胎心140次/分，先露浮，突然阴道流水，色清，宫口开1指，下列处理不当的是

- A、立即听胎心
- B、记录破膜时间
- C、鼓励产妇在宫缩时，运用腹压加速产程进展
- D、超过12小时尚未分娩，加用抗生素
- E、抬高臀部

答案：C

9、患者，女，40岁，诊断为慢性宫颈炎，护士告知患者为排除癌变，应检查哪项内容

- A、腹部 B 超
- B、宫腔镜检查
- C、盆腔检查
- D、宫颈刮片细胞学
- E、碘试验

答案：D

10、孕妇，25 岁，孕 39+2 周。晨 6 时自觉阴道流出大量稀水样液体，遂于 10 时入院，护士采取的正确护理措施是

- A、嘱病人半卧位
- B、陪病人步行去病房
- C、患者取头低脚高位，以平车送往病房
- D、患者取头高脚低位，以平车送往病房
- E、嘱孕妇沐浴后，平车送病房

答案：C

11、关于羊水栓塞的常见病因，下列叙述不正确的是

- A、急产
- B、子宫颈裂伤
- C、前置胎盘
- D、胎盘早剥
- E、宫缩乏力

答案：E

12、孕妇，29 岁，孕 39 周，于胎儿娩出后发生产后出血。护士评估其产后出血的原因，不包括下列哪项因素

- A、胎盘因素
- B、凝血功能障碍
- C、软产道损伤
- D、子宫收缩乏力
- E、骨盆畸形

答案：E

13、张女士，30 岁，目前采用短效口服避孕药避孕，在白天服药后有反应，第二天下午前来就诊。下列属于短效口服避孕药最常见的副反应是

- A、阴道分泌物量增多
- B、恶心、食欲不振
- C、性交后出血
- D、情绪不稳定

E、注意力不集中

答案：B

14、患者，女性，26岁，结婚2年，未采取避孕措施，至今未孕。月经初潮15岁，月经周期18~20天，经期3~5天。该患者的基础体温表现为

A、单相型

B、双相型，但升高时间维持在9~10日

C、双相型，但下降缓慢

D、不规则形

E、双相型，升高时间维持在10天以上

答案：B

15、子宫内膜胎盘附着面完全修复需到产后

A、2周

B、8周

C、4周

D、10周

E、6周

答案：E

16、不属于软产道的组成部分是

A、子宫下段

B、子宫体

C、子宫颈

D、阴道

E、盆底组织

答案：B

17、某妇女，在选择避孕方式时询问有关口服复方短效避孕药的副反应，护士的回答应除外

A、可致卵巢癌

B、有类早孕反应

C、有面部色素沉着

D、有体重增加

E、有月经量减少

答案：A

18、下列不属于子宫脱垂患者临床特点的是

A、自觉外阴有块状物脱出

B、月经量增多

- C、腰骶部酸痛和下坠感
- D、排尿或排便困难
- E、经期、劳累情况下症状加重

答案：B

19、某产妇，30岁，临产后子宫收缩具有正常的节律性、对称性和极性，但持续时间短、间隔时间长、强度弱，诊断为子宫收缩乏力，下述哪种情况不可能导致子宫收缩乏力

- A、头盆不称
- B、过度紧张
- C、子宫壁过度膨胀
- D、恰当地应用宫缩药
- E、应用大量镇静药

答案：D

20、关于老年性阴道炎，正确的说法是

- A、常见于围绝经期妇女
- B、阴道壁常有较深溃疡
- C、阴道黏膜大片出血斑
- D、小剂量雌激素治疗有效
- E、4%碳酸氢钠灌洗可增效

答案：D

21、初产妇，30岁，足月妊娠，该产妇发生产后出血，出血量大且难以控制出血，其原因最可能是

- A、产妇合并急性全身性疾病
- B、羊水过多子宫肌纤维过度伸展
- C、凝血功能障碍
- D、软产道裂伤达子宫下段
- E、部分胎盘植入

答案：C

22、患者，女，30岁，妊娠35周，受到撞击后腹部剧烈疼痛1小时。查体：体温36℃，脉搏110次/分，血压140/100mmHg，阴道无流血，宫口未开，未破膜，子宫足月妊娠大小，板状硬，有压痛，胎心率90次/分，胎位不清。该患者可能发生的问题是

- A、前置胎盘
- B、胎盘早期剥离
- C、流产

- D、早产
- E、宫外孕

答案：B

23、滴虫性阴道炎的临床表现不包括

- A、脓性泡沫状白带
- B、外阴瘙痒
- C、性交痛
- D、阴道壁皱褶消失
- E、阴道黏膜有散在出血斑点

答案：D

24、过期妊娠的治疗原则是

- A、应根据胎盘功能选择分娩方式
- B、应根据胎儿大小选择分娩方式
- C、应根据宫颈成熟度选择分娩方式
- D、应三方面综合分析选择分娩方式
- E、应选择以剖宫产作为分娩方式

答案：D

25、患者，女，58岁，停经8年后阴道流血。妇科检查：宫颈表现光滑，子宫丰满、软，双侧附件阴性。应主要怀疑的疾病是

- A、老年性阴道炎
- B、子宫肌瘤
- C、子宫内膜癌
- D、宫颈癌
- E、卵巢癌

答案：C

26、下列哪项是重度子痫前期孕妇的表现

- A、全血黏度持续升高
- B、尿雌三醇值急剧下降
- C、后穹隆穿刺阳性
- D、出现病理缩复环
- E、B超见宫颈有部分胎盘

答案：A

27、羊水栓塞发生在足月分娩者死亡率高达

- A、40%~50%
- B、50%~60%

- C、60%~70%
- D、70%~80%
- E、80%~90%

答案：D

28、王女士，G1P0，孕 38 周，宫口开大 5cm，S+1，胎膜未破，胎位正常，无头盆不称，宫缩每 20 秒/5~6 分钟，宫缩强度弱，最佳处理

- A、予人工破膜后观察产程进展
- B、立刻给予缩宫素加速静滴
- C、精神护理和剖宫产术前准备
- D、人工破膜后即予缩宫素静滴
- E、心理护理并等待其自然进展

答案：A

29、某妇女，因意外怀孕行吸宫术，为预防其术后发生感染，应嘱受术者术后禁止性生活及盆浴的期限为术后

- A、1 周
- B、2 周
- C、3 周
- D、1 个月
- E、2 个月

答案：D

30、孕妇，28 岁，孕 38 周，头痛，呕吐伴自觉胎动减少一天来院。血压 180/110mmHg，尿蛋白(+++)，胎心 130 次/分。阴道检查见宫颈管未消失，下一步急需做的是

- A、做 NST 检查
- B、胎儿心电图检查
- C、观察子宫收缩情况
- D、观察孕妇 T、P、R
- E、观察阴道分泌物

答案：A

31、王女士，51 岁，近年月经周期不规则，行经 2~3 天干净，量较以前减少，自感阵发性潮热、出汗，偶有心悸、眩晕，妇科检查子宫稍小。其余正常。护士应向其提供的相关知识是

- A、无排卵型功能失调性子宫出血相关知识
- B、围绝经期综合征相关知识
- C、黄体萎缩延迟相关知识

D、黄体发育不全相关知识

E、神经衰弱相关知识

答案：B

32、胎产式是指

A、胎儿纵轴与母体骨盆的关系

B、胎儿纵轴与母体纵轴的关系

C、胎儿先露部与母体纵轴的关系

D、胎儿先露部与母体骨盆轴的关系

E、胎儿在母体内的姿势

答案：B

33、患者，女性，45岁。近年来月经周期紊乱，持续时间长(>10天)，经量大(比原来多1倍)。妇科检查无异常。诊断性刮宫显示：子宫内膜增生过长。应考虑为

A、宫颈癌

B、围绝经期功血

C、子宫内膜癌

D、黄体功能不足

E、宫颈息肉

答案：B

34、孕妇，孕40周，G1P0，临产8小时，产妇烦躁不安，持续腹痛拒按，查子宫收缩强，间歇时不放松，胎心听不清，宫口开大1cm，S-2，应首选的措施是

A、人工破膜观察羊水性状

B、静脉滴注小剂量缩宫素

C、立即行剖宫产术前准备

D、给予精神安慰以观后效

E、遵医嘱给予宫缩抑制剂

答案：E

35、某产妇，经阴道助产分娩一男婴，体重3200g。胎盘娩出后阴道持续出血约800ml。护理措施正确的是

A、不能按摩子宫，以免再出血

B、检查胎盘、胎膜是否完整

C、会阴垫不用保留

D、不可使用抗生素

E、不可使用缩宫素

答案：B

36、以下关于羊水栓塞的治疗，错误的是

- A、使用肾上腺素抗过敏
- B、治疗凝血功能障碍
- C、使用抗生素预防感染
- D、使用镇静解痉药物解除支气管痉挛
- E、等待自然分娩

答案：E

37、Apgar 评分的体征不包括

- A、体温
- B、呼吸
- C、皮肤颜色
- D、喉反射
- E、肌张力

答案：A

38、下列进入第二产程的标志是

- A、宫口开全
- B、胎头拨露
- C、产妇屏气，肛门放松
- D、宫缩时会阴膨出，肛门放松
- E、胎先露降至坐骨棘水平

答案：A

39、患者，女，25岁，因下腹痛1天入院，呈急性病容，下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张。妇科查体：阴道充血，有大量脓性分泌物，有臭味，宫颈充血，水肿，举痛，后穹隆触痛明显，宫体及宫旁压痛明显。测 T39.5℃，P90次/分，R20次/分。预防措施不包括

- A、给予物理降温
- B、给予补充营养，增加液体摄入
- C、选择抗生素治疗
- D、给予清热解毒、活血化瘀的中药
- E、给予清宫术

答案：E

40、慢性胎儿窘迫多发生于

- A、妊娠中期
- B、妊娠末期

- C、分娩早期
- D、分娩期
- E、第二产程

答案：B

41、某妇女在接受人工流产术时发生人工流产综合征，首选的处理措施是

- A、帮助患者改变体位
- B、肌肉注射阿托品
- C、安慰受术者
- D、注意保温
- E、停止手术操作

答案：B

42、围绝经期综合征内分泌最早变化的是

- A、卵巢功能衰退
- B、下丘脑功能退化
- C、垂体功能退化
- D、雌激素分泌增多
- E、促性腺激素分泌下降

答案：A

43、产妇，33岁，足月产后3天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。患者产后1周反复出现寒战、高热，下肢水肿、皮肤发白疼痛。下列哪项不是此时的护理重点

- A、每天测量下肢周径
- B、观察血液培养有无细菌
- C、做好肝素治疗的护理
- D、物理降温
- E、注意观察患者的心理状态

答案：B

44、与导致臀先露无关的因素是

- A、羊水过多
- B、羊水过少
- C、胎头衔接受阻
- D、前置胎盘
- E、原发性宫缩乏力

答案：E

45、男婴，G1P1，39周宫内妊娠，于2011年5月30日顺利娩出，体重3.7kg，心率94次/分，无呼吸，四肢稍屈，无喉反射，口唇青紫全身苍白。该新生儿Apgar评分为

- A、5分
- B、4分
- C、3分
- D、2分
- E、1分

答案：D

46、妊娠合并糖尿病对胎儿的不良影响，不包括

- A、早产儿
- B、胎儿畸形
- C、溶血症
- D、巨大儿
- E、胎儿生长受限

答案：C

47、下列不是无排卵型功能失调性子宫出血临床表现的是

- A、多发生于青春期或围绝经期
- B、月经周期无一定规律性
- C、月经周期正常
- D、经期长短不一
- E、经量时多时少

答案：C

48、患者，女，35岁，确诊为重度宫颈糜烂，拟行宫颈电烙，此时应告知患者治疗时间应选择在

- A、月经干净后3~7天内进行
- B、月经前1~7天内进行
- C、月经干净后7~10天进行
- D、月经干净后10~14天进行
- E、月经干净后1~2天内进行

答案：A

49、王女士，28岁，孕41周，G1P0，临产12小时入院，骨盆外测量正常，估计胎儿体重3400g，宫口开4cm，胎膜未破。LOA，S-1，宫缩30~40秒/3分钟，中强，首选的措施是

- A、等待自然分娩

- B、静推地西洋
- C、肌注哌替嚏
- D、人工破膜
- E、静滴缩宫素

答案：D

50、患者，女，53岁，绝经4年，近20日再现阴道流血。查子宫稍大稍软。护理评估时，应特别关注哪项检查的结果

- A、B超检查
- B、胸部X线检查
- C、分段刮宫活组织检查
- D、刮取子宫内膜病理检查
- E、阴道镜检查

答案：C

51、产褥病率是指

- A、产后12小时后每4小时测体温1次，体温2次达到或超过38℃
- B、产后24小时至10天内每4小时用口表测体温1次，有连续2次达到或超过38℃
- C、产后每4小时测体温1次，有2次体温达到38℃
- D、产后12天每4小时测体温1次，有2次体温达到或超过38℃
- E、产褥期内2次体温达到或超过38℃

答案：B

52、下列导致子宫破裂的原因中不正确的是

- A、胎先露下降受阻
- B、镇静药使用过多
- C、各种不适当的阴道助产手术
- D、急性大量使用催产素
- E、子宫壁瘢痕破裂

答案：B

53、对子宫峡部的描述，正确的是

- A、为宫体的一部分
- B、临产后形成子宫下段达脐平
- C、妊娠期变软不明显
- D、非孕时长度为1cm
- E、下端为解剖学内口

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698041062141006033>