

临床医学模拟题+答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 以下不是引起低磷血症的常见原因是（ ）

- A、细胞外磷酸盐丢失
- B、维生素 D 缺乏
- C、磷向细胞外转移
- D、肾磷酸盐阈值降低
- E、输葡萄糖及胰岛素

正确答案：C

2. 硬膜外麻醉时局麻药浓度的选择，正确的是（ ）

- A、局麻药的浓度不影响阻滞平面
- B、浓度的选择应根据手术部位的不同作调整
- C、小儿由于其生理特点，局麻药的用量按体重计算相对偏大，浓度偏高
- D、乳腺手术需要阻滞的平面较广，局麻药的浓度应适当提高
- E、局麻药浓度越高，肌松效果越好

正确答案：B

3. 4:3:2 溶液的组成成分是（ ）

- A、2 份 10%葡萄糖注射液 3 份 0.9%氯化钠注射液 4 份 1.4%碳酸氢钠
- B、4 份 10%葡萄糖注射液 3 份 0.9%氯化钠注射液 2 份 1.4%碳酸氢钠
- C、2 份 10%葡萄糖注射液 4 份 0.9%氯化钠注射液 3 份 1.4%碳酸氢钠
- D、4 份 10%葡萄糖注射液 2 份 0.9%氯化钠注射液 3 份 1.4%碳酸氢钠
- E、3 份 10%葡萄糖注射液 4 份 0.9%氯化钠注射液 2 份 1.4%碳酸氢钠

正确答案：E

4. 治疗耐青霉素 G 的金黄色葡萄球菌败血症, 可首选()

- A、苯唑西林
- B、氨苄西林
- C、红霉素
- D、羧苄西林
- E、氯唑西林

正确答案: A

5. 以下氨基酸的代谢中间产物为同型半胱氨酸的是 ()

- A、苯丙氨酸
- B、甲硫氨酸
- C、精氨酸
- D、亮氨酸
- E、酪氨酸

正确答案: B

6. 尿微量清蛋白, 以下说法哪项是错误的 ()

- A、是指低分子量的蛋白
- B、超过尿蛋白正常范围的上限而定性方法又不能测出
- C、用常规方法不能测出
- D、是比较灵敏的早期发现肾损伤的指标
- E、可在隐匿型肾炎及肾炎恢复期尿中出现

正确答案: A

7. 人工喂养的适应证, 除外哪项 ()

- A、母亲患急、慢性传染病
- B、急性乳腺炎
- C、严重肝、心脏疾病不宜哺乳
- D、半乳糖血症的婴儿

正确答案: B

8. 关于小儿维生素 D 缺乏性佝偻病的预防措施, 不正确的是() ()

- A、适当多晒太阳
- B、孕母补充维生素 D 及钙剂

C、早产儿 2 个月时开始补充维生素 D

D、及时添加辅食

正确答案：C

9. 在损伤性气胸中, 开放性气胸特有的病理生理表现是()

A、气体交换量下降

B、伤侧肺完全萎缩

C、回心血量减少

D、纵隔摆动

E、健侧肺部分萎缩

正确答案：D

10. 门诊处方一般不得超过 7 日用量;对于某些慢性病或特殊情况, 医师注明理由可以() ()

A、延长至 15 日用量

B、延长至 30 日用量

C、适当延长用量期限

D、延长至 20 日用量

正确答案：C

11. 膀胱高度充盈的病人, 首次导尿量不得超过()

A、1000mL

B、500mL

C、1500mL

D、3000mL

E、100mL

正确答案：A

12. 与动脉粥样硬化发生有关的血脂异常不包括()

A、高密度脂蛋白增高

B、低密度脂蛋白增高

C、胆固醇增高

D、极低密度脂蛋白增高

E、甘油三酯增高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698060033137007005>