

中级卫生专业资格口腔医学主治医师（中级）模拟题 2021
年(81)

(总分 93.XX02,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 下列药物可引发药物性牙龈增生，但不包括
 - A. 苯妥英钠
 - B. 环孢菌素
 - C. 硝苯地平
 - D. 尼群地平
 - E. 利福平
2. 正常情况下，唾液中含有量最高的免疫球蛋白是
 - A. IgA
 - B. IgG
 - C. IgE
 - D. IgM
 - E. IgD
3. 口腔健康促进策略的叙述中正确的是
 - A. 卫生行政领导在口腔健康促进中起着决定性作用
 - B. 口腔健康促进以口腔疾病的二级预防为基础
 - C. 口腔健康促进由口腔疾病预防和口腔健康教育两部分组成
 - D. 口腔健康保护是口腔健康促进的核心组成部分
 - E. 卫生行政领导和各级医务人员在促进口腔健康的实际工作中没有关系
4. 病例对照研究的特点中正确的是
 - A. 研究准确度高
 - B. 属于前瞻性研究
 - C. 需要大量人力和物力
 - D. 研究时间较长
 - E. 适合研究病程较长的慢性病
5. 口腔健康教育常用的教育方法中不包括
 - A. 问卷调查
 - B. 组织小型讨论会
 - C. 借助大众传播渠道
 - D. 个别交谈
 - E. 组织社区活动
6. 我国初级口腔卫生保健的三个层次中不包括

- A. 口腔健康教育
 - B. 口腔健康促进
 - C. 口腔检查与早期诊断
 - D. 功能重建
 - E. 症状保健
7. 患儿，男性，3个月，体温39.1℃，哭闹不止，左眶下、眼睑红肿，左上牙龈、硬腭黏膜红肿，最有可能的诊断是
- A. 新生儿颌骨骨髓炎
 - B. 眶下间隙感染
 - C. 上颌骨囊肿继发感染
 - D. 面部疔
 - E. 边缘性颌骨骨髓炎
8. 颌面部的第三快速发育期是指
- A. 16~19岁，第三恒磨牙萌出
 - B. 7个月至6岁，乳牙列期
 - C. 4~7岁，第一恒磨牙萌出
 - D. 7~11岁，替牙列期
 - E. 11~13岁，第二恒磨牙萌出
9. 有利于细菌在牙上定居的因素包括
- A. 唾液中的糖原
 - B. 由细菌产生的细胞外多糖
 - C. 口腔细菌间的相互特异作用
 - D. 获得膜
 - E. 以上全是
10. 关于直接盖髓术不正确的叙述是
- A. 隔离口水，消毒牙面
 - B. 用生理盐水冲洗窝洞
 - C. 穿髓孔直径大于0.5mm
 - D. 盖髓剂放在穿髓孔上方
 - E. 盖髓后用氧化锌丁香油糊剂暂封
11. 牙体形态异常不包括
- A. 融合牙
 - B. 釉质发育不全
 - C. 牙中牙
 - D. 牙根数目异常
 - E. 畸形中央尖
12. 关于氟牙症叙述不正确的是
- A. 氟斑牙又称斑釉牙
 - B. 具有地区性
 - C. 常表现为釉质表面有白垩色到褐色斑块
 - D. 乳牙列或恒牙列均好发
 - E. 严重时可致釉质缺损
13. 可复性牙髓炎行盖髓术后复诊的时间为
- A. 1~2天

- B. 3~4 天
 - C. 5~6 天
 - D. 1~2 周
 - E. 2~3 个月
14. 口腔念珠菌病口腔局部治疗宜选用哪种含漱剂
- A. 弱碱性液体
 - B. 弱酸性液体
 - C. 含抗生素的液体
 - D. 含激素的液体
 - E. 含止痛药物的液体
15. 不属于与内分泌因素有关的牙周病为
- A. 青春期龈炎
 - B. 青少年牙周炎
 - C. 妊娠期龈炎
 - D. 妊娠性龈瘤
 - E. 糖尿病型牙周炎
16. 银汞合金中合金粉由哪几种金属材料组成
- A. 银、锡、铁、铅
 - B. 银、锡、铜、锌
 - C. 银、锡、铜、铅
 - D. 银、锡、铜、铁
 - E. 银、铁、铜、锌
17. 龋齿的治疗方法是
- A. 药物治疗
 - B. 药物治疗+磨除法
 - C. 充填术
 - D. 充填术+药物治疗+磨除法
 - E. 药物治疗+充填术+拔除术
18. 牙齿发育异常不包括
- A. 结构异常
 - B. 牙列异常
 - C. 形态异常
 - D. 数目异常
 - E. 萌出异常
19. 盘状红斑狼疮典型的头面部皮肤表现为
- A. 玫瑰疹
 - B. 蝴蝶疹
 - C. 黏膜斑
 - D. 蔷薇疹
 - E. 靶形红斑
20. 淋病的口腔黏膜表现为
- A. 全口黏膜充血发红，浅表溃疡
 - B. 口腔黏膜大面积糜烂
 - C. 黏膜表面细小淡红色丘疹

- D. 黏膜表面灰白色或黄褐色假膜
 - E. 黏膜表面白色丝状斑片
21. 第一恒磨牙异位萌出是指
- A. 第一恒磨牙近中阻生
 - B. 第一恒磨牙远中阻生
 - C. 第一恒磨牙近中阻生，同时伴有第二乳磨牙牙根吸收
 - D. 第一恒磨牙近中阻生，同时伴有第二乳磨牙牙根吸收和间隙丧失
 - E. 第一恒磨牙远中阻生，同时伴有第二乳磨牙牙根吸收和间隙丧失
22. 下列实验流行病学的主要步骤中，不正确的是
- A. 明确研究目的
 - B. 确定试验对象
 - C. 确定试验样本量
 - D. 确定暴露组与非暴露组
 - E. 开放试验与盲法试验
23. 下列口腔健康教育策略的叙述中，错误的是
- A. 国家或地方的健康目标中，应包括口腔保健项目
 - B. 口腔健康教育应是临床医疗服务的组成部分
 - C. 应发挥领导部门的主导作用
 - D. 每项口腔卫生保健服务应包括口腔健康教育
 - E. 口腔健康教育信息应强调准确和严谨
24. 下列关于初级卫生保健的五项基本原则中，错误的是
- A. 平等分配
 - B. 重点治疗
 - C. 多方合作
 - D. 适宜技术
 - E. 社会参与
25. 临床检查牙本质过敏症的主要方法为
- A. 温度刺激
 - B. 化学刺激
 - C. 探针检查牙敏感点
 - D. 叩诊
 - E. 视诊
26. 慢性龈缘炎的表现之一是
- A. 牙龈粉红色
 - B. 存在牙龈点彩
 - C. 附着丧失 4mm
 - D. 探诊后牙龈出血
 - E. 牙齿松动
27. 放置失活剂错误的方法是
- A. 暴露穿髓孔，直径约为 0.5~1mm
 - B. 用氧化锌膏严密加压封堵
 - C. 对于邻面龋洞应防止失活剂外溢
 - D. 掌握失活时间
 - E. 封药后疼痛较严重时，应重新开放

28. 根管长度测量最不准确的方法是
- A. 统计学的牙平均长度
 - B. 根管器械探测
 - C. X线片法
 - D. 根管长度电测法
 - E. 根管工作长度测量板
29. 盖髓剂应具备的特性中不正确的是
- A. 能促进牙髓组织再修复能力
 - B. 对牙髓组织无毒性
 - C. 渗透性不能强
 - D. 有杀菌或抑菌作用
 - E. 药物效果稳定持久
30. 临床常用的酸蚀剂
- A. 10%~30%柠檬酸
 - B. 10%~15%磷酸
 - C. 30%~50%磷酸
 - D. 30%~50%醋酸
 - E. 10%~15%醋酸
31. 下列关于充填后牙髓继发痛的叙述, 哪一项描述是错误的
- A. 应去除原充填物, 开髓引流
 - B. 常因在备洞过程中物理刺激激惹牙髓所致
 - C. 牙髓处于充血状态
 - D. 冷热刺激后无明显延缓痛
 - E. 冷热刺激后仅有短暂的延缓痛
32. 龈下菌斑为主的细菌是
- A. 需氧或兼性厌氧菌
 - B. 革兰阳性菌
 - C. 革兰阴性兼性厌氧菌及专性厌氧菌
 - D. 变形链球菌
 - E. 唾液链球菌
33. 不属于牙龈切除术的适应证的为
- A. 牙周袋超过膜龈联合
 - B. 有足够的附着龈
 - C. 暴露临床牙冠, 利于修复
 - D. 消除骨上袋
 - E. 纤维性牙龈增生
34. 畸形中央尖折断引起牙髓或根尖周病变时, 为保存患牙并促使牙根发育, 可采用
- A. 牙髓塑化治疗
 - B. 干髓术
 - C. 牙髓切断术
 - D. 根尖诱导成形术
 - E. 盖髓术
35. 按龋坏程度可将龋病分为
- A. 急性龋、慢性龋、静止性龋

- B. 浅龋、中龋、深龋
 - C. 窝沟龋、平滑面龋
 - D. 牙釉质龋、牙本质龋和牙骨质龋
 - E. 干性龋、湿性龋
36. 下列不是根尖诱导成形术适应证的是
- A. 新鲜冠折露髓、露髓孔小于 1mm 的年轻恒牙
 - B. 牙髓病已波及根髓，而不能保留根髓的年轻恒牙
 - C. 牙髓病已波及根髓，不能保留全部根髓的年轻恒牙
 - D. 牙髓全部坏死的年轻恒牙
 - E. 发生根尖周炎症的年轻恒牙
37. 为尽量防止观察者和被实验者的主观成见或偏见影响实验结果，应
- A. 采用系统分组法
 - B. 采用单盲研究
 - C. 采用双盲研究
 - D. 采用公开实验
 - E. 采用随机分组法
38. 抽样调查的抽样方法中不包括
- A. 多级抽样
 - B. 试点抽样
 - C. 分层抽样
 - D. 系统抽样
 - E. 整群抽样
39. 下列属于口腔健康促进途径的是
- A. 医师向患者传授口腔健康知识
 - B. 到社区宣传护牙方法
 - C. 爱牙日大型咨询活动
 - D. 在报纸杂志上刊登口腔科普文章
 - E. 在某地区推广使用窝沟封闭
40. 在整理分析资料时，为知道一组观察值的变异程度，常计算
- A. 平均值
 - B. 标准差
 - C. 构成比
 - D. 百分率
 - E. 标准误
41. 患儿，男性，12 岁，颈上部出现无痛性肿块 1 周，经 B 超检查发现是囊性肿块，穿刺见血性液体，10 分钟后未见血性液体凝固，该患儿可能是
- A. 鳃裂囊肿
 - B. 血管畸形
 - C. 淋巴血管瘤
 - D. 神经鞘膜瘤
 - E. 血外渗性囊肿
42. 对上前牙邻面接触点描述正确的是
- A. 颌龈径小于唇颌径
 - B. 在邻面中 1/3 处

- C. 在邻切面 1/3 处
 - D. 在邻面龈 1/3 处
 - E. 以上说法都不对
43. 消毒窝洞理想的药物应该是
- A. 消毒力弱、刺激性小、不损伤深层牙髓活力
 - B. 刺激性小、渗透性小、向深层组织侵袭
 - C. 刺激性大、消毒力强、足以杀死细菌
 - D. 消毒力强、刺激性小、渗透性小、不使牙体组织变色
 - E. 消毒力适中、刺激性小、渗透性强、不使牙体组织变色
44. 真性牙周袋的形成是由于
- A. 牙龈增生
 - B. 牙龈水肿
 - C. 牙龈退缩
 - D. 牙齿移位
 - E. 结合上皮根方移位
45. 急性牙槽脓肿的发展过程一般经历
- A. 浆液期、化脓期、引流期
 - B. 根尖脓肿、骨膜下脓肿、黏膜下脓肿
 - C. 根尖炎症、根尖肉芽肿、根尖囊肿
 - D. 急性根尖炎、慢性根尖炎、慢性牙槽脓肿
 - E. 根尖脓肿、骨膜下脓肿、面部蜂窝织炎
46. 下列患者不适合牙髓电测者是
- A. 冠心病患者
 - B. 高血压患者
 - C. 装心脏起搏器者
 - D. 癫痫病患者
 - E. 糖尿病患者
47. 多形渗出性红斑口腔黏膜病变特点为
- A. 黏膜表面出现溃疡
 - B. 红斑、水疱
 - C. 黏膜出现针头大小的透亮水疱
 - D. 黏膜出现致密的白色伪膜
 - E. 黏膜表现伪白色条纹
48. 深龋患者激发痛较重，洞底软龋能够彻底去净，治疗方法应选择
- A. 双层垫底，一次完成充填治疗
 - B. 局麻后开髓失活，行牙髓治疗
 - C. 先做安抚疗法，待一到二周复诊时症状消除后，再以双层垫底充填
 - D. 施行活髓切除术
 - E. 间接盖髓、双层垫底一次完成充填治疗
49. 深龋常见的自觉症状是
- A. 自发性痛
 - B. 阵发性痛
 - C. 激发痛
 - D. 夜间痛

- E. 放射性痛
50. 不是扁平苔藓口腔表现的是
- A. 糜烂 B. 水疱
C. 丘疹 D. 斑块
E. 皲裂
51. 牙周病的全身易感因素不包括
- A. 遗传因素
B. 性激素
C. 吸烟
D. 糖尿病
E. 高血压
52. 结节性红斑是白塞病典型的皮肤损害，尤其多见于
- A. 颧部
B. 上臂内侧
C. 下肢
D. 肌肉注射部位
E. 静脉注射部位
53. 恒牙迟萌可能的原因有
- A. 乳牙早失
B. 乳牙滞留
C. 多生牙、牙瘤或囊肿
D. 先天性甲状腺分泌缺乏、颅骨锁骨发育不全等全身性疾病
E. 以上都是
54. 根尖诱导成形术常用的诱导剂为
- A. 碘仿糊剂
B. 甲醛甲酚
C. 磷酸锌水门汀
D. 氧化锌丁香油糊剂
E. 氢氧化钙及其制剂
55. WHO 口腔健康标准中正确的是
- A. 牙齿颜色正常
B. 牙齿数量正常
C. 牙齿无松动
D. 牙龈颜色正常
E. 口腔黏膜正常
56. 口腔癌致癌因素中，最危险的习惯是
- A. 长期嚼槟榔
B. 饮酒
C. 长时间光照
D. 吸烟
E. 饮食不均衡
57. 下列口腔科常用消毒剂中，不推荐作为表面或浸泡消毒的是
- A. 戊二醛
B. 酚类

- C. 次氯酸钠
 - D. 乙醇
 - E. 碘伏
58. 抽样调查是
- A. 用目标人群来推断样本人群的患病情况
 - B. 用观察单位来推断样本人群的患病情况
 - C. 用总体人群来推断样本人群的患病情况
 - D. 用样本人群来推断总体人群的患病情况
 - E. 用观察单位来推断目标人群的患病情况
59. 颅部生长发育完成后，面部生长发育按以下顺序完成
- A. 宽度、长度、深度
 - B. 长度、宽度、深度
 - C. 深度、长度、宽度
 - D. 宽度、深度、长度
 - E. 深度、宽度、长度
60. 室性心律失常患者首选的局麻药是
- A. 利多卡因
 - B. 普鲁卡因
 - C. 丁卡因
 - D. 布比卡因
 - E. 卡波卡因
61. 龋病保守治疗的主要目的是
- A. 保护牙髓
 - B. 用药物使龋坏的牙体组织再矿化
 - C. 使病变终止
 - D. 使可复性牙髓炎的牙髓恢复正常
 - E. 延缓龋病的发展
62. 用单纯的旋转动作就可以拔除的牙是
- A. 上颌第一磨牙
 - B. 下颌第二磨牙
 - C. 上颌切牙
 - D. 下颌切牙
 - E. 上颌第二前磨牙
63. 釉质发育不全与浅龋的区别为
- A. 釉质表面缺损
 - B. 色素沉着斑
 - C. 探针时损害部位硬而光滑
 - D. 患者无症状
 - E. 釉质表面有白垩斑
64. 激光脱敏治疗的原理为
- A. 热凝封闭牙本质小管
 - B. 阻塞牙本质小管
 - C. 减小牙本质小管直径
 - D. 作用于牙本质小管牙髓的末梢

- E. 作用于牙本质细胞突
65. 预防牙周疾病提高宿主抵抗力的措施是
- A. 降低牙尖高度和斜度
 - B. 去除不良修复体
 - C. 消除食物嵌塞
 - D. 去除充填物悬突
 - E. 合理补充营养素
66. 下列哪一项不是银汞合金的特点
- A. 对牙髓有刺激
 - B. 硬度大
 - C. 耐磨性强
 - D. 可塑性大，操作方便
 - E. 抗压强度大
67. 下列哪项不是复发性口腔溃疡的临床特点
- A. 好发于中青年
 - B. 反复发作的溃疡为圆形或椭圆形，表面有黄色伪膜，周围红晕
 - C. 多见于唇、颊、舌等非角化黏膜
 - D. 病变可影响到口周皮肤
 - E. 病程 7~14 天，有自限性
68. 关于根分叉病变的分度，哪项描述不正确
- A. I 度：可及分叉外形，X 线片示：无异常表现
 - B. II 度：只有一侧可探入分叉区，X 线片示：骨密度略降低
 - C. II 度：只有一侧或双侧可探入分叉区，但不能穿透，X 线片示：骨密度略降低
 - D. III 度：探针能通过分叉区，但有牙龈覆盖，X 线片示：骨密度降低区
 - E. IV 度：探针能通过分叉区，且无牙龈覆盖，X 线片示：骨密度降低区
69. 菌斑的组成成分最多的是
- A. 无机物
 - B. 糖类
 - C. 蛋白质
 - D. 脂肪
 - E. 水
70. 邻面龋好发于
- A. 青少年
 - B. 儿童
 - C. 成年人
 - D. 老人
 - E. 以上均好发
71. 多形渗出性红斑的典型皮肤损害是
- A. 下肢伸侧结节性红斑
 - B. 口腔、生殖器发生固定性红斑
 - C. 颜面、手掌、足背呈对称性虹膜状红斑
 - D. 躯干、四肢、面部呈固定性红斑
 - E. 面部、胸部呈带状红斑
72. 确诊多生牙的依据是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/69811130075006036>