



# 精神科常用药物

# 抗精神病药

氯丙嗪

奋乃静

➤ 吩噻嗪类

氟哌啶醇

➤ 丁酰苯类

氯氮平

奥氮平

喹硫平

舒必利

利培酮

帕利哌酮

齐拉西酮

阿立哌唑

➤ 其他抗精神病药

抗精神病药

# 氯丙嗪

剂 量

50mg/片

药理作用

阻断多巴胺受体

习惯症

- 精神分裂症
- 躁狂症
- 具有精神运动兴奋症状群的其他疾病

不良反应

嗜睡、体位性低血压、锥体外系反应

氯丙嗪



# 奋乃静

剂 量

2mg/片

药理作用

氯丙嗪相似,镇  
静作用较氯丙嗪  
为弱

奋乃静



习惯症

用于幻觉、妄想  
症比较明显的病  
人

不良反应

较易引起锥体外系  
症状,泌乳素增高,  
对内脏的毒副作用  
较小

# 氟哌啶醇

## 剂 量

5mg/支  
2mg/片

## 药理作用

阻断锥体外系多巴胺受体

## 习惯症

兴奋躁动、敌对情绪和攻击行为

## 不良反应

锥体外系反应常见,其中以急性肌张力障碍、静坐不能最常见



氟哌啶醇

# 氯氮平


剂 量

25mg/片

药理作用

阻断5-羟色胺受体和多巴胺受体

氯氮平



习惯症

- 精神分裂症
- 躁狂症
- 降低精神分裂症病人的自杀风险

不良反应

粒细胞减少、流涎、头晕、体重增加、心电图异常、便秘

# 奥氮平片(再普乐)

剂 量

5mg/片

药理作用

与氯氮平相似,由氯氮平分子结构改造发展而来

奥氮平片



习惯症

- 精神分裂症
- 躁狂发作
- 双相情感障碍

不良反应

嗜睡和体重增加。

注意:糖尿病人慎用

# 喹硫平(启维、思瑞康)

## 剂量

0、1g/片(启维)  
0、2g/片(思瑞康)

## 药理作用

有效阻断多巴胺D2受体。

喹硫平



## 习惯症

- 精神分裂症
- 与心境稳定剂联合治疗双向情感障碍

## 不良反应

困倦、头晕、口干、轻度无力、便秘、心动过速、直立性低血压以及消化不良

# 舒必利

## 剂 量

0、1g/片  
0、1g/针剂

## 药理作用

阻断多巴胺受体

## 习惯症

- 精神分裂症
- 木僵、幻觉、妄想、淡漠、孤僻、
- 止呕

## 不良反应

- 1、失眠、乏力、食欲不振。
- 2、抗胆碱能作用:口干、视物模糊、心动过速、排尿困难、便秘等。
- 3、锥体外系反应:震颤、僵直、流涎、运动迟缓、静坐不能、急性肌张力障碍、TD。

舒必利

舒必利针剂:嗜铬细胞瘤、高血压、严重的心、肝病患者禁用。

# 利培酮(维思通)

## 剂 量

1mg/片  
1mg/ml

## 药理作用

选择性的单胺  
能拮抗剂

利培酮



## 习惯症

- 急性和慢性精神分裂症
- 双相情感障碍。

## 不良反应

失眠、头痛、口干;锥体外系反应、血清泌乳素增高。

# 帕利哌酮(芮达)

## 剂 量

3mg/片  
6mg/片

## 药理作用

中枢多巴胺受体,5-羟色胺受体, $\alpha$ -肾上腺素受体,H1组胺受体拮抗剂

帕利哌酮



## 习惯症

•精神分裂症

## 不良反应

静坐不能,锥体外系障碍

# 齐拉西酮(卓乐定)

剂 量

40mg/片

习惯症

•精神分裂症

药理作用

对多巴胺、5-羟色胺及肾上腺素能受体有较高的亲和力

齐拉西酮



不良反应

嗜睡、呼吸道感染、锥体外系症状、心律失常、血钾降低、肝脏毒性

注意:饭中服用!

# 注射用甲磺酸齐拉西酮

## 剂 量

30mg/瓶  
20mg/L

## 习惯症

• 精神分裂症患者的  
急性激越症状

## 药理作用

对多巴胺、5-羟色  
胺及肾上腺素能受  
体有较高的亲和力

注射用  
齐拉西酮

## 不良反应

嗜睡、恶心、头晕  
头痛、体位性低血  
压、锥体外性反应

注意:痴呆相关精神病禁用!  
肾功能损伤,心脏病患者慎用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/705130031342011203>