

肿瘤专科知识模拟练习题+答案

一、单选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、环磷酰胺是属于哪一类抗肿瘤药物（）

- A、抗癌抗生素类
- B、植物类
- C、抗代谢类
- D、烷化剂

正确答案：D

2、下列哪一周期的肿瘤细胞对化疗不敏感（）

- A、DNA 合成前期(G1 期)
- B、DNA 合成期(S 期)
- C、静止期(G0)
- D、有丝分裂期(M 期)

正确答案：C

3、食管支架置入术后（）小时流食。

- A、1
- B、4
- C、2
- D、3

正确答案：C

4、以下哪类人适于化疗（）

- A、妊娠者
- B、无手术指征晚期肿瘤患者
- C、精神病人
- D、有严重感染者

正确答案：B

5、食道癌术后护理，下列哪项是错误的（）

- A、术后一周即可进食
- B、病人平稳取半卧位
- C、保持各引流管通畅
- D、鼓励病人咳嗽排痰

正确答案：A

6、食管置入术后（）避免 100 C 以下冷饮,防止支架遇冷变形移动。

- A、2-3 小时

B、2-3 天

C、2-3 周

D、5-7 天

正确答案：C

7、护理胃肠减压的病人时，下列哪项是错误的（）

A、注意口腔卫生

B、及时更换引流瓶

C、口服药物后胃肠减压仍应持续进行

D、维持水电解质平衡

正确答案：C

8、以下那些不是化疗禁忌征：（）

A、严重感染、高热

B、胃肠道有穿孔倾向

C、上腔静脉综合征

D、骨髓储备功能低下，治疗前白细胞低于 $3.5 \times 10^9/L$ 、血小板低于 $80 \times 10^9/L$

E、胃肠道梗阻

正确答案：C

9、下列有关于肿瘤化疗的护理叙述不正确的是（）

A、药物必须新鲜配制

B、用后的注射器和空药瓶单独处理

C、药物不可溢出静脉外

D、若出现药物外渗，应立即热敷

E、每周检查白细胞和血小板计数

正确答案：D

10、放疗病人口腔出现假膜时，采用的漱口液为（）

A、生理盐水

B、金银花水

C、呋喃西林液

D、双氧水

E、甘草水

正确答案：D

11、白血病患者死亡最常见的原因是（）

A、感染

- B、发热
- C、出血
- D、贫血

正确答案：A

12、关于消化道出血病人护理错误的是（）

- A、消化性溃疡少量出血时也不能进食
- B、出血量较大时应绝对卧床休息
- C、大量出血的病人应立即建立静脉通路
- D、食管胃底静脉曲张破裂出血时应禁食

正确答案：A

13、以下哪项属于大肠病变引起的腹泻的特点（）

- A、粪便一般呈水样
- B、腹泻时的量多
- C、粪便中常带有脂肪粒
- D、粪便含有较多的粘液

正确答案：D

14、低钾血症最早的临床表现是（）

- A、代谢性碱中毒
- B、恶心、呕吐、腹泻
- C、肌无力
- D、心室传导阻滞
- E、恶心、呕吐、腹胀

正确答案：C

15、以下哪种药物输注时要避光（）

- A、5-Fu
- B、DDP
- C、FT207
- D、紫杉醇

正确答案：B

16、应用异环磷酰胺化疗时为了减轻肾毒性，应配合使用以下哪种药物（）

- A、生理盐水
- B、亚叶酸钙
- C、速尿

D、美司钠

正确答案：D

17、消化性溃疡的主要症状是（）

A、上腹痛

B、早饱、暖气

C、纳差，厌油

D、反酸、烧心

正确答案：A

18、黑色素瘤最常见的发病部位为（）

A、下肢足部

B、躯干

C、上肢

D、头颈部

正确答案：A

19、生理性止血过程中作用最重要的物质是（）

A、组织因子

B、血小板

C、血管

D、抗凝物质

正确答案：B

20、护理粒细胞缺乏症病人时，最重要的护理目的是防止病人（）

A、营养不良

B、出血

C、跌倒

D、感染

正确答案：D

21、化疗最常见的限制毒性反应为（）

A、恶心

B、骨髓抑制

C、恶吐

D、脱发

E、疼痛

正确答案：B

22、鼻咽癌的首发症状是（）

- A、复视
- B、耳鸣、听力减退
- C、痰式涕血
- D、头痛

正确答案：D

23、下列关于良性肿瘤特征的描述不正确的是（）

- A、活动度好
- B、生长缓慢
- C、疼痛明显
- D、边界清楚
- E、形状规则

正确答案：C

24、HD 患者治疗主要是（）

- A、化学治疗
- B、手术
- C、放射治疗
- D、免疫治疗

正确答案：A

25、亚叶酸钙序贯 5-fu 可增加后者的（）

- A、抗肿瘤效果
- B、毒性
- C、还原型甲酰四氢叶酸和三联复合物
- D、蛋氨酸合成

正确答案：A

26、胃癌并幽门梗阻最突出的症状是（）

- A、上腹部疼痛
- B、上腹饱胀不适
- C、营养不良
- D、大量呕吐

正确答案：D

27、乳房癌术后几日可做肩关节活动（）

- A、术后 4~7 日
- B、术后 1~3 天
- C、术后 1~2 周

D、术后 3~4 日

正确答案：C

28、预防慢性阻塞性肺疾病应首先强调（）

A、避免受凉

B、预防感冒

C、加强锻炼

D、戒烟

正确答案：D

29、某鼻咽癌患者放疗后出现面颊部肿胀、疼痛、张口受限，此放疗后反应（）

A、腮腺急性反应

B、口腔急性反应

C、软组织纤维化

D、鼻腔粘膜反应

正确答案：C

30、恶性肿瘤化疗时应掌握的原则，不包括（）

A、诊断必须明确

B、有手术指征不可错过手术时机

C、每周查白细胞

D、白细胞在 $0.4 \times 10^9/L$ 以下时应停药

E、注意不良反应

正确答案：D

31、食管癌的主要转移途径（）

A、直接蔓延

B、血行转移

C、淋巴转移

D、种植转移

正确答案：C

32、浸润性胸腺瘤手术完整切除，术后放疗剂量（）

A、20-30Gy/4-5W

B、40-50 Gy/4-5W

C、30-40 Gy/4-5W

D、15-35E Gy/4-5W

正确答案：B

33、肿瘤病理学的常规形态学检查方法包括（）

- A、脱落细胞学检查
- B、活体组织检查
- C、冰冻切片检查
- D、免疫组织化学技术
- E、以上都是

正确答案：E

34、肝性脑病最早的表现是（）

- A、定向力障碍
- B、性格和行为的改变
- C、昏睡
- D、扑翼样震颤

正确答案：B

35、化疗药物如果溅眼睛，应立即用大量生理盐水或用洗眼剂或等渗液体冲洗至少（）。

- A、25 min
- B、10 min
- C、15 min
- D、30 min

正确答案：C

36、食管下段管腔狭窄，扩张受限，粘膜破坏，有充盈缺损，应 诊断为（）

- A、食道癌
- B、食道平滑肌瘤
- C、食道静脉曲张
- D、食道内异物

正确答案：A

37、化疗药物毒副作用的远期反应是指（）

- A、用药后数月至几年后才发生
- B、用药后几周至几月内发生
- C、用药后1天内出现的反应
- D、用药后立即反应
- E、用药后几天至几周内反应

正确答案：A

38、化疗后出现心肌毒性最早的信号是（）

A、非特异性 ST-T 段改变

B、窦性心动过速

C、心前区疼痛

D、QRS 电压降低

正确答案：B

39、血小板低于 $50 \times 10^9/L$ 时，应注意有无出血倾向，其观察主要部位有：（）

A、皮肤、粘膜

B、鼻、牙龈出血

C、血尿

D、便血

E、以上都是

正确答案：E

40、甲状腺术后患者术后伤口引流量小于多少正常（）

A、100ml

B、150ml

C、120ml

D、200ml

正确答案：A

41、能提高早期胃癌判断率的辅助检查（）

A、胃酸检查

B、大便隐血试验

C、X 线钡餐检查

D、纤维胃镜检查

E、碱性磷酸酶

正确答案：D

42、化疗药物引起的生长期脱发最明显的时间为（）

A、1~2 月

B、2~3 月

C、1~2 周

D、3~6 月

正确答案：A

43、放疗时口腔粘膜反应的临床表现正确的是（）

A、充血, 白点, 融合成片, 浅表溃疡, 有伪膜形成

- B、充血, 水肿, 水泡形成, 发生糜烂
- C、红斑, 充血, 潮红, 有烧灼和刺痒的感觉
- D、口干, 味觉异常

正确答案: A

44、原发性肝癌最早发生的转移途径是 ()

- A、直接蔓延
- B、种植转移
- C、淋巴转移
- D、血行转移

正确答案: D

45、某患者 26 岁, 阴道后壁上 1/3 透明细胞癌, 临床分期为 1 期该患者术前放疗宜选 ()

- A、体外照射为主辅助腔内照射性
- B、体外照射+腔内照射
- C、体外照射
- D、阴道腔内照射

正确答案: C

46、宫颈癌病人放疗后皮肤出现充血、破损、疼痛、烧灼感, 为何种皮肤反应 ()

- A、泻出性反应
- B、干性反应
- C、炎性反应
- D、湿性反应

正确答案: D

47、使用顺铂时需要水化, 每日输液量 3000ml, 同时使用利尿剂和脱水剂保持尿量在 2000ml 以上, 每小时尿量在 () ml 以上

- A、100
- B、200
- C、150
- D、200

正确答案: A

48、淋巴瘤病人以何部位淋巴结肿大为首发 ()

- A、颈部
- B、腋窝

C、锁骨下

D、腹股沟

正确答案：A

49、胰腺癌最好发部位（）

A、胰腺尾部

B、胰腺体部

C、全胰腺

D、胰腺头部

E、异位胰腺

正确答案：D

50、诊断直肠癌最简便易行的方法是（）

A、大便潜血试验

B、内镜检查

C、直肠指诊

D、CEA 测定

正确答案：C

二、多选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、食道癌早期症状部典型，常表现为进食时轻度（）

A、胸骨后烧灼感

B、胸骨后刺痛感

C、异物感

D、哽咽感

正确答案：ABCD

2、鼻咽癌常见症状：（）

A、头痛

B、听力减退

C、耳鸣

D、涕血或回吸性血痰

正确答案：ABCD

3、关于乳腺癌术后，下列描述正确的是（）

A、为保持病人的形象，患者出院时，可佩带无重量的义乳。

B、术后 5 年内应避免妊娠

C、术后 3 年内应避免妊娠

D、无肿瘤转移或乳腺炎者，根治后 3 个月可行乳房再造术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706100205112010043>