

护理技能大赛题库试题及答案

1. 患者，女，24岁。持续咳嗽、高烧2周后出现尿量减少，300ml~400ml/天，血清钾6.5mmol/L，血肌酐762umol/L，此时患者可选择的抗生素应是（）

- A. 磺胺类药物
- B. 卡那霉素
- C. 链霉素
- D. 青霉素(正确答案)
- E. 阿米卡星

2. 患者，男，55岁。慢性肾小球肾炎10年，1周前受凉后出现食欲减退、恶心、呕吐，晨起最明显，夜尿增多，入院后须行内生肌酐清除率检查，以下告知项目不妥的是（）

- A. 禁饮咖啡、茶等饮料
- B. 避免剧烈运动
- C. 连续3天优质蛋白鱼肉饮食(正确答案)
- D. 收集24小时尿液
- E. 连续3天低蛋白饮食

3. 某肾病综合征患者入院治疗，查体双下肢水肿，实验室检查尿蛋白4.5g/d，血浆白蛋白20g/L，该患者水肿的主要原因是（）

- A. 醛固酮增多
- B. 球-管失衡
- C. 饮水过多
- D. 肾小球过滤下降
- E. 血浆胶体渗透压下降(正确答案)

4. 某患者既往曾有肾小球肾炎时，因病情稳定上班工作，近日在单位体检时发现血压180/120mmHg，来医院复查，证实为慢性肾小球肾炎急性发作，为迅速而有效的缓解症状，应考虑下列哪项措施（）

- A. 绝对卧床休息
- B. 低盐饮食
- C. 利尿降压(正确答案)
- D. 激素疗法
- E. 中医疗法

5. 患者，男，58岁，有高血压病史，某日，头痛头晕，左侧肢体活动障碍，诊断为脑出血入院。第3天患者剧烈头痛、呕吐，反应迟钝、脉搏细弱、呼吸减慢，该患者最可能出现了（）

- A. 颅内压增高(正确答案)
- B. 颅内压过低
- C. 低血糖
- D. 颅内感染
- E. 癫痫

6. 患者，女，60岁，急诊以“脑栓塞”收入院。入院后护士判断该患者可经口进食，但吞咽困难。为防止因进食所致的窒息，护士应采取的措施，但除外（）

- A. 营造安静、舒适的进餐环境
- B. 进食前应注意休息，避免疲劳
- C. 嘱患者使用吸管喝汤(正确答案)
- D. 食物应从流食逐渐过渡到普食
- E. 进行空吞咽运动的训练

7. 早产儿，32周，出现神经系统症状，诊断为新生儿颅内出血，护理措施正确的是（）

- A. 保持头低脚高位
- B. 惊厥时晃动患儿
- C. 每小时测一次体温
- D. 每2小时喂奶一次
- E. 避免搬动患儿(正确答案)

8. 患者，男性，诊断为急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，患者的脑脊液改变为（）

- A. 细胞数降低，蛋白质降低
- B. 氯化物降低
- C. 细胞数正常，蛋白质增高(正确答案)
- D. 葡萄糖降低
- E. 淋巴细胞增多

9. 患者，女，38岁。朋友聚会后，突然头痛、呕吐3小时入院，血压100/70mmHg，头颅CT提示蛛网膜下腔出血，护士告知患者要保持大便通畅，勿用力排便，其主要目的是（）

- A. 防血压升高
- B. 缓解头痛
- C. 防止再出血(正确答案)
- D. 预防心梗
- E. 预防痔疮

10. 患儿，男，2岁，发热一天，体温38.5度，伴有轻咳来诊，既往有癫痫病史，门诊就诊过程中突然发生惊厥，即刻给予输氧，镇静，此时首选药物是（）

- A. 苯巴比妥
- B. 地西洋(正确答案)
- C. 水合氯醛
- D. 氯丙嗪
- E. 肾上腺皮质激素

11. 患者，男，20岁。发作性意识丧失2年，每次发作均伴有全身不自主抽搐，尿失禁，口吐白沫，持续约2分钟。意识逐渐恢复后，对抽搐全无记忆。发作时对该患者的护理措施中不妥的是（）

- A. 迅速扶患者就地躺下
- B. 保持患者侧卧位
- C. 放松患者领扣、裤带

- D. 用纱布包裹的压舌板塞入患者上下臼齿间
- E. 发作完全控制后尽快停药，以减轻药物副作用(正确答案)

12. 患者，女，60岁。急诊以“脑梗塞”收入院。护士采取的措施不妥的是（）

- A. 不能吞咽时给予鼻饲高蛋白饮食
- B. 头部禁止放置冰袋
- C. 严密观察患者的意识状态
- D. 患者取头高足低位(正确答案)
- E. 颅内压增高时给予甘露醇

13. 患者，女性，56岁。帕金森病。患者在进行康复训练时，护士要求其关节活动要达到最大范围，其主要目的是（）

- A. 减轻不自主震颤
- B. 防止肌肉萎缩
- C. 促进血液循环
- D. 提高平衡能力
- E. 防止关节强直(正确答案)

14. 患者，男性，60岁，有高血压病史30年，在家做家务劳动时突发头晕，随即倒地，急送医院。患者呈昏迷状态，颈软而无抵抗，左侧肢体偏瘫；头颅CT示右侧基底节区高密度阴影。最可能的诊断是（）

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 脑出血(正确答案)
- E. 短暂性脑缺血发作

15. 患者男，53岁。饮酒时发生言语不清、呕吐，随即昏迷，右侧肢体瘫痪；血压230/120mmHg，诊断为“脑出血”。为防止出血加重，应首先采取的措施是（）

- A. 控制血压(正确答案)

- B. 保护性约束
- C. 降低颅内压
- D. 止血处理
- E. 肢体制动

16. 患者，女，68岁。“急性心肌梗死”入院，护士在CCU抢救患者时，执行医生的口头医嘱，正确的做法是（）

- A. 口头医嘱在抢救完毕后12小时内请医生补写医嘱和处方
- B. 无需复述，立即执行
- C. 向医生复述一遍，双方确认无误后方可执行(正确答案)
- D. 口头医嘱无需医生补写医嘱和处方
- E. 边执行，边向医生复述

17. 患者，女，66岁。因“急性心肌梗死”入院，行经皮冠状动脉介入治疗术后。为预防穿刺动脉栓塞，护士主要观察的项目是（）

- A. 血压
- B. 脉搏
- C. 体温
- D. 呼吸
- E. 足背动脉搏动(正确答案)

18. 患者，女性，48岁。感染性心内膜炎住院期间，突发胸痛、气促，随后出现口唇青紫、咯血，患者可能发生了（）

- A. 外周动脉栓塞
- B. 肾栓塞
- C. 肺栓塞(正确答案)
- D. 脑栓塞
- E. 肠系膜动脉栓塞

19. 患者，女，49岁。上坡或平地快走时常有气促两月余，门诊就医，X线检查结果为：心影呈梨形。该患者可能的医疗诊断是（）

- A. 主动脉瓣狭窄

- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄(正确答案)
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 肥厚型心肌病

20. 患者，女，61岁。夏天中午在送孙子去暑期学习班的路上，突然出现头痛、头晕、恶心，继而出现口渴、胸闷、脉搏细速、血压下降，后晕倒在地。该患者可能发生了（）

- A. 缺血性休克
- B. 急性心肌梗死
- C. 脑血管意外
- D. 中暑(正确答案)
- E. 低血糖休克

21. 患者，女，48岁。自觉头痛、头晕，伴颈部僵硬2周，门诊就诊，测呼吸20次/分，心率89次/分，血压170/105mmHg。护士向患者解释高血压的高危因素，不正确的是（）

- A. 遗传因素
- B. 肥胖
- C. 吸烟
- D. 长期运动(正确答案)
- E. 精神紧张

22. 患者，女性，58岁。诊断为急性心肌梗死，经治疗后疼痛缓解。现突然出现烦躁不安、大汗，皮肤湿冷，测血压80/50mmHg，心率115次/分，尿量20ml/h。应考虑患者出现了（）

- A. 急性心力衰竭
- B. 心源性休克(正确答案)
- C. 心肌梗死
- D. 心律失常
- E. 心脏破裂

23. 患者，女性，68岁。因慢性心力衰竭收入我院，遵医嘱服用地高辛每日0.125mg，某日患者将白墙看成黄墙，提示患者出现（）

- A. 青光眼
- B. 视网膜病变
- C. 血钾过低
- D. 血钠过高
- E. 洋地黄药物中毒(正确答案)

24. 患者，男性，62岁，持续性胸前区疼痛2小时入院，心电图检查示II、III、aVF导联ST段抬高，考虑急性心肌梗死，此时抽血化验，指标特异性最高的是（）

- A. 血白细胞
- B. 血红细胞
- C. 红细胞压积
- D. 血肌酸激酶同工酶(正确答案)
- E. 血沉

25. 患者，女性，77岁。住院心电图监测时发生室性心动过速，心率172次/分，血压120/80mmHg，意识清楚，双肺呼吸音清晰，无湿啰音。首选的治疗药物是（）

- A. 阿托品
- B. 地高辛
- C. 利多卡因(正确答案)
- D. 硝酸甘油
- E. 呋塞米

26. 患者，男性，67岁。既往有高血压病史25年，2个月前出现疲乏，近1周出现劳力性呼吸困难，经休息后缓解，患者最可能出现（）

- A. 慢性左心衰竭(正确答案)
- B. 慢性右心衰竭
- C. 全心衰竭

D. 急性肺水肿

E. 高血压危象

27. 患者，女性，69岁。风心病二尖瓣狭窄26年，伴心房颤动5年，无明显原因突然出现意识障碍，最可能的原因是（）

A. 脑出血

B. 发生室颤

C. 心排出量减少，脑供血不足

D. 心房血栓脱落，脑栓塞(正确答案)

E. 高凝状态，脑血栓形成

28. 患者，男性，69岁。治疗过程中患者突然意识丧失，血压测不清，颈动脉搏动消失。住院心电图监测为心室颤动，此时应采用最有效的治疗是（）

A. 心脏按压

B. 人工呼吸

C. 心腔内注射肾上腺素

D. 静注利多卡因

E. 非同步直流电复律(正确答案)

29. 患者，男性，68岁。胸痛2小时，诊断为“急性心肌梗死”，给予急诊溶栓治疗，下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是（）

A. 胸痛2小时内基本消失

B. 出现再灌注性心律失常

C. 心电图抬高ST段回降 $>50\%$

D. 血清心肌酶峰值提前

E. 冠脉造影示闭塞动脉再通(正确答案)

30. 患者，女性，32岁。风心病，心功能III级。长期服用地高辛，0.25mg，1次/天，自觉情况尚可，复诊时查心电图示，心率80次/分，PR间期0.18秒。对此患者的处理应为（）

A. 停用地高辛，观察

B. 改用利多卡因

- C. 加大地高辛用量
- D. 加服利尿剂
- E. 继续用原剂量维持(正确答案)

31. 某患者患高血压病 3 年，入院后给予降压药等治疗，在用药护理中指导患者改变体位时动作宜缓慢，其目的为（）

- A. 避免发生高血压脑病
- B. 避免发生高血压危象
- C. 避免发生急进性高血压
- D. 避免发生体位性低血压(正确答案)
- E. 避免血压增高

32. 患者，男性，33 岁。阵发性心慌 4 年，每次发作突然，持续数分钟至 1 小时不等。本次发作时心率 190 次/分，律齐，QRS 波形态正常，P 波不易辨认。考虑该患者的医疗诊断为（）

- A. 窦性心动过速
- B. 室上性心动过速(正确答案)
- C. 室性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 心房扑动

33. 患者，男性，69 岁。突发持续性胸骨后疼痛 6 小时，含服硝酸甘油无效。心电图示“急性前壁心肌梗死”，室性期前收缩 8 次/分，呈二联律。除立即止痛外应迅速给予（）

- A. 普罗帕酮静脉给药
- B. 利多卡因静脉给药(正确答案)
- C. 普鲁卡因胺口服
- D. 阿托品口服
- E. 维拉帕米口服

34. 患者，男性，38岁。近5个月来血压升高较快，伴心悸、头痛、烦躁等，出现耳鸣、眼花3天，查体：血压185/115mmHg。该患者的医疗诊断可能是（）

- A. 高血压 I 级
- B. 高血压 II 级
- C. 高血压 III 级 (正确答案)
- D. 高血压危象
- E. 高血压脑病

35. 患者，男性，62岁，因做家务时突发心前区疼痛，伴胸闷、气短来我院就诊，诊断为“急性心肌梗死”收入院治疗。进行心电监护，以防突发心律失常。急性心肌梗死患者预示室颤发生的心律失常是（）

- A. 室上性心动过速
- B. 室性心动过速 (正确答案)
- C. 心房颤动
- D. 窦性心动过缓
- E. 一度房室传导阻滞

36. 患者，男性，46岁。体检发现心尖部舒张期隆隆样杂音，胸片提示左房、右室增大，诊断为风心病二尖瓣狭窄。该患者处于（）

- A. 左房代偿期
- B. 左房失代偿期
- C. 左室代偿期
- D. 肺动脉高压期
- E. 右心受累期 (正确答案)

37. 患者，女性，62岁。有高血压病史12年。最近骑车上班时感胸闷、乏力、气急，休息后缓解。该患者的心功能为（）

- A. 一级
- B. 二级 (正确答案)
- C. 三级

D. 四级

E. 五级

38. 患者，女性，80岁。风湿性心脏病、心力衰竭，用地高辛、氢氯噻嗪治疗过程中出现气促加重，心电图示：室性期前收缩二联律。下列治疗错误的是（）

A. 停用地高辛

B. 补钾

C. 停用氢氯噻嗪

D. 加用呋塞米(正确答案)

E. 加用利多卡因

39. 患者女，32岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄10年。近2个月常于夜间憋醒，呼吸深快，伴有哮鸣音，端坐后可稍解，对夜间易发生喘憋的机制，正确叙述是（）

A. 膈肌下降

B. 平卧回心血量增加(正确答案)

C. 交感神经张力增加

D. 小支气管舒张

E. 全身小动脉痉挛

40. 患者，男性，62岁。因突发心前区疼痛，疼痛难忍，并伴有胸闷憋气，来院就诊，患者既往有糖尿病史11年、胃溃疡18年。经检查医生诊断为“急性前间壁心肌梗死”，特征性心电图变化出现在（）

A. V1~V5导联

B. V1~V3导联(正确答案)

C. V3~V5导联

D. V6、I、aVL导联

E. V1~V6及I、aVL导联

41. 患者，女性，53岁。因突发急性心肌梗死急诊入院，接受尿激酶溶栓治疗，一天后患者出现缓慢性心律失常，可用的药物是（）

A. 硝酸异山梨酯

- B. 硝酸甘油
- C. 呋塞米
- D. 美托洛尔
- E. 阿托品(正确答案)

42. 患者女，25岁。诉心慌不适来诊，医嘱行心电图检查。护士在给该患者做心电图检查时单极胸导联V2电极应放在（）

- A. 胸骨右缘第四肋间
- B. 胸骨左缘第四肋间(正确答案)
- C. 左腋前线第四肋间
- D. 左腋中线第五肋间
- E. 左锁骨中线与第五肋间相交点

43. 患者，女性，35岁，患有风湿热11年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为“慢性风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄”，二尖瓣狭窄最早出现的症状是（）

- A. 腹胀
- B. 下肢水肿
- C. 劳力性呼吸困难(正确答案)
- D. 肝区疼痛
- E. 咯血

44. 患者，女性，38岁。因患慢性风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄收入院。患者近来症状严重，护士严密观察心律变化，以及时发现心律失常的发生。风心病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是（）

- A. 室性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 心房颤动(正确答案)
- E. 房室传导阻滞

45. 患者，女性，31岁，诊断为风湿热8年，医生考虑此患者病变已侵犯到心脏，风湿性心脏瓣膜病最常见的并发症是（）

A. 充血性心力衰竭(正确答案)

B. 室性心律失常

C. 下肢静脉血栓

D. 贫血

E. 心源性休克

46. 患者，男性，55岁。主诉自感心悸、胸闷不适，既往有冠心病。住院后心电监护示阵发性室性心动过速，应首选的处理是（）

A. 给予镇静剂

B. 立即静脉注射利多卡因(正确答案)

C. 开放静脉通路

D. 安慰患者并予吸氧

E. 电除颤

47. 患者，男性，18岁，学生。自诉心慌，胸闷不适。ECG示：提前出现形态异常的QRS波群，时限0.12s，T波与QRS波主波方向相反，其前无相关P波。该患者的诊断为（）

A. 房性期前收缩

B. 室性期前收缩(正确答案)

C. 心房颤动

D. 交界性期前收缩

E. 预激综合征

48. 患者，男性，25岁。因心悸来医院检查，下列可明确诊断心律失常的检查是（）

A. 心音图

B. 心电图(正确答案)

C. 超声心动图

D. 放射性核素检查

E. 心脏X线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706103202225010041>