

超声波医学与技术(主管技师)《胆道、胰腺和胃肠必看考点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题:一位患儿阵发性腹痛2天,伴果酱样便1天,行超声检查,示右中下部肠管壁增厚,长轴扫查呈多层平行管征,短轴呈靶环状影像,最可能诊断为()。A.肠扭转
B.肠套叠
C.肠道肿瘤
D.阑尾周围脓肿
E.肠梗阻
- 2、单项选择题:外科手术患者禁食并给予静脉营养时,胆囊将会产生()。A.下垂
B.病理性扩张
C.收缩
D.病变
E.憩室
- 3、单项选择题:“炸面包圈”征()。A.胃壁局限性增厚,断面如弯月状,可出现
B.短轴切面示管腔空虚、全周壁厚,类似靶环,可出现
C.溃疡环堤的冠状切面呈现
D.肿瘤中心凹陷为溃疡,周围隆起,形成环堤,呈弹坑样改变,称之为
E.胃肠全周或广泛胃壁增厚,可出现
- 4、单项选择题:胃肠壁增厚的声像图表现,不包括下列哪项()。A.假肾征
B.火山口征
C.靶环征
D.新月征
E.镶嵌征
- 5、单项选择题:关于胆道系统解剖,错误的是()。A.肝总管在十二指肠韧带走行,位于肝固有动脉的右侧和门静脉的右前方
B.胆总管分为十二指肠上段、十二指肠后段、胰腺段和肠壁内段
C.胆道可分为肝内和肝外两部分
D.胆囊管多与肝总管汇合成胆总管
E.胆总管肠壁内段斜穿入十二指肠降部内前侧壁
- 6、单项选择题:关于直肠的解剖,不正确的是()。A.直肠各壁均有腹膜覆盖
B.男性形成直肠膀胱陷凹,女性形成直肠子宫陷凹
C.男性直肠前方与膀胱底、输尿管、精囊腺及前列腺邻近
D.女性直肠前方与阴道后壁相贴

E. 直肠上段一般较膨大，下段则保持收缩空虚状态

7、单项选择题：获取胰腺长轴标准切面的最主要条件是（ ）。A. 正确识别胰腺的血管标志

B. 常规采取仰卧位，辅助以侧卧位和半卧位扫查

C. 探头横置于上腹正中且向左上倾斜，与水平线成 10~30 夹角

D. 前一天晚上仅吃少量少渣食物，当日空腹 4~6 小时后检查

E. 检查前饮水 500~800ml

8、单项选择题：患者一周前进食后右上腹痛明显，无明显发热。超声示胆囊大小为 8.0cm×3.0cm，壁厚 0.4cm，呈双边，囊内可见多发强光团，最大 1.6cm，后伴声影，随体位改变有移动。右上腹相当于结肠肝曲位置见 8.3cm×6.9cm 不均匀光团，与胆囊界限不清，形态不规整，内呈不均质低回声伴气体样强回声反射该患者无排便习惯改变，但作水灌肠超声检查时发现包块的肠壁外部分大于肠壁内部分，该患者最可能的诊断是（ ）。A. 胆囊结石合并胆囊癌

B. 结肠肿瘤胆囊局部浸润

C. 胆囊结石合并胆囊穿孔、胆囊结肠瘘形成

D. 胆囊结石合并肝肿瘤

E. 胆囊积气

9、单项选择题：一患者因胃部不适行上消化道造影，显示胃部充盈缺损，内镜检查可见胃黏膜局限性隆起，临床拟诊黏膜下肿瘤该患者有慢性胰腺炎病史，超声于左上腹探及 10mm×6mm 边界清晰的囊性占位，内透声不好，最可能的诊断是（ ）。A. 胃扭转

B. 胰腺假性囊肿

C. 胰腺囊腺瘤

D. 急性胃扩张

E. 胃平滑肌瘤

10、单项选择题：患者男性，61 岁，高血压多年，一周前腹泻，四天前便血伴腹胀乏力，腹部平片示多个弓形小肠袢影，结肠充气。以“下消化道出血、不全肠梗阻”入院，超声示右下腹腔肠管粘连，肠壁增厚，明显水肿，肠壁血运明显减少，肠间少量积液。最可能的诊断是（ ）。A. 肠结核

B. 肠套叠

C. 坏死性肠炎

D. 肠肿瘤

E. 肠扭转

11、单项选择题：肝外胆管癌的直接征象不包括（ ）。A. 扩张的胆管的远端显示乳头状软组织肿块

B. 阻塞近端胆管明显扩张

C. 扩张胆管内腔逐渐细窄呈鼠尾状，局部管壁明显增厚

D. 胆管壁不规则增厚，僵硬

E. 胆管突然截断或闭塞

12、单项选择题：一患者的超声图像显示于胰腺尾部可见一包膜光整的多房性囊性结构，囊壁较厚并伴乳头状结节及钙化斑附着，囊腔内透声良好，可见较粗大的高回声光带分隔最可能的诊断是（ ）。A. 胰腺脓肿

B. 胰腺腺瘤

C. 胰腺假性囊肿

D. 胰腺癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706135003130010133>