

## 耳鼻咽喉科疾病习题及答案

### A1/A2 型题

1. 关于急性外耳道炎的描述，不正确的是（ ）
  - A. 疼痛剧烈，必要时需给予止痛药对症治疗
  - B. 耳郭牵拉痛是最典型的阳性体征
  - C. 病因多由中耳炎感染未能有效控制引起
  - D. 耵聍栓塞继发急性外耳道炎需及早清理外耳道取耵聍
  - E. 急性外耳道炎无论是否严重对听力均无影响
  
2. 有关扁桃体手术适应证的描述，不正确的是（ ）
  - A. 慢性扁桃体炎反复发作或多次并发扁桃体周围脓肿者
  - B. 单纯扁桃体肥大
  - C. 扁桃体恶性淋巴瘤
  - D. 慢性扁桃体炎合并严重风湿性心脏病活动期
  - E. 急性扁桃体炎
  
3. 有关扁桃体的描述，错误的是（ ）
  - A. 扁桃体炎急性发作期不宜行手术治疗
  - B. 扁桃体周围脓肿不宜行扁桃体切除术
  - C. 扁桃体的肿大程度不与扁桃体病变的严重程度成正比
  - D. 通常所说的扁桃体指腭扁桃体，属咽淋巴环扁桃体之一
  - E. 对于扁桃体恶性肿瘤行扁桃体切除时应慎重
  
4. 有关慢性肥厚性咽炎病理的描述，正确的是（ ）
  - A. 咽部黏膜慢性充血
  - B. 咽部黏膜充血肥厚，黏膜下有广泛的结缔组织及淋巴组织增生
  - C. 黏膜层及黏膜下层萎缩变薄
  - D. 咽后壁有痂皮附着
  - E. 咽部干燥分泌减少

5. 关于慢性咽炎的描述，错误的是（ ）
- A. 多见于成人
  - B. 临床表现为咽部的各种不适感
  - C. 无全身症状
  - D. 诊断前应详细检查，排除其他部位早期肿瘤的可能
  - E. 首选抗生素治疗
6. 急性扁桃体炎治疗不包括（ ）
- A. 卧床休息，适当隔离
  - B. 抗生素首选
  - C. 可酌情使用糖皮质激素控制症状
  - D. 局部治疗
  - E. 手术切除
7. 按国际标准，阻塞性呼吸暂停是指在 7 小时睡眠中，呼吸暂停在（ ）
- A. 35 次以上
  - B. 30 次以上
  - C. 25 次以上
  - D. 平均每小时 3 次以上
  - E. 平均每小时 5 次以上
8. 一般不做鼻咽活检的疾病是（ ）
- A. 鼻咽癌
  - B. 鼻咽纤维血管瘤
  - C. 原因不明的颈部淋巴结肿大
  - D. 鼻咽淋巴肉瘤
  - E. 鼻咽结核

9. 关于鼻咽癌的描述，错误的是（ ）
- A. 鼻咽癌的发生与 B 病毒有关
  - B. 初发可见涕中带血
  - C. 容易发生颈淋巴结转移
  - D. 在脑症状中，三叉神经受累最多
  - E. 早期手术治疗效果最好
10. 关于鼻咽癌的描述，错误的是（ ）
- A. 鼻咽癌好发于鼻咽顶后壁和咽隐窝
  - B. EB 病毒血清学检查可确诊
  - C. 首次鼻咽活检是阴性不可排除鼻咽癌
  - D. 鼻咽癌临床表现复杂多变
  - E. 鼻咽癌早期可有颈部淋巴结转移
11. 食管异物最好发的部位是（ ）
- A. 食管入口
  - B. 主动脉弓压迹
  - C. 左支气管压迹
  - D. 膈肌裂孔处
  - E. 食管出口
12. 不能够用作急性期食管碱性腐蚀伤中和剂的是（ ）
- A. 食醋
  - B. 2% 醋酸
  - C. 橘汁
  - D. 柠檬汁
  - E. 碳酸氢钠
13. 不是气管异物临床表现的是（ ）

- A. 呛咳，心率快
- B. 颈部声门下撞击感
- C. 颈部声门下拍击感
- D. 双肺呼吸音不对称
- E. 缺氧症状

14. 怀疑食管异物时，应首先做的检查是（ ）

- A. 食管镜检查
- B. 胸部正侧位 X 线片
- C. 胸部 CT 片
- D. 食管钡餐 X 线检查
- E. 胸部 MR 检查

15. “星烁征”可见于（ ）

- A. 急性化脓性中耳炎
- B. 慢性化脓性中耳炎
- C. 耳硬化症
- D. 大疱性鼓膜炎
- E. 急性外耳道炎

16. 大量酸性食管腐蚀伤疑有穿孔时可应用的处理方法是（ ）

- A. 碳酸氢钠中和
- B. 洗胃处理
- C. 钡剂 X 线检查是否穿孔
- D. 应用抗生素防止感染
- E. 类固醇激素防止狭窄

17. 急性化脓性中耳炎患者，鼓膜穿孔后立即停用 2% 石炭酸甘油滴耳，是因为石炭酸甘油（ ）

- A. 对鼓室黏膜及鼓膜有腐蚀作用
- B. 油剂不易经穿孔进入中耳
- C. 仅有止痛作用
- D. 没有抗生素水溶液效果佳
- E. 油剂不易清洗

18. 关于急性化脓性中耳炎的描述，错误的是（ ）

- A. 多由上呼吸道感染继发
- B. 耳道流脓时应采用双氧水清理耳道脓液
- C. 耳道流脓时可向耳道内外用抗生素药粉控制感染
- D. 耳道流脓后耳痛症状会缓解
- E. 儿童急性化脓性中耳炎若出现耳道流脓减少，而全身症状加重，应考虑脓液引流不畅可能，必要时需行鼓膜切开

19. 处理鼻外伤引起的脑脊液鼻漏，不正确的是（ ）

- A. 降低颅内压
- B. 鼻腔内药物腐蚀疗法
- C. 鼻腔填塞
- D. 预防感染
- E. 保守治疗无效者应手术治疗

20. 不属于喉癌高危因素的是（ ）

- A. 男性，年龄>40岁
- B. 持续声嘶
- C. 长期咽喉不适或咽部异物感
- D. 有吸烟饮酒嗜好
- E. 雌激素水平高

21. 阻塞性睡眠呼吸暂停所致机体病理生理改变不包括（ ）

- A. 心律失常
- B. 白天嗜睡，疲乏
- C. 记忆力低下
- D. 高血压
- E. 耳鸣

22. 急性喉炎的临床表现是（ ）

- A. 声嘶
- B. 喉痛
- C. 咳嗽多痰
- D. 咯血
- E. 吞咽困难

23. 关于慢性化脓性中耳炎的描述，错误的是（ ）

- A. 分为单纯型、骨疡型及胆脂瘤型
- B. 中耳骨质的吸收破坏
- C. 有耳道流脓病史
- D. 可并发眩晕
- E. 听力渐进性下降

24. 急性额窦炎疼痛的时间规律是（ ）

- A. 全天痛
- B. 下午开始，晚上加重
- C. 上午开始，晚上最重
- D. 下午开始，晚上减轻
- E. 起床后开始，下午减轻

25. 梅尼埃病主要的病理改变是（ ）

- A. 蜗管扩张

- B. 球囊扩张
- C. 膜迷路破裂
- D. 囊壁纤维样变
- E. 螺旋器退行性变

26. 梅尼埃病的诊断要点不包括（ ）

- A. 反复发作眩晕
- B. 波动性耳鸣、耳胀闷感
- C. 无听力改变
- D. 排除了其他系统疾病
- E. 第一次发作眩晕不能诊断梅尼埃病

27. 梅尼埃病的治疗原则不包括（ ）

- A. 改善内耳微循环及神经营养治疗
- B. 可选用糖皮质激素
- C. 首选手术治疗
- D. 可选用利尿剂
- E. 对症治疗

28. 关于周围性眩晕的描述，错误的是（ ）

- A. 临床表现为旋转感、摇摆感、漂浮感等空间定位障碍
- B. 周围性眩晕发作无意识障碍
- C. 周围眩晕多突然发作
- D. 周围性眩晕一半以上为耳源性眩晕
- E. 周围性眩晕多为颈椎疾病引起

29. 有关耳聋分类的描述，错误的是（ ）

- A. 按病变性质，耳聋可分为器质性聋与功能性聋
- B. 器质性聋依照病变位置可分为传导性聋，感音神经性聋，混合性聋

- C. 感音神经性聋又可分为感音性聋与神经性聋
- D. 感音性聋又称耳蜗性聋，神经性聋又称蜗后性聋
- E. 功能性聋又称伪聋

30. 化脓性中耳炎引起的颞骨并发症是指（ ）

- A. 迷路炎
- B. 岩锥炎
- C. 周围性面瘫
- D. 慢性乳突炎
- E. 颈部贝佐尔德脓肿

31. 关于音叉试验的描述，不正确的是（ ）

- A. 音叉试验主要包括 RT、WT、ST 和 GT
- B. 可初步做耳聋定性诊断
- C. 不能准确做耳聋的定量诊断
- D. 无法做随访和比较
- E. 音叉试验必须在隔音环境下进行

32. 耳源性脑脓肿颅内高压症状不包括（ ）

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 意识障碍
- D. 脉搏加快与体温一致
- E. 听力下降

33. 临床最常见的鼻出血部位是（ ）

- A. 鼻中隔前下部
- B. 鼻腔上部出血
- C. 下鼻甲后端



- D. 鼻腔中部出血
- E. 鼻腔黏膜弥漫性出血

34. 鼻炎早期可引起 ( )

- A. 水样鼻涕
- B. 黏液性鼻涕
- C. 脓性鼻涕
- D. 血性鼻涕
- E. 干酪样鼻涕

35. 变应性鼻炎的治疗药物一般不包括 ( )

- A. 抗生素
- B. 糖皮质激素
- C. 抗组胺药
- D. 减充血剂
- E. 维生素

36. 《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》(ARIA)指南推荐的变应性鼻炎的阶梯治疗方案不包括 ( )

- A. 避免接触变应原
- B. 抗组胺药
- C. 局部糖皮质激素
- D. 免疫治疗
- E. 激光等物理治疗

37. 有关变应性鼻炎的描述, 错误的是 ( )

- A. 分为间歇性和持续性
- B. 是全身免疫系统失衡的局部表现
- C. 免疫治疗是目前唯一的对因治疗方案

- D. 属于 IgE 介导的 I 型变态反应
- E. 变应性鼻炎仅仅是局部病变

38. 变应性鼻炎确诊必须提供的检查是 ( )

- A. 病史
- B. 症状
- C. 鼻腔检查
- D. 胸部 X 线检查
- E. 皮肤点刺实验及或血清过敏原检测

39. 不是鼻出血治疗原则的是 ( )

- A. 镇静
- B. 控制急性出血
- C. 病因治疗
- D. 对症治疗
- E. 静脉输入抗生素

40. 鼻出血的局部止血方法不包括 ( )

- A. 烧灼法
- B. 填塞法
- C. 血管结扎法
- D. DSA 血管栓塞法
- E. 静脉止血药物

41. 慢性化脓性上颌窦炎的临床表现不包括 ( )

- A. 上颌窦穿刺有脓性分泌物
- B. 鼻塞
- C. 头昏、头痛
- D. 视力下降

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707101041062006036>