

中医眼科学试题及答案

1、两眦在五轮中称为

- A. 火轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 血轮
- E. 水轮

【答案】D

2、患者,女,59岁,视物昏花,晶体混浊,精神倦怠,肢体乏力,面色萎黄,食少便溏,舌淡苔白,脉缓或细弱。选何方为宜

- A. 除风益损汤
- B. 千金托里散
- C. 驱风散热饮子
- D. 补中益气汤
- E. 竹叶泄经汤

【答案】D

3、患者上胞下垂,眼睫无力,不耐久视,视物昏蒙不适。多因

- A. 肝气郁结
- B. 脾虚气弱
- C. 肾阳虚弱

D. 肺气不足

E. 肝血亏虚

【答案】 B

4、治疗两眦疾病的原则为

A. 实者泻火清火, 虚者补心养肺

B. 实者泻火清火, 虚者补益脾胃

C. 实者清热解毒, 虚者滋养肾水

D. 实者清热解毒, 虚者养血补心

E. 实者泻心清火, 虚者滋养肾水

【答案】 E

5、治疗惊震内障的原则是

A. 视功能正常时可定期检查观察, 若视功能损伤严重应手术治疗, 术后配合弱视训练

B. 及时手术治疗

C. 防止紫外线照射

D. 晶珠破损, 继发绿风内障, 应及时手术治疗

E. 继发绿风内障时可点用抗生素类和糖皮质激素类眼药水

【答案】 D

6、天行赤眼与西医学哪一疾病相似

A. 沙眼

- B. 春季结膜炎
- C. 流行性出血性结膜炎
- D. 过敏性结膜炎
- E. 病毒性角膜炎

【答案】 C

7、患者,女,59岁,视物昏花,晶体混浊,精神倦怠,肢体乏力,面色萎黄,食少便溏,舌淡苔白,脉缓或细弱。选何方为宜

- A. 除风益损汤
- B. 千金托里散
- C. 驱风散热饮子
- D. 补中益气汤
- E. 竹叶泄经汤

【答案】 D

8、络阻暴盲者,外眼端好,猝然盲无所见,见情志抑郁,胸胁胀满,头痛眼胀,舌有瘀点,脉弦,治宜

- A. 行气活血,通窍明目
- B. 补气养血,化瘀通络
- C. 清热疏肝,降逆和胃
- D. 滋阴养血,柔肝息风
- E. 滋阴降火,平肝息风

【答案】A

9、患者男,65岁,既往高血压病史15年。昏迷清醒后左侧肢体偏瘫.偏身感觉障碍和双眼左侧同向偏盲,临床考虑脑动脉阻塞,阻塞部位在

- A. 颈内动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 基底动脉
- E. 以上都不是

【答案】B

10、与血脉瘀滞有关的眼病有

- A. 聚星障
- B. 络阻暴盲
- C. 青盲
- D. 圆翳内障
- E. 撞击伤目

【答案】BCE

11、患者,青壮年,单眼发病,视物模糊,视物变小变形;黄斑部有圆形渗出灶及出血,血色鲜红;兼见眼部干涩,五心烦热,口干咽燥,心烦失眠,舌红少苔,脉细数,其治法为

- A. 活血化瘀,疏肝行气

- B. 滋阴降火, 止血化瘀
- C. 清热解毒, 活血通络
- D. 滋肾养阴, 凉血润燥
- E. 行气解郁, 化瘀止血

【答案】B

12、视乳头上的血管偏向鼻侧, 并呈屈膝状改变, C/D 扩大加深, 常见于下列哪种疾病

- A. 目系猝病
- B. 视瞻昏渺
- C. 云雾移睛
- D. 高风雀目
- E. 青风内障

【答案】E

13、正常眼球向前平视时, 眼球与眶缘的位置关系是

- A. 与外侧眶缘平行
- B. 在外侧眶缘之后 2—5mm
- C. 突出外侧眶缘 12—14mm
- D. 在外侧眶缘之后 12—14mm
- E. 突出外侧眶缘 2—5mm

【答案】C

14、下列哪一种病不属于外障

- A. 漏睛
- B. 聚星障
- C. 混睛障
- D. 瞳神干缺
- E. 疣病

【答案】 D

15、突然无痛性视力丧失,眼底检查后极部视网膜弥漫性水肿.黄斑部櫻桃红,首先考虑

- A. 后部缺血性视神经病变
- B. 视网膜中央动脉阻塞
- C. 前部缺血性视神经病变
- D. 视网膜分支静脉阻塞
- E. 视网膜中央静脉阻塞

【答案】 B

16、湿翳的主要病因病机是

- A. 外感风热
- B. 外感风湿
- C. 黑睛外伤.风热外袭
- D. 黑睛外伤.湿热之邪侵入

E. 黑睛外伤. 风热邪毒侵入

【答案】D

17、治疗凝脂翳属风热壅盛证的主方是

A. 羌活胜风汤

B. 银翘散

C. 新制柴连汤

D. 四顺清凉饮子

E. 祛风除热饮子

【答案】C

18、视瞻昏渺中有一定自愈性的病变是

A. 年龄相关性黄斑变性

B. 中心性渗出性视网膜脉络膜病变

C. 缺血性视神经病变

D. 中心性浆液性视网膜脉络膜病变

E. 玻璃体积血

【答案】D

19、正常眼球向前平视时, 眼球与眶缘的位置关系是

A. 与外侧眶缘平行

B. 在外侧眶缘之后 2—5mm

- C. 突出外侧眶缘 12——14mm
- D. 在外侧眶缘之后 12——14mm
- E. 突出外侧眶缘 2——5mm

【答案】 C

20、中医眼科解剖名词“眼带”是指现代眼科中的

- A. 悬韧带
- B. 晶状体
- C. 视神经
- D. 眼外肌
- E. 睫状体

【答案】 D

21、黄液上冲常并发于

- A. 暴露赤眼生翳
- B. 聚星障
- C. 混睛障
- D. 凝脂翳
- E. 绿风内障

【答案】 D

22、提出瞳神紧小之“强阳搏实阴”理论的著作是

- A. 《审视瑶函》
- B. 《原机启微》
- C. 《银海指南》
- D. 《外台秘要》
- E. 《秘传眼科龙木论》

【答案】 B

23、巩膜占眼球壁外层的

- A. 0.16.....67
- B. 0.6.....67
- C. 0.25
- D. 0.2
- E. 0.8333333333

【答案】 E

【解析】

24、白涩症病名见于

- A. 《目经大成》
- B. 《审视瑶函》
- C. 《异授眼科》
- D. 《秘传眼科龙木论》

E. 《银海精微》

【答案】B

25、双眼上胞下垂,起病缓慢,晨起病轻,午后加重,休息后减轻,劳累后加重,辨证考虑为

A. 先天不足

B. 脾虚气弱

C. 肝肾亏虚

D. 风痰阻络

E. 肝郁气滞

【答案】B

26、盘状角膜炎是由下列哪种病原微生物感染所致

A. 绿脓杆菌

B. 单纯疱疹病毒

C. 沙眼衣原体

D. 丝状真菌

E. 以上都不是

【答案】B

27、患者花翳白陷,黑睛混浊溃陷,抱轮红赤,刺痛流泪,便秘溺赤,口苦咽干,舌红苔黄,脉数者应选用方剂是

A. 新制柴连汤

- B. 泻肝散
- C. 益气聪明汤
- D. 托里排脓汤
- E. 拨云退翳散

【答案】 B

28、下列哪一种眼病不属于外障范畴

- A. 漏睛
- B. 白涩症
- C. 聚星障
- D. 瞳神紧小
- E. 胬肉攀睛

【答案】 D

29、视网膜中央动脉阻塞时瞳孔表现为

- A. 散大
- B. 有的大, 有的小
- C. 正常大小
- D. 缩小
- E. 以上全对

【答案】 A

30、暴风客热多因

- A. 风热之邪外袭
- B. 外感疫毒之气
- C. 风热湿邪搏结
- D. 风寒客目
- E. 痰湿内蕴

【答案】A

31、患者 12 岁,针眼屡发,面色少华,倦怠无力,舌淡苔白,脉细数,内治宜 ()

- A. 祛风清热,消肿散结
- B. 清热解毒,消肿止痛
- C. 健脾益气,扶正祛邪
- D. 清热化痰散结
- E. 以上都不是

【答案】C

32、根据五轮学说,白睛属于

- A. 血轮
- B. 火轮
- C. 气轮
- D. 水轮

E. 肉轮

【答案】 C

33、患者病起突然, 双眼睑肿胀, 白睛红赤, 黑睛生翳, 眼痒眼痛, 羞明流泪, 脉浮数, 当用

A. 泻火解毒法

B. 疏风清热法

C. 祛风散寒法

D. 祛湿法

E. 退翳明目法

【答案】 B

34、天行赤眼暴翳病发于眼睛的部位是

A. 白睛

B. 黑睛

C. 白睛和黑睛同时发病

D. 睑胞和白睛同时发病

E. 白睛和眦部同时发病

【答案】 B

35、视瞻昏渺中的中心性浆液性视网膜脉络膜病变发生在

A. 周边视网膜

B. 视乳头

C. 黄斑部及其附近视网膜

D. 脉络膜

E. 玻璃体

【答案】 C

36、下列哪一种病不属于外障

A. 漏睛

B. 聚星障

C. 混睛障

D. 瞳神干缺

E. 疣病

【答案】 D

37、患者,女,56岁,左眼反复干涩不适半年,检查见抱轮微红,黑睛生翳呈点状,荧光素染色(+),伴有口干咽燥,舌红少苔,脉细数。宜选下列何方治疗

A. 银翘散

B. 龙胆泻肝汤

C. 加减地黄丸

D. 泻青丸

E. 三仁汤

【答案】 C

38、黄斑部樱桃红斑见于

- A. 视网膜中央静脉阻塞
- B. 视网膜静脉周围炎
- C. 视网膜中央动脉阻塞
- D. 视网膜色素变性
- E. 糖尿病性视网膜病变

【答案】C

39、患者病起突然,双眼睑肿胀,白睛红赤,黑睛生翳,眼痒眼痛,羞明流泪,脉浮数,当用

- A. 泻火解毒法
- B. 疏风清热法
- C. 祛风散寒法
- D. 祛湿法
- E. 退翳明目法

【答案】B

40、患者聚星障,黑睛混浊,抱轮红赤,刺痛流泪,便秘溺赤,口苦咽干,舌红苔黄,辨证为

- A. 肝经风热
- B. 肝胆火炽
- C. 肺经风热
- D. 脾胃湿热

E. 气血两燔

【答案】B

41、患者,女,65岁。素患漏睛,一周前突发头目剧痛,畏光难睁,经查见白睛混赤,神水混浊,黑睛凹陷深大,凝脂肥厚,并伴口苦,溲黄,便秘,舌红,苔黄,脉弦滑数,宜选下列何方加减治疗

A. 新制柴连汤

B. 托里消毒散

C. 四顺清凉饮子

D. 滋阴退翳汤

E. 加味修肝散

【答案】C

42、患者双眼外观端好,视物昏蒙,眼前如有云雾飘移,兼有胸闷,食少,渴不欲饮,腹胀便溏,四肢乏力,苔腻,脉满,当治

A. 健脾利湿法

B. 清热祛湿法

C. 祛风胜湿法

D. 利水渗湿法

E. 以上都不是

【答案】A

43、患者眼珠微突,转动受限,胞睑肿胀,白睛红肿,头目疼痛,舌红,苔薄黄脉浮数。多属

- A. 火毒壅盛
- B. 心经郁热
- C. 肝经风热
- D. 风火热毒
- E. 肝郁化火

【答案】D

44、盘状角膜炎是由下列哪种病原微生物感染所致

- A. 绿脓杆菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 丝状真菌
- E. 以上都不是

【答案】B

45、火疔后期,眼痛轻,白睛血丝紫暗,局部结节隆起不甚,全身潮热额红,鼻干咽燥,舌红少津,脉细数,应选用的方剂是

- A. 龙胆泄肝汤
- B. 清胃汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 银翘散
- E. 化坚二陈汤

【答案】C

46、患者头眼胀痛,久视后加重,除内服药外,外用熏洗选下列哪组药为宜

- A. 黄连. 黄芩. 黄柏. 大黄
- B. 红花. 艾叶. 苏木. 秦皮. 冰片
- C. 银花. 连翘. 野菊花. 蒲公英
- D. 荆芥. 防风. 麻黄. 桂枝. 细辛
- E. 以上都不是

【答案】B

47、黑睛深层呈灰白色混浊,如镜面呵气,抱轮红赤,刺痛流泪,兼见口苦口干,尿赤便结,舌红苔黄,脉弦数,宜选用

- A. 黄连解毒汤
- B. 银花解毒汤
- C. 消翳汤
- D. 羌活胜风汤
- E. 银翘散

【答案】B

48、睑内结石的表现为

- A. 睑内颗粒,色红而坚,状若花椒
- B. 睑内颗粒,色黄而软,状若粟米
- C. 睑内颗粒,色黄白,状如碎米

D. 睑内核状硬结, 逐渐长大, 触之不痛, 皮色如常

E. 胞睑局部形似麦粒硬结, 红肿痒痛

【答案】C

49、睑弦赤烂, 痛痒并作, 眵泪胶黏, 睫毛成束, 宜用

A. 银翘散

B. 除湿汤

C. 导赤散合黄连解毒汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 泻心汤

【答案】B

50、患者头眼胀痛, 久视后加重, 除内服药外, 外用熏洗选下列哪组药为宜

A. 黄连. 黄芩. 黄柏. 大黄

B. 红花. 艾叶. 苏木. 秦皮. 冰片

C. 银花. 连翘. 野菊花. 蒲公英

D. 荆芥. 防风. 麻黄. 桂枝. 细辛

E. 以上都不是

【答案】B

51、患眼被紫外线所伤, 灼热刺痛. 畏光流泪, 白睛混赤. 黑睛浅层星翳, 舌红苔薄白.

脉数。治疗方选

A. 银翘散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708025061125006036>