2024年浙江杭州西湖街道社区卫生服务中心招聘笔试参考题库 含答案详解

		D、E五个备选答约 P母所属的方框涂	案。请从中选择一 黑。)
1、正常人血中HCO ₃ -与	ī H₂C0 3之比为()。		
『正确答案』 C 『答案解析』 暂无解析。			
2、关于质粒DNA特征的	产生耐药性等 行丢失与消除 移性		
『正确答案』 B 『答案解析』 暂无解析。			
3、关于脑膜炎奈氏菌,	耐受力强		

『正确答案』

В

『答案解析』

脑膜炎奈瑟菌对外界环境的抵抗力弱。干燥、阳光、湿热及一般消毒剂很快将细菌杀死。本菌可产生自溶酶。体外25℃,碱性环境中很快导致菌体肿胀、裂解死亡。

- 4、哪一间隙的腰椎间盘突出出现拇趾背伸力减弱? ()
 - ${\color{red} \mathbb{C}}$ A. $L_{1\sim 2}$

C C. 对青霉素不敏感D. 对常用消毒剂不敏感C E. 抵抗力较一般细菌强

- ightharpoonup B. $L_{2\sim3}$
- \bigcirc C. L_{3~4}
- ${\hbox{\c C}}$ D. $L_{4\sim5}$
- $_{\hbox{\scriptsize C}}$ E. $L_5{\sim}S_1$

『正确答案』

D

『答案解析』

 $L_4\sim_5$ 椎间盘突出压迫 L_5 神经根时,可出现小腿外侧或足背皮肤麻木、趾背伸无力、腱反射无改变; $L_5\sim S_1$ 椎间盘突出压迫 S_1 神经根时,可出现小腿及足外侧皮肤麻木,足趾跖屈乏力或不能,踝反射减弱或消失。

- 5、经产妇,足月活胎可经阴道娩出的胎位是()。
 - A. 枕右后位
 - B. 肩左后位
 - C. 肩右后位
 - D. 颏左后位
 - E. 颏右后位

『正确答案』

Α

『答案解析』

暂无解析。

- 6、治疗感染性休克时,纠正血容量不足的最适宜输液方案是()。
 - A. 以平衡盐溶液为主,配合适量血浆或全血
 - B. 以胶体溶液(如代血浆)为主
 - C. 以等渗生理盐水和代血浆为主
 - D. 以等渗葡萄糖溶液和代血浆为主
 - E. 以全血配合等渗葡萄糖溶液

『正确答案』

Α

『答案解析』

感染性休克病人的治疗,首先以输注平衡盐溶液为主,配合适当的胶体液、血浆或全血,以恢复足够的血容量。一般要求维持正常的CVP值,血红蛋白100g/L,血细胞比容30%~35%,以保证正常的心脏充盈压、动脉血氧含量和理想的血液黏滞度。

- 7、哪项是目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌? ()
 - C A. 福氏痢疾杆菌
 - B. 志贺痢疾杆菌
 - C. 鲍氏痢疾杆菌
 - C D. 舒氏痢疾杆菌
 - E. 宋氏痢疾杆菌

『正确答案』

A

『答案解析』

痢疾杆菌为属肠杆菌科志贺菌属,为革兰阴性杆菌。目前本菌分为4群和47个血清型,即A群痢疾志贺菌、B群福氏志贺菌、C群鲍氏志贺菌、D群宋内志贺菌。我国最多见的为B群福氏志贺菌,其次为D群宋内贺志菌。

- 8、引起小儿支气管肺炎脓胸的病原菌主要是()。
 - C A. 链球菌
 - B. 肺炎链球菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 革兰阴性杆菌
 - C E. 厌氧菌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/71711503612
1006046