

2022 年护士职业资格证考试《实践能力》综合检测试题 附答案

考试须知：

- 1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 380 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：_____

考号：_____

| 得分 | 评卷人 |
|----|---------------------------------|
| | A1 型题（本题共 50 题，每小题 3 分，共 150 分） |

1、可出现反常呼吸运动的是（ ）。

- A. 脓胸
- B. 桶状胸
- C. 漏斗胸
- D. 连枷胸
- E. 血气胸

2、排卵的时间一般在（ ）。

- A. 月经周期的第7天左右
- B. 月经周期的第14天左右
- C. 月经过后14天左右
- D. 月经来潮前7天左右
- E. 月经来潮前14天左右

3、乙脑病毒主要侵犯的人体系统是（ ）。

- A. 免疫系统

B. 呼吸系统

C. 循环系统

D. 中枢神经系统

E. 骨骼肌肉系统

4、患儿男出生后十天，因口腔粘膜有异常来院就诊。查体可见口腔粘膜有白色乳凝块样小点，汇集成小片，家长称不易拭去，。目前患儿饮食正常。无全身症状。为该患儿进行口腔粘膜局部治疗，应选用的是（ ）。

A. 2%的利多卡因

B. 3%的过氧化氢溶液

C. 10万U/ml制霉菌素鱼肝油混悬溶液

D. 2%碳酸氢钠溶液

E. 2.5%的金霉素鱼肝油

5、关于轮状病毒肠炎的腹泻特点，不包括（ ）。

A. 多发生在秋、冬季

B. 可伴上呼吸道感染症状

C. 常伴腹痛、里急后重

D. 有轻度的全身感染中毒症状

E. 大便无腥臭味

6、高血压患者，60岁，发生广泛前壁急性心肌梗死3h入院，下列哪种情况提示患者不能溶栓治疗（ ）。

A. 频发室性早搏二联律

B. 血压180 / 110mmHg

C. 1年前做过阑尾手术

D. 并发急性左心衰竭

E. 年龄偏大

7、引起病毒性心肌炎最常见的病毒是（ ）。

- A. 疱疹病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 肝炎病毒
- D. 流感病毒
- E. 轮状病毒

8、下列有关体温的描述正确的选项是（ ）。

- A、长时间从事夜间工作者，在24h内其体温一般在下午2-8点最高
- B、老年人体温有下降趋势，高龄者体温会更低
- C、女性在月经前期，体温轻度降低
- D、婴幼儿体温较稳定
- E、女性体温较男性体温稍高

9、可以动态监测产妇产程进展和识别难产的重要手段是（ ）。

- A、胎儿监护
- B、多普勒听胎心
- C、产程图
- D、阴道检查
- E、肛门检查

10、为昏迷病人插胃管时，当胃管插至会套部时，要将病人头部托起，其目的是（ ）。

- A、减轻病人痛苦
- B、避免损伤食道粘膜
- C、避免病人恶心
- D、加大咽喉部通道的弧度
- E、使喉部肌肉松弛，便于插入

11、提示锥体束受损的重要体征是（ ）。

- A. 颈项强直

- B. 腹壁反射消失
- C. 膝腱反射亢进
- D. 巴宾斯基征阳性
- E. 克匿格征阳性

12、心室颤动患者的脉搏特征是（ ）。

- A、快而规则
- B、慢而规则
- C、快而不规则
- D、慢而不规则
- E、摸不到

13、无菌持物钳的正确使用方法是（ ）。

- A. 可夹取任何物品
- B. 取放无菌持物钳时，钳端应闭合
- C. 门诊换药室的无菌钳，每周消毒一次
- D. 到远处取物时应速去速回
- E. 使用时持物钳钳端向上，不可跨越无菌区

14、关于受压处局部按摩方法的描述，下列错误的是（ ）。

- A. 蘸50%乙醇做局部按摩
- B. 全手掌紧贴皮肤按摩
- C. 做压力均匀的环形按摩
- D. 按摩力度由轻到重，再由重到轻
- E. 每次3~5分钟

15、出现不协调性宫缩乏力时，首先采取的措施是（ ）。

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 酌情给予镇静剂

- C. 立即剖宫产
- D. 立即阴道助产
- E. 等待产程自然进展

16、主动脉瓣狭窄患者的突出临床表现是（ ）。

- A. 胸痛伴眩晕
- B. 乏力、下肢水肿
- C. 呼吸闲难、心绞痛和晕厥
- D. 乏力、水肿、黑蒙
- E. 咯血伴声音嘶哑

17、对进行胃镜检查的患者下列哪项护理措施不正确（ ）。

- A、检查前禁食12小时
- B、检查前半小时给予阿托品皮下注射
- C、检查前协助患者摘除义齿
- D、检查后无需禁食，可进少量流质
- E、检查后告诉病人出现的咽部不适会自行消失

18、判断肋骨骨折，胸部检查最可靠的依据是（ ）。

- A. 局部肿胀
- B. 皮下瘀斑
- C. 皮下气肿
- D. 胸式呼吸消失
- E. 直接和间接压痛

19、心源性水肿的主要致病因素是（ ）。

- A. 心律失常
- B. 醛固酮水平下降
- C. 液体自毛细血管内渗透至组织间隙的量少于回吸收的量

D. 右心功能不全

E. 有效循环血量减少

20、患者林某，女性，32岁，会阴侧切伤口红肿，给予红外线灯照射，灯距应为（ ）。

A. 5-10cm

B. 10-20cm

C. 20-30cm

D. 30-50cm

E. 50-70cm

21、以下不符合肢体血运障碍的临床，表现是（ ）。

A. 动脉搏动减弱

B. 指尖苍白

C. 肢体肿胀

D. 局部麻木刺痛

E. 指尖温度升高

22、妊娠合并心脏病的孕妇为避免加重负担，整个孕妇体重增加不应超过（ ）。

A. 25kg

B. 12.5kg

C. 5kg

D. 15kg

E. 20kg

23、葡萄胎患者术后避孕的最佳方法是

A. 针剂避孕药

B. 宫内节育器避孕

C. 口服避孕药避孕

D. 皮下埋植法避孕

E. 阴茎套、阴道隔膜

24、下列选项中不属于约束带应观察的项目是（ ）。

A. 衬垫是否垫好

B. 约束带是否牢靠

C. 体位是否舒适

D. 局部皮肤颜色及温度

E. 神智是否清楚

25、尿液呈烂苹果味见于（ ）

A. 肝性脑病

B. 泌尿道感染

C. 阻塞性胆管炎

D. 有机磷农药中毒

E. 糖尿病酮症酸中毒

26、为卧床患者洗发时，下列操作不正确的是（ ）。

A. 病室温度控制在24℃左右

B. 水温为40~45℃

C. 用指甲揉搓患者的头发和头皮

D. 观察患者面色及有无不适

E. 洗发时用棉球塞患者双耳，纱布盖双眼

27、大量不保留灌肠应取的体位是（ ）。

A. 左侧卧位

B. 截石位

C. 去枕仰卧位

D. 头高脚低位

E. 头低足高位

28、关于T管引流病人护理不正确的是（ ）。

A. 妥善固定

B. 观察引流液的量和性质

C. 必要时可用无菌盐水冲洗导管

D. 通常留置3~5天拔管

E. 拔管前须试行夹管1~2天

29、减轻尿路刺激征的非药物措施最重要的是（ ）。

A. 做松弛术

B. 卧床休息

C. 补充营养

D. 多饮水

E. 保持会阴部清洁

30、慢性肾衰竭最早和最常见的症状是（ ）。

A. 心血管系统

B. 精神、神经系统症状

C. 消化系统症状

D. 代谢紊乱

E. 内分泌失调

31、在服药过程中出现下列哪种情况考虑地高辛中毒（ ）。

A. 脉率减慢为 78 次/分

B. 脉律转规则

C. 水肿消退

D. 无心慌、气短

E. 体重减轻

32、纤维蛋白性心包炎的主要症状是（ ）。

- A. 心悸
- B. 心前区疼痛
- C. 呼吸困难
- D. 声音嘶哑
- E. 吞咽困难

33、支气管扩张患者出现反复咳血，有窒息的危险。患者最可能出现的心理反应是（ ）。

- A. 抑郁
- B. 恐惧
- C. 悲伤
- D. 愤怒
- E. 惊讶

34、肝昏迷患者应给予（ ）。

- A、低盐饮食
- B、低蛋白饮食
- C、高热量饮食
- D、无盐低钠饮食
- E、低脂肪饮食

35、某早产儿出生后因Apgar转入新生儿病房，治疗12好转，今日医生通知家长出院，护士在出院指导时应向家长重点强调（ ）

- A. 及时添加辅食
- B. 预防感染
- C. 培养良好生活习惯
- D. 预防外伤
- E. 及早训练按时排便

36、直接输血200ml，需准备枸橼酸钠溶液的浓度和量为（ ）。

A. 0.1%，10ml

B. 0.1%，20ml

C. 3.8%，30ml

D. 3.8%，20ml

E. 3.8%，10ml

37、生化检验的血标本应在什么时候采集（ ）。

A、清晨空腹

B、饭前半小时

C、饭后半小时

D、临睡前

E、没有时间限制

38、阿尔茨海默病患者出现下列哪种情况时，护士应高度关注发生走失的危险（ ）。

A. 语言啰嗦，反复絮叨

B. 情绪高涨，言语激动

C. 情绪紧张，无故攻击他人

D. 四处徘徊，无目的走动

E. 拒绝正确意见，情绪执拗

39、采集血气分析标本时，错误的操作是（ ）。

A、使用2ml无菌干燥注射器

B、抽取经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃去

C、无菌操作下抽取动脉血1ml

D、将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住

E、立即送检

40、测定中心静脉压时，测压玻璃管的零点应在（ ）。

A、锁骨中点水平

B、剑突水平

C、胸骨角水平

D、右心房中点水平

E、右心室中点水平

41、抑郁症患者情绪低落的表现一天中的规律是（ ）。

A、晨轻夜重

B、晨重夜轻

C、晨轻夜轻

D、晨重夜重

E、无规律

42、成人每分钟呼吸少于10次多见于下列哪种情况（ ）。

A、缺氧

B、颅内压增高

C、高热

D、贫血

E、心功能不全

43、治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是（ ）。

A、空腹服用

B、饭前1小时服用

C、饭后1小时服用

D、餐时服用

E、睡前服用

44、长期进行肌内注射的病人，护士在注射前要特别注意（ ）。

A、评估病人局部组织状态

B、针梗不可全部刺入

C、询问病人有无过敏史

D、认真消毒病人局部皮肤

E、病人体位的舒适

45、体位引流的时间不宜安排在（ ）。

A. 晨起

B. 饭前

C. 睡前

D. 饭后

E. 活动后

46、患者休养的适宜环境是（ ）。

A. 儿科病室冬季室温在 $22^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$

B. 产妇病室应注意保暖，不能开窗通风，以免产妇着凉

C. 气管切开患者室内湿度在35%

D. 破伤风患者室内光线应充足

E. 哮喘患者房间应摆放鲜花

47、为昏迷病人作口腔护理时，以下正确的是（ ）。

A、协助病人漱口

B、从里向外擦净口腔及牙齿的各面

C、血管钳夹紧棉球，棉球干湿度适宜

D、用开口器时，从门齿处放入 [医学 教育网 搜集 整理]

E、活动假牙可放于 70°C 水中浸泡备用

48、肺心病患者，肺、心功能失代偿期的主要表现是（ ）。

A. 咳嗽，咳痰

B. 咳血

C. 胸闷，胸痛

D. 发热

E. 呼吸衰竭与心力衰竭

49、某甲状腺功能亢进症患者，行基础代谢率测定时间宜在（ ）。

A. 下午6点、餐后和静卧

B. 清晨、空腹和静卧

C. 下午4点，静卧

D. 午间12点、餐后和静卧

E. 下午2点，静卧

50、特发性血小板减少性紫癜病人的主要发病机制是（ ）。

A. 机体产生抗血小板抗体

B. 骨髓造血功能衰竭

C. 凝血因子缺乏

D. 小血管的变态反应性炎症

E. 凝血和纤溶失衡

| | |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|

A2 型题（本题共 50 题，每小题 3 份，共 150 分）

1、患者男性，50岁。患消化性溃疡10年，凌晨出现持续腹痛，服用氢氧化铝后不能缓解，且向背部放射。该患者可能并发了（ ）。

A. 出血

B. 癌变

C. 幽门梗阻

D. 穿孔

E. 失血性周围循环衰竭

2、某8岁患儿，被诊断为“胆道蛔虫病”，经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗(每天1次)。该患儿服用驱虫药的时间应是()。

- A、早餐后
- B、午餐前
- C、午餐后
- D、晚餐后
- E、晚上睡前

3、患者男性 72 岁患冠心病 16 年，近日上呼吸道感染后出现乏力、稍事活动后就心悸，气急、伴乏力，双下肢轻度水肿，查体：双肺底湿罗音，肝颈静脉回流征阳性，心率 135 次/分，护士为患者制定的休息活动计划是()。

- A. 在床上轻微活动
- B. 活动不受限制
- C. 严格卧床休息，半卧位
- D. 卧床休息，限制活动量
- E. 从事轻体力活动

4、患析女性，78岁。高血压10年，晨起发现有侧肢体瘫痪，当时意识清楚，被家人送到医院进行治疗，3天后，病情稳定。此病人瘫痪肢体的康复从什么时候开始()。

- A. 在发病3天后就应进行康复期功能训练
- B. 住发病5天后就应进行康复期功能训练
- C. 住发病1周后就应进行康复期功能训练
- D. 住发病2周后就应进行康复期功能训练
- E. 在发病3周后就应进行康复期功能训练

5、患者女性，23岁。以尿频、尿急、尿痛、畏寒就诊，T 39.5℃，血WBC $5.0 \times 10^9/L$ 尿沉渣白细胞10~15/HP，红细胞多数，护理措施是()。

- A. 给予高蛋白饮食
- B. 尿培养加药敏试验

C. 每口饮水500ml

D. 查嗜酸性粒细胞

E. 留尿蛋白定量

6、患者女性，48岁，因“转移性右下腹痛12小时，以“急性阑尾炎”收住院，查体：精神萎靡，蜷曲体位、体温39.5℃、右下腹压痛、反跳痛明显，对该患者护理诊断的陈述，正确的是（ ）。

A. 体温过高：体温39.5℃，与阑尾炎有关

B. 腹痛：炎症引起

C. 急性阑尾炎

D. 高热：体温39.5℃，由于阑尾炎症所致

E. 萎靡：由于高热、疼痛所致

7、患儿，8岁，先天性心脏病并发充血性心力衰竭。已服用地高辛维持治疗6个月。当你准备给该患儿服用地高辛时，须先测量患儿的（ ）。

A. 体温

B. 脉搏

C. 呼吸

D. 血压

E. 意识

8、患者女，70岁，急性下壁心肌。收入CCU病房，患者出现下列那种心律失常最危险（ ）。

A. 窦性心动过速

B. 偶发房性期前收缩

C. 窦性心律不齐

D. 三度房室传导阻滞

E. 偶发室性期前收缩

9、患者男，76岁，COPD病史5年。因受凉并发肺部感染咳嗽、咳痰入院。血气分析：PaO₂

50mmHg，PaCO₂ 55mmHg，PH7.35。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管肺炎
- C. 支气管扩张
- D. I型呼吸衰竭
- E. II型呼吸衰竭

10、患者男，30岁。夏天在田地里劳作时，突然出现头疼、头晕、恶心继而出现口渴、胸闷、面色苍白、冷汗淋漓、脉搏细速、血压下降，后晕倒在地，该患者可能发生了（ ）。

- A. 急性心肌梗死
- B. 脑血管意外
- C. 中暑
- D. 低血糖休克
- E. 农药中毒

11、患者女，44岁。患心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时，在30分钟内应特别注意的是（ ）。

- A、尿量
- B、中心静脉压
- C、血氧饱和度
- D、心率
- E、血压

12、张某，14岁，中毒性肺炎，休克，经抢救病情稳定，为维持血压，医嘱10%葡萄糖400ml加多巴胺20mg，20滴/min，请计算液体可维持多长时间（每ml按15滴计算）（ ）。

- A、2小时
- B、3小时
- C、4小时
- D、5小时

E、6小时

13、患者男性，55岁。患右侧腹股沟斜疝，1小时前背重物时疝块突然增大、不能回纳，州块紧张发硬伴疼痛和压痛。考虑其可能是()。

A. 易复性疝

B. 难复性疝

C. 滑动性疝

D. 嵌顿性疝

E. 绞窄性疝

14、患儿女，足月儿。因脐带绕颈，出生后1分钟Apgar评分为1分。经窒息复苏后，目前患儿仍嗜睡、反应差、呕吐。此时对该患儿不恰当的护理是()。

A. 头罩吸氧

B. 监测生命体征

C. 立即开奶

D. 配合亚低温治疗

E. 注意保暖

15、某患者在输血过程中出现畏寒、寒战，体温40摄氏度。伴头痛、恶心、呕吐，首先应考虑患者出现()。

A. 发热反应

B. 溶血反应

C. 急性肺水肿

D. 细菌污染反应

E. 枸橼酸钠中毒反应

16、患儿男，10岁。以发热40.2℃收入院，诊断为乙脑。针对该患儿的高热，护理措施是：()。

- A. 严格限制钠盐的摄入
- B. 早期足量给予脱水治疗
- C. 以药物降温为主，无效时给予物理降温
- D. 以物理降温为主，可用小量阿司匹林或肌注安乃近
- E. 密切观察低钾的表现

17、患儿男，8个月。发热2天。体温高达39~39.8℃。咳嗽频繁。呼吸困难，双肺无明显的哮音，X线片示左肺大小不等的片状阴影，白细胞偏低，最可能的诊断是此患儿()。

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 呼吸道合胞病毒肺炎
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 腺病毒肺炎

18、患者男，65岁，因“反复头痛，呕吐2个月”入院，经检查诊断为脑星形细胞瘤，为降低颅内压，最佳的治疗方法是()。

- A、脱水治疗
- B、激素治疗
- C、冬眠低温疗法
- D、脑脊液外引流
- E、手术切除肿瘤

19、患者女性，26岁，确诊肾病综合征1年，近日出现右下肢水肿明显，打腿较左腿明显肿胀，血清胆固醇3.84mmol/L，该患者可能出现了()。

- A. 右下肢感染
- B. 右下肢静脉血栓
- C. 右下肢水肿加重
- D. 药物的副作用

E. 治疗无效

20、患者男性，57岁，盲肠癌行Miles手术。术后10天，病人出现腹部胀痛，恶心。腹壁造口检查：肠壁浅红色-弹性差，可伸入一小指。该病人可能出现的术后并发症是()

A. 造口肠段血运障碍

B. 吻合口瘘

C. 肠粘连

D. 造口狭窄

E. 便秘

21、患者男，56岁，肝硬化腹水，在放腹水的过程中突然出现昏迷，首先采取的措施是()。

A、吸氧

B、头部降温

C、停止放腹水

D、补充血容量

E、保持呼吸道通畅

22、患儿，男，3岁，因发热、咳嗽、痰较多以支气管肺炎收入院，为改善呼吸道分泌物黏稠所致的缺氧症状最好采取()。

A. 鼻导管间歇给氧

B. 氧气帐给氧

C. 气管插管给氧

D. 正压给氧

E. 超声雾化给氧

23、患儿男，34岁。左足麻木、疼痛，走路时小腿酸胀、易疲劳，足底有硬胀感，初步诊断为血栓闭塞性脉管炎。可确诊的辅助检查是()。

A. 肢体抬高试验

B. 静脉注射硫酸镁10ml

C. 仔细检查肢体各种脉搏动情况

D. 行交感神经阻滞

E. 行动脉造影

24、患者男一降，35岁，凶胸部外伤导致右侧气胸，经胸膜腔闭式引流后，护士收集到可拔管的信息是()。

A. 引流瓶内无气体溢出，每日引流量小于50ml，X线证实右肺完全膨胀

B. 引流瓶长管内的水柱停止波动

C. 引流瓶长管内的水柱波动小于1L啊

D. 连续两天胸瓶引流量小于50ml

E. 病人无呼吸困难，引流瓶中无气体溢出

25、患儿，男，1岁，平常体重10kg，1天来腹泻，医生诊断为轻度脱水，该患儿的液体丢失约为()。

A. 600ml

B. 500ml

C. 800ml

D. 1200ml

E. 1000ml

26、患者男，65岁。诊断慢性呼吸衰竭，经过积极治疗，病情好转。护士给其进行呼吸功能锻炼前，应该评估的是()。

A. 体温

B. 脉搏

C. 营养

D. 尿量

E. 活动能力

27、患者男，68岁。因膀胱癌行经尿道癌肿切除术。术后行膀胱灌注的时间为（ ）。

- A. 术后每周灌注1次，共4次，以后每月1次，持续1年
- B. 术后每周灌注1次，共6次，以后每月2次，持续1年
- C. 术后每周灌注1次，共6次，以后每月1次，持续2年
- D. 术后每周灌注1次，共8次，以后每月1次，持续1年
- E. 术后每周灌注1次，共8次，以后每月2次，持续2年

28、患者女性 31 岁，患风湿性心脏病妊娠 32 周，入院时体力活动重度受限，休息时也乏力，新功能属于（ ）。

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级

29、某孕妇，G2P6。妊娠30周，规律下腹疼痛伴阴道血性分泌物6小时。查体：胎位LOA，胎心率146次/分，宫缩20秒/7~8分钟，宫缩力弱，肛查胎先露S-3，宫颈管缩短，宫口可容一指尖。目前最恰当的处理措施是（ ）。

- A. 严密观察等待自然分娩
- B. 滴注缩宫素加强宫缩
- C. 抑制宫缩保胎治疗
- D. 立即行剖宫产终止妊娠
- E. 阴道检查后确定分娩方式

30、某男，10岁，为预防流行性感冒，自愿接种流感疫苗。接种过程中，小儿出现头晕、心悸、面色苍白，出冷汗；查体：体温36.8℃，脉搏130次/分，呼吸25次/分，诊断为晕针。此时，护士应为患儿采取正确的卧位是（ ）。

- A. 头低脚高位
- B. 头高脚低位
- C. 侧卧位

D. 俯卧位

E. 平卧位

31、患者男，27岁。打篮球时突然出现上腹部剧烈绞痛，放射至下腹及会阴部位，伴面色苍白，冷汗，恶心、呕吐，患者肾区叩击痛性，入院诊断为尿路结石。应首先为患者进行的处理措施是（ ）。

A. 准备手术用品

B. 应用抗感染药

C. 提供饮料

D. 采集血标本

E. 肌内注射解痉止痛药

32、患者女，40岁。因触电导致意识丧失、心脏骤停。正确的抢救措施是（ ）。

A. 胸外按压的频率至少100次/分

B. 胸外按压位置为胸骨1/2交界处

C. 按压/通气比例是15：2

D. 胸外按压的频率至少80次/分

E. 将患者平放于软床上

33、某社区妇幼保健院机构进行孕期检查，护士应指导孕妇正确进行产前检查的孕期是（ ）。

A. 妊娠13~19周，每个月检查一次

B. 妊娠20~36周，每周检查一次

C. 妊娠7~12周，每周检查一次

D. 妊娠32~37周，每个月检查一次

E. 妊娠32~34周，每个月检查一次

34、患者男，75岁，因“发热、反复咳嗽并伴有脓性痰液2周”入院，诊断为急性支气管炎。易加重病情的药物是（ ）。

A、可待因

B、必嗽平

C、复方甘草合剂

D、复方氯化铵

E、沐舒坦

35、患儿女，1岁，消瘦，哭闹时青紫，平静后青紫消失，查体：胸骨左第2~3肋间可闻及收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进，并固定分裂。该患儿最可能的诊断是()。

A. 室间隔缺损

B. 房间隔缺损

C. 动脉导管未闭

D. 法洛四联症

E. 主动脉狭窄

36、患者李某，60岁，心内膜炎，需混合注射链霉素和青霉素，皮试结果均为阴性，此时护士首先应考虑的是()

A. 药物有无配伍禁忌

B. 药物的有效期

C. 各种药物的剂量

D. 药物的刺激性

E. 各种药物的浓度

37、患者女性，27岁。甲状腺肿大1年，消瘦，易疲劳，失眠，心悸，怕热•体重下降明显，心率110次/分，血压130/80mmHg，诊断为Graves病，主要护理问题是()。

A. 营养失调：低于机体需要量

B. 焦虑

C. 睡眠形态紊乱

D. 疲乏

E. 有受伤的危险

38、患儿女，5岁。2周前与水痘患儿有密切接触。现该患儿体温为39℃，胸前见现红斑疹、丘疹，护士不能采用的降温措施是()。

A. 冰枕

B. 温湿敷

C. 阿司匹林口服

D. 适量对乙酰氨基酚口服

E. 吲哚美辛栓剂直肠用药。

39、患者女，20岁，寒战，发热，右小腿内侧出现鲜红色片状疹，烧灼样疼痛，附近淋巴结肿大疼痛。错误的护理措施是()。

A. 遵医嘱使用抗生素

B. 嘱患者勿抬高患肢

C. 局部湿热敷

D. 给予物理降温

E. 嘱患者卧床休息

40、患者女性，65岁。有高血压病史10年。最近稍事活动即出现胸闷、心悸、气急症状，该患者的心功能为()。

A. I级

B. II级

C. III级

D. IV级

E. V级

41、某孕妇，妊娠32周，因“胎膜早破”“14小时入院，检查发现胎心正常，无腹痛。错误的处胎措施是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718010125112006033>