

超声波医学与技术(主管技师)《胆道、胰腺和胃肠必看考点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：外科手术患者禁食并给予静脉营养时，胆囊将会产生（ ）。A. 下垂
B. 病理性扩张
C. 收缩
D. 病变
E. 憩室
- 2、单项选择题：胆总管下端梗阻（ ）。A. 肝内胆管与伴行门静脉呈小平行管征
B. 肝内胆管呈树枝状扩张
C. 胆总管扩张
D. 左右肝管均可扩张
E. 胆管、胰管双扩张
- 3、单项选择题：一男性患儿出生后5周，呕吐频繁，进食后明显，体检见患儿消瘦，右上腹可扪及橄榄形肿块对其声像图的表现，下列描述不正确的是（ ）。A. 幽门壁全周性增厚，范围较局限
B. 病变长度约在2.0~2.5cm，壁厚度约4~8mm
C. 胃腔内可见大量潴留物，胃壁偶见逆蠕动
D. 胃幽门管狭窄变形，内膜面不平整
E. 病变短轴呈靶环征，长轴呈子宫颈征
- 4、单项选择题：一位新生儿生后2个月黄疸不退，超声检查示肝脏回声稍增强，胆囊未见显示，肝内胆管显示不清，胆总管呈索条状稍高回声，最可能的诊断为（ ）。A. 胆囊缺如
B. 异位胆囊
C. 胆道蛔虫
D. 新生儿肝炎
E. 胆道闭锁
- 5、单项选择题：胆囊颈部结石（ ）。A. 胆囊底部壁增厚，壁内可见小囊结构
B. 胆囊底部向腔内隆起的球状低回声结节，大小为15mm
C. 胆囊肿大，颈部见强回声伴后方声影
D. 胆囊底部囊腔萎缩，内充满砂粒状强回声，胆囊颈管增大
E. 胆囊壁可见单发或多发的强回声，呈彗星尾征
- 6、单项选择题：急性阑尾炎的超声影像表现不包括（ ）。A. 阑尾直径大于6mm，横切与纵切面呈现为同心圆与多层管结构
B. 阑尾腔内可见积液及点状强回声

- C. 阑尾周围可见回声增强且不可被压缩
 D. 阑尾可以被压瘪，腔内可见气体样回声
 E. 阑尾呈腊肠形，腔内可见结石样强回声及后方声影
- 7、单项选择题：以下描述不正确的是（ ）。A. 胃恶性淋巴瘤比胃癌的胃壁增厚明显
 B. 弥漫浸润型胃癌可见火山口征
 C. 胃癌时可见胃壁增厚，空腹呈假肾征
 D. 女性胃癌可转移至双侧卵巢
 E. 胃癌可致胃蠕动波减弱或消失
- 8、单项选择题：对急性阑尾炎的描述，错误的是（ ）。A. 阑尾腔正常时中央部呈无回声
 B. 回盲区积液是化脓性阑尾炎或阑尾周围积脓的表现
 C. 阑尾炎症可继发肝脓肿
 D. 肿胀阑尾呈一有盲端的管状结构，不蠕动
 E. 阑尾穿孔时，膈下一般不出现游离气体
- 9、单项选择题：一患者的超声图像显示于胰腺尾部可见一包膜光整的多房性囊性结构，囊壁较厚并伴乳头状结节及钙化斑附着，囊腔内透声良好，可见较粗大的高回声光带分隔最可能的诊断是（ ）。A. 胰腺脓肿
 B. 胰腺腺瘤
 C. 胰腺假性囊肿
 D. 胰腺癌
 E. 胰腺囊腺瘤
- 10、单项选择题：鉴别肝外胆管结石或肿瘤性梗阻，有利于结石诊断的是（ ）。A. 肝外胆管扩张，内径大于 12mm
 B. 肝外胆管腔内中心部为强回声的低弱回声，与管壁分界欠清
 C. 扩张的胆管突然狭窄并截断
 D. 胆管腔内形态稳定的强回声团，周围包绕细窄的液性暗环
 E. 肝外胆管壁不规则增厚
- 11、单项选择题：胆囊癌壁厚型（ ）。A. 胆囊颈部一基底较宽表面不平整的较小结节
 B. 突入胆囊腔内的蕈伞状宽基底弱回声结节
 C. 囊壁增厚伴乳头状或蕈伞状肿块
 D. 胆囊腔消失，胆囊区代之以弱回声不均匀实性肿块
 E. 胆囊壁不均匀增厚，内壁残缺不齐
- 12、单项选择题：胃癌肿块型的超声特征是（ ）。A. 胃壁增厚，正常结构消失，胃腔狭窄，呈假肾征
 B. 胃壁明显增厚，呈低弱回声，内可见大小不等的弱回声结节，血运丰富，胃腔狭窄不明显
 C. 肿块突向胃腔内，形态不规则，表面黏膜隆起，不平整，边界尚清晰
 D. 均匀低回声类圆形肿瘤，将黏膜层顶起，形成拱桥样黏膜
 E. 大小约为 10cm 的边界模糊的分叶状肿瘤，内部有不规则液化坏死区，肿瘤实性部分未探及明显血流信号
- 13、单项选择题：除以下哪一项外，均是胃肠超声检查前需做的准备工作（ ）。A. 将胃肠超声安排在 X 线钡剂造影前进行
 B. 胃肠超声最好在上午进行
 C. 检查前一日晚餐进流食，其后禁食
 D. 经腹壁乙状结肠检查者应使膀胱排空

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718073012066006071>