

## 三基护理知识模拟试题+参考答案

1、疥疮皮损好发于

- A、指缝、腕部屈侧、下腹部、股内侧
- B、四肢的伸侧
- C、胸背部及腰部
- D、臀部及双下肢、手掌及足背
- E、头部、面部和颈部

答案：A

2、有关围绝经期综合征，下述哪项描述正确()

- A、其产生原因主要与雌激素水平的下降有关
- B、其产生原因主要与孕激素水平的下降有关
- C、其产生原因主要与雄激素水平的相对过高有关
- D、约 1/3 的围绝经期妇女可出现围绝经期综合征的表现
- E、其产生原因主要与心理调适状态不佳有关

答案：A

3、输血致过敏反应的处理，错误的是

- A、轻者可减慢滴速
- B、注射抗过敏药物
- C、呼吸困难者给予吸氧
- D、必要时可行气管切开
- E、重者立即停止输血

答案：A

4、肿瘤病人放疗后的主要黏膜反应是：

- A、口腔黏膜反应
- B、皮肤黏膜反应
- C、食道黏膜反应
- D、胃肠道黏膜反应

答案：A

5、正确采集痰标本的时间是：

- A、痰液较多时
- B、清晨
- C、临睡前
- D、输液前

答案：B

6、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸汽灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是()

- A、环氧乙烷灭菌法
- B、辐射灭菌法
- C、过氧乙酸浸泡灭菌法
- D、微波灭菌法
- E、戊二醛浸泡灭菌法

答案：A

7、现代医学已开始主张死亡的依据是

- A、瞳孔散大
- B、心跳停止
- C、心电图平直
- D、呼吸停止
- E、脑死亡

答案：E

8、我国规定的监测传染病是()

- A、疟疾、流感、脊髓灰质炎、出血热、回归热、登革热
- B、疟疾、流感、流脑、回归热、登革热、斑疹伤寒
- C、疟疾、流感、脊髓灰质炎、斑疹伤寒、回归热、登革热
- D、鼠疫、霍乱、黄热病、回归热、斑疹伤寒
- E、鼠疫、霍乱、天花、黄热病、回归热、出血热

答案：C

9、大量咯血是指咯血量:

- A、 $>300\text{ml} / \text{d}$
- B、 $>600\text{ml} / \text{d}$
- C、 $>500\text{ml} / \text{d}$
- D、 $>400\text{ml} / \text{d}$

答案：C

10、发生压疮的最主要原因是

- A、局部组织长期受压
- B、机体营养不良
- C、急性应激因素
- D、局部皮肤潮湿或受排泄物刺激

E、体温升高

答案：A

11、健康相关行为是指：

- A、促进健康行为和危害健康行为
- B、心理保健行为
- C、定期体格检查
- D、危害健康行为

答案：A

12、脊髓休克的表现不包括：

- A、直肠和膀胱中粪尿潴留
- B、出汗增多
- C、外周血管扩张，血压下降
- D、骨骼肌的紧张性降低或丧失

答案：B

13、患者，男，68岁。心绞痛病史2年。下午6点左右无明显诱因出现心前区疼痛，含服硝酸甘油效果不佳，疼痛逐渐加剧，于当晚10点急诊入院，医嘱要求查CkMB(肌酸激酶同工酶)。血标本试管外应贴标签，标签上应注明的内容一般不包括

- A、科室
- B、床号、姓名
- C、检验目的
- D、取血量
- E、送检日期

答案：D

14、毒物在体内的蓄积量主要受哪些因素的影响()

- A、蓄积部位、摄入量、生物半减期
- B、毒性、摄入量、生物半减期
- C、理化特性、毒性、摄入量
- D、摄入量、理化特性、作用时间
- E、摄入量、生物半减期和作用时间

答案：E

15、黄苔主何证：

- A、里热证
- B、表证、寒证
- C、里寒证

D、热证、里证

答案：D

16、社区卫生服务的基本任务是()

A、向本社区居民提供预防、医疗、健康保健服务及解决民事纠纷

B、向本社区居民提供预防、医疗、康复和保健服务，实现基层的初级卫生保健

C、向本社区居民提供预防、康复和保健服务，为初级卫生保健打下基础

D、向本社区居民提供户口管理、医疗、预防保健服务

E、向社区老人及妇女儿童提供医疗、健康和保健服务

答案：B

17、目前我国计划免疫的正确含义是()

A、对儿童进行脊髓灰质炎、百日咳、白喉、破伤风、结核、麻疹等6种生物制品的接种

B、经常性的常规免疫加上流行时的应急免疫

C、在某些传染病流行期间有针对性地进行预防接种

D、根据疫情监测和人群免疫状况分析，按照规定的免疫程序，有计划地利用生物制品进行人群预防接种，以提高人群免疫水平，达到控制以至最终消灭相应传染病的目的

E、对儿童的基础免疫和加强免疫

答案：D

18、体温骤降时，病人最易出现()

A、昏迷

B、头痛

C、寒战

D、虚脱

E、澹妄

答案：D

19、医院感染的主要对象是

A、探视者

B、住院患者

C、陪护者

D、急诊患者

E、门诊患者

答案：B

20、病人宋某, 28岁, 因阴道持续性流液1小时就诊, 入院诊断为胎膜早

破。护士应将其安置为

- A、头低足高位
- B、平卧位
- C、头高足底位
- D、侧卧位
- E、膝胸卧位

答案：A

21、病人张某，男，70岁。测口温时不慎将体温计咬碎，护士应立即采取的措施为

- A、口服蛋清液
- B、清除口腔内玻璃碎屑
- C、洗胃
- D、催吐
- E、服缓泻剂

答案：B

22、H型呼吸衰竭的给氧原则

- A、 $>30\%$
- B、 $<30\%$
- C、 $>35\%$
- D、 $<35\%$

答案：D

23、慢性阻塞性肺气肿病人家庭氧疗的方法是：

- A、每天吸氧3~5小时，氧流量2~4l/min
- B、每天吸氧5~10小时，氧流量2~4l/min
- C、每天吸氧10~15小时，氧流量1~2l/min
- D、每天吸氧5~10小时，氧流量1~2l/min

答案：C

24、老年心肌梗死不典型者的首发症状常为：

- A、心前区持久的胸痛
- B、胸骨后持久的胸痛
- C、心脑血管综合征
- D、休克、心衰、脑循环衰竭、胃肠道症状

答案：D

25、一病人吸氧的流量为 4l / min, 其吸氧的浓度是()

- A、 37%
- B、 33%
- C、 25%
- D、 40%
- E、 27%

答案： A

26、 下列关于丹毒的叙述， 错误的是：

- A、 好发于面部和四肢
- B、 感染加重可导致全身脓毒血症
- C、 常有组织坏死或局部化脓破溃
- D、 可引起皮肤及淋巴结的炎症

答案： C

27、 成人洗胃灌注量每次应为

- A、 100 (1200ml)
- B、 800-1000ml
- C、 500—800ml
- D、 200ml
- E、 300-500ml

答案： E

28、 一旦确诊葡萄胎， 应迅速采取的措施为：

- A、 放疗
- B、 化疗
- C、 清除宫腔内容物
- D、 切除子宫

答案： C

29、 不可使用约束带的患者是

- A、 发热谵妄
- B、 烦躁不安的患者
- C、 神经官能症
- D、 精神病患者
- E、 麻醉后未清醒者

答案： C

30、 赵先生， 35 岁。 诊断为“破伤风”。 护士用紫外线灯对其病室消毒时，

正确的是

- A、消毒过程中嘱患者戴眼罩，大单遮盖身体
- B、灯亮后 2min 开始计时，消毒 30min
- C、紫外线灯管每月用乙醇纱布擦拭一次
- D、登记灯管使用时间，超过 2000h 应更换灯管
- E、调节室内温度 20° C, 相对湿度为 70%.

答案：A

31、Glasgow 昏迷评分法中若病人仅能发音，无语言，分值是：

- A、2 分
- B、3 分
- C、4 分
- D、5 分

答案：A

32、适于采用包扎疗法的烧伤创面是()

- A、面颈部浅度烧伤
- B、四肢高压电接触伤
- C、I 度烧伤
- D、四肢浅 II 度及深 II 度烧伤
- E、会阴部烧伤

答案：D

33、慢性肾衰患者每天尿量低于一时，应限制饮水量及食物中的水分。

- A、500ml / d
- B、400ml / d
- C、1000ml / d
- D、1500ml / d

答案：C

34、下列关于类风湿性关节炎的护理，叙述不正确的是：

- A、急性期限制受累关节活动，保持其功能位
- B、症状基本控制后，鼓励病人及早下床活动，避免长时间不活动
- C、慢性抗风湿药应饭后服用并鼓励病人多饮水
- D、晨僵病人应鼓励其起床立即活动关节，减轻僵直症状

答案：D

35、下列关于快波睡眠的描述，正确的是

- A、快波睡眠与觉醒时很难区分
- B、与慢波睡眠相比,快波睡眠的唤醒阈降低
- C、脑耗氧量及脑血流量降低
- D、快波睡眠期不会发生做梦常五
- E、生长激素分泌增多

答案: A

36、机械通气病人气道吸痰的时间不超过

- A、15s
- 1min
- C、30s
- D、3min

答案: A

37、护理技术管理的目标是:

- A、提高护理质量
- B、开展新业务、新技术
- C、以病人为中心
- D、提高基础护理技术

答案: A

38、口对口鼻人工呼吸法最适用于

- A、中年女性患者
- B、老年患者
- C、婴幼儿
- D、牙关紧闭患者
- E、口腔严重损伤患者

答案: C

39、颈椎骨折进行颅骨牵引时,应采取的卧位是下

- A、半坐卧位
- B、头低足高位
- C、端坐位
- D、头高足底位
- E、俯卧位

答案: D

40、WHO所推荐的三阶梯镇痛疗法中,下列属于第二阶梯镇痛药的是

- A、阿司匹林

- B、布洛芬
- C、吗啡
- D、可待因
- E、美沙酮

答案：D

41、一位护士给鼻饲患者注人流质饮食后又注入少量温开水。她这样做的目的是

- A、防止患者呕吐
- B、避免食物存积于管道
- C、使患者温暖舒适
- D、便于防止液体反流，发生窒息
- E、便于测量，记录准确

答案：B

42、发生心室颤动时最主要的处理措施是：

- A、电除颤
- B、静脉注射利多卡因
- C、电复律
- D、安装起搏器

答案：A

43、小儿体液平衡的特点是：

- A、年龄越小，越不易发生电解质代谢紊乱
- B、年龄越小，体液调节功能越强，越不易出现脱水
- C、年龄越小，体液总量相对越多
- D、年龄越小，需水量相对越少

答案：C

44、呼吸机应用时出现高压报警的常见原因有

- A、高压报警限设定过高
- B、呼吸道分泌物过多
- C、呼吸机管道脱落
- D、湿化罐活塞未闭

答案：B

45、诊断病人腹腔内出血最简单、可靠的方法是

- A、HCG 测定

- B、X 线检查
- C、阴道后穹窿穿刺
- D、B 超检查

答案：C

46、关于主动湿化的优点叙述不正确的是：

- A、低阻力
- B、不会过度湿化
- C、无附加死腔
- D、灵活控制温度和湿度

答案：B

47、铺麻醉床将橡胶单铺于床中部时，上端应距离床头()

- A、45~50cm
- B、30~40cm
- C、40~45cm
- D、33~40cm
- E、50—60cm

答案：A

48、总产程不应超过多少小时

- A、8 小时
- B、2 小时
- C、16 小时
- D、24 小时

答案：D

49、床上铺橡胶单，其上端距床头相当于

- A、一手掌宽
- B、肘关节至腕关节
- C、腕至指端
- D、3 横指
- E、肘至指端

答案：E

50、少尿是指 24 小时的尿量少于

- A、400ml
- B、500ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/725013111101012010>