

外科知识竞赛题库附答案（精选 80 题）

一、单选题(60 题)

1. 机械通气潮气量的选择常用（）

A. 5mL/kg

B. 10mL/kg(正确答案)

C. 15mL/kg

D. 20mL/kg

E. 25mL/kg

2. 下列哪一种食物中毒可呈阵发性腹部绞痛,大便呈洗肉水样（）

A. 沙门氏菌食物中毒

B. 变形杆菌食物中毒

C. 嗜盐菌食物中毒(正确答案)

D. 葡萄球菌食物中毒

E. 肉毒杆菌食物中毒

3. “阴平阳秘,精神乃治”是指 ()

- A. 阴阳对立制约关系正常
- B. 阴阳互根关系正常
- C. 阴阳消长平衡关系正常(正确答案)
- D. 阴阳相互转化关系正常
- E. 阴阳交感相错关系正常

4. 术中鉴别直疝与斜疝最可靠的依据是 ()

- A. 精索与疝囊的关系
- B. 疝囊颈与腹壁下动脉的关系(正确答案)
- C. 疝块与内环的关系
- D. 疝块是否进入阴囊
- E. 疝块是否产生嵌顿

5. 行子宫全切除术及左附件切除时应离断哪些韧带 ()

- A. 双子宫圆韧带、双子宫阔韧带、左卵巢固有韧带
- B. 双子宫圆韧带、双子宫阔韧带、双子宫主韧带、左卵巢固有韧

带

C. 双子宫圆韧带、双子宫阔韧带、双子宫主韧带、双骶子宫韧带、右卵巢悬韧带、左卵巢固有韧带

D. 双子宫圆韧带、双子宫阔韧带、双子宫主韧带、双骶子宫韧带、左卵巢悬韧带、右卵巢固有韧带(正确答案)

E. 双子宫圆韧带、双子宫阔韧带、双骶子宫韧带

6. 雌激素的生理作用应除外 ()

A. 促进水、钠潴留

B. 促进钙质沉积

C. 增加子宫的血液运行

D. 对丘脑下部和垂体有正、负反馈作用

E. 刺激红细胞生成(正确答案)

7. 弥散性血管内凝血 () 指的是 ()

A. 心、肝、肾等重要器官中有较多的血栓形成

B. 全身小动脉内有广泛性的血栓形成

C. 全身小静脉内有广泛性的血栓形成(正确答案)

D. 小动脉和小静脉内均有广泛性的血栓形成(正确答案)

E. 微循环内有广泛的微血栓形成

标准答案： E

8. 下列哪项不属心脏压塞征象（）

A. 颈静脉怒张

B. 血压下降, 脉压变小

C. 奇脉

D. 第一心音亢进(正确答案)

E. 心音遥远

9. 下列哪项不是.. 第一次会谈中要涉及的结构和内容（）

A. 消除戒心

B. 进入正题

C. 探索问题

D. 评估效果(正确答案)

10. 全科医疗的基本特征不包括下列哪项（）

A. 为社区居民提供连续性服务

- B. 提供以病人为中心的服务
- C. 提供以社区为基础的服务
- D. 提供以家庭病床为主的基层医疗服务(正确答案)

11. 一个 5 岁男孩, 一向受到家里父母、祖父母的宠爱, 一不称心就大发脾气、打人、摔东西, 家人也只好多哄哄他。如今, 他在幼儿园里也常常大闹, 致使老师、同学都不喜欢他。下列哪项功能是最大的问题? ()

- A. 社会化(正确答案)
- B. 满足情感需要
- C. 抚养或赡养
- D. 满足生殖和性需要

12. 以下哪项不是青少年期的特点 ()

- A. 第二性征明显
- B. 身高、体重快速增加
- C. 开始追求独立、自我认同
- D. 因上学与父母分离而产生焦虑(正确答案)

13. 家庭评估的主要目的是下列哪项（）

A. 了解家庭的结构和功能状况(正确答案)

B. 进行家庭生活干预

C. 了解家庭发展历史

D. 了解病人的家庭矛盾

14. 全科医生对病人进行辅助检查, 应遵循的原则不包括下列哪
项（）

A. 依据病史、体格检查及病情需要来选定

B. 不需要做的坚决不做

C. 需要做的一定要做

D. 费用高的一律不做(正确答案)

15. 猝死常见的病因是（）

A. 冠心病(正确答案)

B. 脑出血

C. 急性肺动脉栓塞

D. 癫痫大发作

E. 急性坏死性胰腺炎

16. 过敏性休克的首选治疗药物为 ()

A. 糖皮质激素

B. 0.1%肾上腺素(正确答案)

C. 抗组胺药

D. 钙剂

E. 硫代硫酸钠注射剂

17. 下列哪种肌肉松弛药在麻醉诱导时起效最快 ()

A. 维库溴铵

B. 阿曲库铵

C. 罗库溴铵

D. 琥珀胆碱(正确答案)

E. 泮库溴铵

18. 有关丘疹性荨麻疹, 下述哪项不正确 ()

A. 虫咬

- B. 食物过敏
- C. 多见于春秋季节
- D. 儿童比成人多见
- E. 病毒感染(正确答案)

19. 宫颈原位癌是指 ()

- A. 基底层细胞增生
- B. 细胞的大小和形态不一
- C. 可见核分裂但常局限在上皮的下半部
- D. 核染色质过多
- E. 上皮全层细胞均已癌变(正确答案)

20. 每次治疗完毕, 舱内的紫外线空气消毒时间是 ()

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟(正确答案)
- D. 1 小时

E. 1.5 小时

21. 毛果芸香碱临床上常用于治疗 ()

A. 心动过缓

B. 青光眼(正确答案)

C. 重症肌无力

D. 尿潴留

E. 腹气胀

22. 刺激机体产生类风湿因子的抗原是 ()

A. 变性 IgG(正确答案)

B. 变性 IgM

C. 变性 IgA、

D. 变性 IgD、

E. 变性 IgE、

23. 蛋白质的生理功能不包括 ()

A. 构成和修复组织

B. 供给热能

C. 调节代谢

D. 阻止癌细胞分裂(正确答案)

E. 维持胶体渗透压

24. 上唇疔可并发 ()

A. 面部蜂窝织炎

B. 眼睑炎

C. 口炎

D. 牙龈炎

E. 化脓性海绵状静脉窦炎(正确答案)

25. 我国人民膳食中蛋白质的主要来源是 ()

A. 排骨

B. 粮谷类(正确答案)

C. 蛋类

D. 豆类及其制品

E. 水果、蔬菜类

26. 与抗体高亲和的细胞是 ()

A. 树突状细胞和巨噬细胞

B. 单核细胞和淋巴细胞

C. 中性粒细胞和嗜碱性粒细胞

D. 肥大细胞和嗜碱性粒细胞(正确答案)

E. 红细胞和嗜酸性粒细胞

27. 下列哪项禁作骨髓穿刺 ()

A. 显著血小板减

B. 粒细胞缺乏症

C. 重度贫血

D. 血友病(正确答案)

E. 恶性组织细胞病

28. 破伤风病人静脉滴注大量 T. A. T. 的目的是 ()

A. 控制和解除痉挛

- B. 抑制破伤风杆菌生长
- C. 减少毒素的产生
- D. 中和游离的毒素(正确答案)
- E. 中和游离与结合的毒素

29. 下列哪种情况需手术探查 ()

- A. 损伤性窒息
- B. 皮下气肿
- C. 纵隔气肿
- D. 胸部爆震伤
- E. 胸腹联合伤(正确答案)

30. 判断腹内空腔脏器损伤最有价值的发现是 ()

- A. 腹膜刺激征
- B. 脉率增快
- C. 呕血
- D. 有气腹(正确答案)

E. 腹胀

31. 水中毒还需用（）以促进水分排出。

A. 高渗盐水

B. 强心剂

C. 低渗盐水

D. 大量补充血容量

E. 利尿剂(正确答案)

32. 呼吸性酸中毒,可引起（）。

A. 高碳酸血症(正确答案)

B. 低碳酸血症

C. PH 明显升高

D. 低钾血症

E. 低钠血症

33. 休克抑制期的病理生理改变是（）。

A. 微动脉及毛细血管前括约肌舒张, 毛细血管后的小静脉处在收缩状态(正确答案)

- B. 细胞内的溶酶体破裂, 造成细胞自溶
- C. 肾上腺髓质和交感神经节后纤维释放大量儿茶酚胺
- D. 细胞能量来源主要是糖酵解
- E. 毛细血管内有微血栓形成

34. 在休克监测中, 哪项观察结果表示与后极差 ()。

- A. 中心静脉压低于 0.49kPa
- B. 肺动脉楔压超过 4.0kPa
- C. 乳酸盐浓度超过 8mmol/L (正确答案)
- D. 动脉二氧化碳分压高于 5.33kPa
- E. 血小板计数低于 $8.0 \times 10^9/L$

35. 休克的根本问题是 ()。

- A. 组织、细胞缺氧 (正确答案)
- B. 低血压
- C. 尿少
- D. 心功能不全

E. 以上都不是

36. 诊断休克的主要依据是 ()。

A. 低血压

B. 尿少

C. 脉快

D. 临床表现(正确答案)

E. 以上都不是

37. 手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围 ()。

A. 15cm 的区域(正确答案)

B. 10cm 的区域

C. 8cm 的区域

D. 12cm 的区域

E. 30cm 的区域

38. 男, 55 岁, 因高热、神志模糊、休克送入 ICU 治疗, 诊断为重症肺炎, 经积极治疗后体温正常, 血压 120/68mmHg, HR100bpm, 呼吸 36 次/分, 唇发绀, 双肺无罗音, 该病人最可能是 ()。

A. 心力衰竭

B. ARDS (正确答案)

C. 气胸

D. 脑膜炎

E. 胸膜炎

39. 下列哪项是多器官功能不全综合征的病因 ()。

A. 慢性贫血

B. 低蛋白血症

C. 电解质平衡紊乱

D. 低血容量休克 (正确答案)

E. 酸碱平衡紊乱

40. 对心力衰竭的病人最好是在心力衰竭控制多长时间后进行择期手术 ()。

A. 3d 以后

B. 1 周之后

C. 2 周之后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727011062002010005>