

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

1、下列有关护理工作的描述,不正确的是【单选题】——

- A. 各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行
- B. 起封抽吸的各种溶媒超过 36 小时不得使用,最好采用大包装
- C. 无菌物品必须一人一用一灭菌
- D. 灭菌物品提倡使用小包装,无菌棉球或纱布罐一经打开,使用时间不得超过 24 小时 治疗室、处置室布局合理,清洁区、污染区分区明确

【答案】： B

2、下述不符合环境卫生学标准的是【单选题】——

- A. 层流洁净手术室物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$
- C. 治疗室医务人员手细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 传染病房物体表面细菌数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 婴儿室空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$

【答案】： B

3、I 类. II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$,未检出致病菌

【答案】： D

4、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】： B

5、下述各项中错误的是【单选题】——

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施 传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】： A

6、ICU【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】： B

7、关于医院内感染知识培训,错误的叙述是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年不少于 2 小时培训
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

8、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院, 医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院, 医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员
300-500 张床位的医院, 医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】： B

9、医院内尿路感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： A

10、关于消毒因子对人体的危害, 错误的是【单选题】——

- A. 微波对人体无害
- B. 液体消毒剂可以造成人体过敏
- C. 紫外线直接照射可伤害人体皮肤和角膜
- D. 环氧乙烷泄漏不仅对人体直接有毒, 还可以发生爆炸吸入戊二醛气体对人体有害

【答案】： A

11、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】： A

12、手术间通常保持的温度【单选题】——

- A. 22~26℃
- B. 18~20℃
- C. 22~25℃
- D. 20~22℃ 16~18℃

【答案】：C

13、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：C

14、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

15、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 24h
- B. 6h
- C. 48h
- D. 12h 72h

【答案】：A

16、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A.

病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染

B. 病人在家中已发生的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】： E

17、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

A. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应

C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者

D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】： D

18、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——

A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失

B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素

C. 建立医院的医院感染发病率基线

D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】： A

19、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

A. 经消化道传播

B. 接触传播

C. 经呼吸道飞沫传播

D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】： C

20、根据我国卫生标准回答:监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

21、铺无菌台无菌包布下垂长度为【单选题】——

- A. 10cm 以上
- B. 30cm 以上
- C. 50cm 以上
- D. 20cm 以上 40cm 以上

【答案】: B

22、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】: B

23、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】: E

24、B-D 试验只适用于【单选题】——

A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测

B.

预真空压力蒸汽灭菌器监测

C. 流动蒸汽灭菌器的监测

D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】：B

25、手术台上器械护士需要增加无菌纱布,巡回护士取用的正确方法是

【单选题】——

A. 用消毒的手指拿取纱布

B. 其他都不对

C. 用灭菌换药镊子夹取纱布

D. 戴手套拿取纱布 用无菌持物钳夹取纱布

【答案】：E

26、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【

单选题】——

A. 0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】：B

27、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物

B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染

C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势

D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】：C

28、普通病房【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C.

空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
D. —, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气
 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$? 下列各医
疗区的细菌学指标是

【答案】： C

29、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

- A. 动物
- B. 血液制品
- C. 各种病人
- D. 食品 病原携带者

【答案】： C

30、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

【答案】： E

31、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】——

- A. 尽量减少侵入性操作
- B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染
- C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染
- D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措施,减少内源性感染

【答案】： B

32、传染病院应设置在【单选题】——

- A. 靠近综合性医院
- B.

城市中心

- C. 远离公共场所
- D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

33、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 血液传播
- D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

34、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好
- C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】：C

35、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】——

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】：A

36、术前皮肤消毒应由【单选题】——

- A. 巡回护士完成

- B. 未洗手的手术医生完成
- C.

手术护士完成

D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

37、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

A. 10 分钟

B. 20 分钟

C. 15 分钟

D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

38、属于低效消毒剂的是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：C

39、患者出院后,需将其用过的被褥在阳光下曝晒 6 小时,可达到哪种效果【单选题】——

A. 隔离

B. 清洁

C. 灭菌

D. 灭虱 消毒

【答案】：E

40、为节省时间,护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡

B. 车下层放盆,内盛消毒液

C. 按床号依次给患者服药

D. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯 将备好的药及水壶放

在治疗车上

【答案】：C

41、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】： B

42、手术间通常保持的湿度【单选题】——

- A. 40~60%
- B. 30~50%
- C. 30~40%
- D. 50~60% 40~50%

【答案】： D

43、低效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： C

44、传染科病房属于【单选题】——

- A. I 类地区
- B. II 类地区
- C. III 类地区
- D. IV 类地区 非分类地区

【答案】： D

45、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

46、伤寒病人应采取【单选题】——

A. 严密隔离

B. 接触隔离

C. 保护性隔离

D. 消化道隔离 呼吸道隔离

【答案】：D

47、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

A. 协助患者直接卧于平车上

B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上

C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单

D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

48、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——

A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性

B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性

C. 手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介

D. 手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中传播 戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

49、属于高度危险性物品的是【单选题】——

A. 手术器械和用品

B. 体温表

C. 呼吸机管道

D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

50、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医院填报病例
- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中
找查病例

【答案】：C

51、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者
- B. 血液制品
- C. 食品
- D. 动物 各种病人

【答案】：E

52、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手 护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

53、根据我国卫生标准回答以下问题:接触皮肤的医疗用品【单选题】

——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

细菌菌落总数应 ≤ 300 cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】：C

54、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

55、《医院感染管理规范》对抗菌药物合理使用的要求中哪一项错误

【单选题】——

- A. 提高细菌培养的送检率。促进抗菌药物合理使用水平
- B. 医院应安排抗感染专家或有经验医师负责医院抗感染药物使用的指导、咨询工作
- C. 检验科和药剂科分别负责定期公布医院主要病原菌及其药敏试验结果
- D. 有条件的医院应开展抗感染药物临床应用的监测 医院抗菌药物使用率力争控制在60%以下

【答案】：E

56、洗手的指征中哪一项不合理【单选题】——

- A. 新生儿室入室常规规定应彻底洗手
- B. 接触污物前、后应洗手
- C. 侵入性操作前、后应洗手
- D. 接触病人后应洗手 脱手套后需洗手

【答案】：B

57、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C.

磺胺嘧啶

D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】： B

58、目前引起下呼吸道感染最主要的病原体是【单选题】——

A. 铜绿假单胞菌

B. 链球菌

C. 表皮葡萄球菌

D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】： A

59、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

A. 10m

B. 2m

C. 1m

D. 5m 15m

【答案】： B

60、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于 6 学时

B. 常规器械消毒合格率应达 100%

C. 当证实有医院感染爆发时医院应于 48 小时内报告当地卫生部门

D. 医院抗生素使用率力争小于 50% 一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】： C

61、医院感染的含义是【单选题】——

A. 所有发生在医院内的细菌感染

B. 因医疗器械消毒不严造成的感染

C. 病人在住院期间发生的感染

D.

病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

62、注射室属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：C

63、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C. 汗液
- D. 排泄物 分泌物

【答案】：C

64、供应室无菌区【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

65、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500张病床的医院, 一类切口手术部位感染率应低于0.5%
- B. 100~500张病床的医院, 医院感染发病率应低于8%
- C. 500张病床以上的医院, 医院感染发病率应低于10%
- D. 100张病床以下的医院, 一类切口手术部位感染率应低于2%

100 张病床以下的医院, 医院感染发病率应低于 7%

【答案】：D

66、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A. 5m²
- B. 4m²
- C. 3m²
- D. 2m² 1m²

【答案】：C

67、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

- A. 患者洗涤间
- B. 病区化验室
- C. 病室及厕所
- D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

68、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B. 收到标本后及时检查
- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费, 在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

69、使用无菌持物钳的方法哪项是错误的【单选题】——

- A. 使用时钳端朝下, 不得反转向下
- B. 到远处夹取物品后立即放回原处
- C. 每一容器只能放一把钳子
- D. 取、放钳时钳端须闭合 不可夹取油纱布

【答案】：B

70、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】： C

71、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

72、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A. 隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室
- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C. 接触每个患者及其污染物后,必须洗手
- D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】： A

73、病室内住有百日咳病人,已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

- A. 7ml
- B. 6ml
- C. 12ml
- D. 15ml 5ml

【答案】： A

74、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

75、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

76、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

77、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84 消毒液
- C. 2%戊二醛
- D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】：C

78、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 讲究个人卫生
- B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
- C.

在通风不好或人群密集的场所戴口罩

D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】：E

79、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

A. 乙醇

B. 甲醛

C. 苯扎溴铵

D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

80、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

A. 4h

B. 6h

C. 8h

D. 5h 7h

【答案】：A

81、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

82、生活垃圾为【单选题】——

A. 使用过的注射针头

B. 带血的敷料

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

83、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

【答案】: E

84、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】——

- A. 煮沸消毒灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡法
- C. 燃烧灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】: C

85、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】: E

86、下述监测不合格的有【单选题】——

- A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$
- B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性,噬试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】: D

87、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

- A. 与上次住院有关的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染
- D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】： B

88、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】： D

89、护理传染病病人,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

- A. 手掌.腕部.手指.指甲.指缝.手背
- B. 腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲
- C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌
- D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】： E

90、对预防传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩
- B. 勤洗手
- C. 讲究个人卫生
- D. 注射丙种球蛋白 不接触传染性非典型肺炎病人或临床诊断病人

【答案】： D

91、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】：E

92、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是：【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磺胺嘧啶
- C. 氨苄青霉素
- D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：C

93、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

- A. 对于有感染指征的来访者，一律谢绝探视
- B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士
- C. 对于有感染指征的患者，应尽量控制和减少探视
- D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育，保护探视者不受感染

【答案】：C

94、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——

- A. 凡是高度危险的物品，必须选用灭菌法
- B. 凡中度危险性物品，一般情况下达到消毒即可
- C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同，部分内窥镜必须达到高效消毒
- D. 凡低度危险性物品，一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】：E

95、用紫外线消毒空气的错误方法是【单选题】——

- A.

时间为 30~60 分钟

- B. 有效距离在 2m 内
- C. 每 10m² 安装 30W 紫外线灯管一支
- D. 消毒时间为 20~30 分钟 从灯亮 5~7 分钟后开始计时

【答案】： D

96、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用 500×10⁻⁶ 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟 磷
苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】： B

97、高效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： B

98、根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建,提出建设性意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： C

99、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

- A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面
- B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内

- C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用
- D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开

无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

100、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

- A. 环氧乙烷
- B. 70%乙醇溶液
- C. 0.2%过氧乙酸溶液
- D. 2%戊二醛溶液 0.5%碘伏

【答案】：D

101、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 络合碘
- C. 苯扎溴铵
- D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

102、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

103、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

- A. 消毒温度为 65~75℃,作用时间 10~15min
- B. 消毒温度为 70~80℃,作用时间 5~8min
- C. 消毒温度为 45~55℃,作用时间 20~25min
- D. 消毒温度为 85~95℃,作用时间 10~15min 消毒温度为 62℃,作用时间 30min

【答案】：E

104、医疗废物为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

105、测定压力蒸汽灭菌效果的指示菌是【单选题】——

- A. 白色念珠菌(ATCC10231)
- B. 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)
- C. 大肠杆菌(ATCC8099)
- D. 枯草杆菌黑色变种(ATCC9372) 嗜热脂肪杆菌芽胞(ATCC9753)

【答案】：E

106、自身感染【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

107、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】：B

108、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

- A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药
- B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯
- D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】： A

109、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm²
- B. 100uw/cm²
- C. 80uw/cm²
- D. 90uw/cm² 110uw/cm²

【答案】： D

110、医院感染监测系统必须符合的标准不正确的是【单选题】——

- A. 将成本和工作量减到最低程度,通过及时反馈促进各科室参与监测
- B. 灵活,按条件允许适时改变
- C. 易于接受
- D. 采用统一的诊断标准和监测方法 普遍适应

【答案】： E

111、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】： A

112、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B.

工作人员定期体检,加强个人防护

C. 透析器、管道应专人专用

D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析 急诊病人
不需固定透析机

【答案】：E

113、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

A. 部分医院感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院感染的重要措施

C. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 滥用抗感染药
物可致二重感染

【答案】：C

114、手术室的医院感染管理错误的是【单选题】——

A. 手术器具及物品能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭
菌

B. 洗手刷应一用一灭菌

C. 隔离手术间应远离手术室入口处

D. 隔离病人手术术后器械及物品双消毒 手术室必须湿式清洁

【答案】：C

115、根据我国卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家
提供咨询意见的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

116、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

A. 走廊

B. 洗漱室

C.

配餐室

D. 化验室 浴室

【答案】：C

117、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

A. 48h

B. 36h

C. 24h

D. 12h 6h

【答案】：C

118、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

119、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

A. 只能在休息日探视

B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出

C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋

D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

120、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

A. 乙型肝炎病毒

B. 甲型肝炎病毒

C. 戊型肝炎病毒

D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

121、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

122、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,下述描述中错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

123、医院内感染主要发生在【单选题】——

- A. 门诊、急诊病人
- B. 探视者
- C. 医务人员
- D. 住院病人 陪护人员

【答案】：D

124、低效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

125、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

- A.

放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理

- B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】： A

126、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用 拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】： A

127、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： E

128、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要,主要是指对所有患者均实施【单选题】——

- A. 基础预防
- B. 标准预防
- C. 接触隔离

D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】： B

129、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

130、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：D

131、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和治疗措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

132、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/728121126134006066>