

腹腔积液的定义

腹腔积液是指由于各种病理原因导致体液在腹腔内异常积聚的临床症候。它是许多疾病的表现,可反映着病变的严重程度和预后。准确认识腹腔积液的定义有助于对症治疗,改善预后。

sa

by s s

腹腔积液的常见原因



肝硬化性腹腔积液

肝硬化是最常见的导致腹腔积液的原因, 由于肝功能障碍导致门脉压力升高, 引起液体渗出到腹腔。



恶性肿瘤性腹腔积液

恶性肿瘤如肝癌、卵巢癌等, 常引起肿瘤细胞侵犯性渗出和淋巴循环障碍, 导致腹腔积液。



感染性腹腔积液

细菌、真菌、结核等引起的腹膜炎可造成渗出物积聚在腹腔, 形成感染性腹腔积液。



创伤性腹腔积液

外伤引起肝脾破裂或肠道穿孔, 导致腹膜刺激和渗出物积聚, 也会出现创伤性腹腔积液。

肝硬化性腹腔积液

1

门脉压力升高

肝硬化导致肝功能障碍，引起门脉压力增高，使得液体从肝脏和肠道渗出到腹腔。

2

低蛋白血症

肝硬化患者常伴有低蛋白血症，使血浆胶体渗透压降低，促进液体从血管渗出。

3

淋巴回流障碍

肝硬化可引起腹膜淋巴回流障碍，使淋巴液无法顺利吸收，也会导致腹腔积液。

恶性肿瘤性腹腔积液



肿瘤侵犯

恶性肿瘤如肝癌、胃癌、卵巢癌等常直接侵犯腹膜, 导致肿瘤细胞渗出和淋巴回流障碍, 引发腹腔积液。



淋巴阻塞

恶性肿瘤还可以压迫导致淋巴管阻塞, 使淋巴液无法正常回流而堆积在腹腔内。



蛋白丢失

肿瘤细胞的代谢产物和溶解物质也会导致血浆胶体渗透压降低, 促进液体渗出。

感染性腹腔积液

细菌感染

细菌如大肠杆菌、肺炎球菌等经过肠壁或其他途径进入腹腔,引起化脓性腹膜炎,导致渗出性腹腔积液。

真菌感染

免疫低下患者容易发生真菌感染,如肺炎等引起的真菌性腹膜炎也会导致腹腔积液。

结核感染

结核分枝杆菌感染腹膜后形成结核性腹膜炎,可引起肉芽肿性渗出液积聚在腹腔内。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735202011330011241>