

# 2022 年河南省郑州市成考专升本医学综合 自考真题(含答案)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(100 题)

1.前庭蜗器包括 ( )

- A. 骨半规管、前庭和耳蜗
- B. 鼓室、乳突小房和咽鼓管
- C. 外耳道、鼓膜、咽鼓管
- D. 外耳、中耳和内耳
- E. 外耳、鼓室和内耳

2. 维持躯体姿势的最基本的反射是

- A.屈肌反射 B.对侧伸肌反射 C.腱反射 D.肌紧张反射 E.翻正反射

3.外科患者最常见的脱水类型是 【】

- A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

4. 女性正常排卵的黃体 ( )

- A.分泌孕酮 B.分泌雌激素 C.分泌黃体生成素 D.分泌孕酮及雌激素 E.分泌孕酮、雌激素和黃体生成素

5.属于特殊躯体感觉核的是 【】

A.蜗神经核 B.孤束核 C.三叉神经脑桥核 D.疑核 E.副神经核

6.胸骨左缘第2肋间听到3级收缩期杂音伴P2亢时，应诊断为

( )

A.A. 动脉导管未闭 B. 房间隔缺损 C. 先天性肺动脉瓣狭窄 D. 功能性杂音 E. 见于健康青少年

7. 关于直肠壶腹的正确叙述是 ( )

A.直肠位于盆膈以上的部分 B.直肠盆部下段膨大的部分 C.直肠下端无腹膜覆盖的部分 D.以上都对 E.以上都错

8.肾的被膜由内向外依次为 ( )

- A. 脂肪囊、肾筋膜、纤维囊
- B. 脂肪囊、纤维囊、肾筋膜
- C. 肾筋膜、纤维囊、脂肪囊
- D. 纤维囊、脂肪囊、肾筋膜
- E. 肾筋膜、脂肪囊、纤维囊

9.非溶血性发热反应症状出现后，要立即( )。

A.减慢输血速度 B.给予阿司匹林 C.给予苯海拉明 D.给予异丙嗪 E.给予广谱抗生素

10. 急性心肌梗塞病人多长时间内不施行择期手术

- A.2个月内 B.3个月内 C.4个月内 D.5个月内 E.6个月内

11. 下列有关脉压减小的叙述正确的是

- A.系指脉压≤30mmHg B.为上下肢血压差异常所致 C.常伴有交替脉 D.主要见于主动脉瓣狭窄 E.也可见于动静脉瘘

12.下列选项中，不属于个人史内容的是

- A.A.受教育程度  
B.业余爱好  
C.社会关系  
D.经济状况  
E.工作经历

13.支配眼轮匝肌的神经是（ ）

- A.A. 动眼神经 B. 滑车神经 C. 展神经 D. 面神经 E. 眼神经

14.白细胞分类中，淋巴细胞的百分比为（ ）

- A.A. 10% ~ 30% B. 20% ~ 40% C. 30% ~ 50% D. 10% E. 25%

15. 下列脑复苏的处理中，错误的是( )

A.脱水 B.降温 C.应用激素 D.脑电图监测 E.输血

16. 脑桥内与脑神经相关的核团是 ( )

A.脑桥核 B.楔束核 C.上泌涎核 D.下泌涎核 E.下橄榄核

17.急性肾衰无尿或少尿早期，发生水中毒的常见原因是 ( )。

A.低蛋白血症 B.内生水过多 C.抗利尿激素增加 D.钠潴留 E.不适当输入水分过多

18. 恶性肿瘤的诊断中，准确性最高的是( )

A.症状与体征 B.肿瘤标志物检查 C.X 线检查 D.磁共振成像检查 E.病理检查

19.关于水肿，下列说法不正确的是 ( )

A.心源性水肿常从身体的低位开始  
B.肾源性水肿常发展迅速  
C.肾源性水肿常伴高血压  
D.肝源性水肿常以腹水为主要表现  
E.甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿

20.诊断 ARDS 除呼吸困难、口唇发绀外，呼吸频率应为 ( )

A.> ; 20 次 / min

B.> ; 25 次 / min

C.> ; 30 次 / min

D.> ; 35 次 / min

E.> ; 40 次 / min

21. 结肠镜检查的禁忌证是 【 】

A. 急性腹膜炎 B. 排便习惯改变 C. 间断性血便 D. 结肠肿瘤术后 E. 炎症性肠病

22. 根据以下选项，回答下列各题：

- A . 近曲小管
- B . 髓袢降支细段
- C . 髓袢升支粗段
- D . 远曲小管
- E . 集合管

肾小球滤液中的氨基酸被重吸收的部位是 ( )

23. 中性粒细胞核右移可见于( )

A. 巨幼红细胞性贫血 B. 溶血性贫血 C. 缺铁性贫血 D. 失血性贫血 E. 再生障碍性贫血

24. 健康成年男性静息状态下每搏量约为 ( )

A. 40mL B. 50mL C. 70mL D. 100mL E. 110mL

25. 前庭蜗器包括

A.外耳、中耳和内耳 B.外耳道、中耳和内耳道 C.鼓室、乳突小房和咽  
鼓管 D.骨迷路和膜迷路 E.半规管、前庭和耳蜗

26. 上下肢血压差与正常人显著不同的情况可见于()

A.主动脉瓣关闭不全 B.升主动脉扩张 C.主动脉瓣狭窄 D.腹主动脉狭  
窄 E.胸主动脉瘤

27.当心脏处于全心舒张期时()

A.心室达到最大充盈  
B.房室瓣关闭  
C.心室容积不变  
D.动脉瓣关闭  
E.心室内压略高于心房内压

28.阑尾动脉发自 【】

A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动  
脉

29. 说明疾病本质的诊断是

A.病理形态诊断 B.病因诊断 C.病理生理诊断 D.专家诊断 E.排除诊断

30.产生收缩中、晚期喀喇音可见于()

A.房间隔缺损  
B.动脉导管未闭

C.轻中度单纯性肺脉瓣狭窄

D.特发性二尖瓣脱垂

E.以上都不对

31.50 kg 体重的正常人的体液与血量分别为( )。

A.50 L 与 3 . 5 L B.30 L 与 3 . 5 ~ 4 L C.20 L 与 4 L D.30 L 与 2 . 5 L E.20 L 与 2 . 5 L

32.金黄色葡萄球菌感染脓液的特点是( )。

A.脓液稀薄，淡红色 B.脓液稠厚，黄色，不臭 C.脓液稠厚，恶臭 D.脓液淡绿色，甜腥臭 E.脓液特殊的恶臭

33.关于干性啰音，下列叙述中不正确的是( )。

A.在呼气时较多而明显 B.在吸气时较多而明显 C.啰音的性质易改变 D.啰音的数量和部位也易改变 E.以上都不正确

34.神经—肌接头处兴奋传递的化学介质是【】

A.乙酰胆碱 B.去甲肾上腺素 C.多巴胺 D.甘氨酸 E.谷氨酸

35. 第二心音反常分裂，最常见于

A.完全性右束支传导阻滞 B.二尖瓣狭窄 C.完全性左束支传导阻滞 D.肺动脉高压 E.低血压

36. 尺神经支配的肌为

- A. 肱三头肌 B. 肱桡肌 C. 尺侧腕屈肌 D. 指浅屈肌 E. 肱二头肌

37. CO 中毒所引起的缺氧比贫血引起的同等程度 Hb 减少所致的缺氧更为严重，这是因为 【】

- A. 动脉血  $\text{PO}_2$  降低
- B. 血氧容量降低
- C. 血氧含量升高
- D.  $\text{HbO}_2$  的  $\text{O}_2$  释放减少
- E. 氧离曲线右移

38. 最常引起完全无尿的是 ( )

- A. 肾前性肾衰 B. 肾性肾衰 C. 肾后性肾衰 D. 大出血、休克 E. 广泛烧伤

39. B 型血的人红细胞膜上和血清中分别含( )。

- A. A 凝集原和抗 A、抗 B 凝集素 B. B 凝集原和抗 B 凝集素 C. A 凝集原和抗 B 凝集素 D. B 凝集原和抗 A 凝集素

40. 与婴儿神经系统发育密切相关的激素是

- A. 生长素 B. ACTH C. 甲状腺素 D. 胰岛素 E. 催乳素

41. 在 40% 的环境中，机体散热的方式是

- A. 辐射 B. 传导 C. 对流 D. 蒸发 E. 扩散

42.阻塞性或肝细胞性黃疸( )。

- A.尿镜检红细胞满视野
- B.尿镜检白细胞满视野
- C.尿外观正常，镜检可见各种管型
- D.尿外观酱油色，隐血试验( + )
- E.尿外观深黄色，含大量胆红素

43. 成年男性体重 60kg，正常情况下总体液的重量是

- A.18kg
- B.24kg
- C.30kg
- D.36kg
- E.42kg

44. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是( )

- A.0.48
- B.0.58
- C.0.64
- D.0.84
- E.0.94

45.下面哪种血尿应首先考慮上尿路结石( )。

- A.无痛性血尿
- B.终末血尿
- C.活动性血尿
- D.初期血尿

46.颅内压增高的临床表现，下列不正确的是( )。

- A.婴幼儿颅内压增高时，头痛都很严重，且多在早期出现
- B.头痛呈阵发性加重
- C.后期多出现视力障碍
- D.某些病人可以始终不出现“三主征”

47. 绒球小结叶属于

- A.前庭小脑
- B.大脑小脑
- C.旧小脑
- D.新小脑
- E.脊髓小脑

48. 肝脏扩张性搏动常见于

- A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

49.临床用简便方法测定能量代谢率必须取得的数据是【】

- A.食物的热价 B.食物的氧热价 C.非蛋白呼吸商 D.一定时间内的耗氧量 E.一定时间内需要二氧化碳的量

50.关于恶性肿瘤手术切除，下列选项正确的是（）

- A.根治性手术是指将恶性肿瘤彻底切除
- B.前列腺癌不能行睾丸切除
- C.姑息性手术是指有远处转移者，原发肿瘤较易切除，转移病变术后用放疗、化疗
- D.有远处转移的肿瘤宜作根治性手术
- E.乳腺癌患者，部分行卵巢切除

51.寄生虫感染多有（）。

- A.嗜酸性粒细胞增多 B.淋巴细胞增多 C.中性粒细胞增多 D.嗜碱性粒细胞增多 E.红细胞增多

52.急性肾衰竭时，肾功能指标中哪项最不可能出现

- A.尿钠 196 mmol / 24 h
- B.尿中尿素值 170 mmol / 24 h

- C. 尿渗透压  $450 \text{ mmol/L}$
- D. 血、尿肌酐比率小于  $20:1$
- E. 血尿素氮每日升高  $4.5 \text{ mmol/L}$

53. 胃的容受性舒张是通过下列哪种途径实现的（ ）
- A. 交感神经
  - B. 迷走神经末梢释放乙酰胆碱
  - C. 迷走神经末梢释放的血管活性肠肽
  - D. 壁内神经释放的生长抑素
  - E. 肠——胃反射

54. 在中脑上、下叠体之间切断脑于的动物将出现（ ）。
- A. 肢体麻痹
  - B. 去大脑僵直
  - C. 脊休克
  - D. 腱反射加强
  - E. 动作不精确

55. 寄生虫感染多有 【 】
- A. 嗜酸性粒细胞增多
  - B. 淋巴细胞增多
  - C. 中性粒细胞增多
  - D. 嗜碱性粒细胞增多
  - E. 红细胞增多

56. 舌的神经支配（ ）
- A. 舌的味觉由舌神经和舌咽神经传导
  - B. 舌神经管理舌前  $2/3$  的一般黏膜感觉
  - C. 舌肌的运动由舌神经控制
  - D. 舌咽神经管理舌前  $2/3$  的味觉
  - E. 舌的一般感觉由面神经和舌咽神经共同管理

57. 膀胱三角的描述错误的是

- A.位于膀胱底部
- B.位于两侧输尿管口和尿道内门之间
- C.膀胱充盈或空虚时，该区黏膜都有皱襞
- D.是膀胱疾病的好发部位
- E.两侧输尿管口之间有输尿管间襞

58. 男性，34岁，晚餐后出现剧烈腹痛，6小时后来医院就诊。经检查

诊为消化道穿孔、急性腹膜炎。该患者最不可能出现的体征是（）

- A.板状腹
- B.肝浊音界缩小
- C.腹部反跳痛阳性
- D.移动性浊音阳性
- E.肠鸣音亢进

59.复苏的主要目的是（）

- A.迅速恢复脑的血液循环
- B.恢复自主呼吸
- C.减轻酸中毒
- D.保护肾功能
- E.使心脏迅速恢复跳动

60.对肺的非弹性阻力叙述，错误的是

- A.它主要是呼吸道阻力
- B.它与气道半径的2次方成反比
- C.它增大时，可出现呼吸困难
- D.它与气体流速呈正相关
- E.上呼吸道是产生呼吸道阻力的主要部位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735223210222011110>