

神经内科考试题 1

单项选择题

1. 假性肥大型 (Duchenne) 肌营养不良下列不正确的 : (1.0)

- A、多为男性儿童
- B、血清肌酸磷酸激酶正常 P183 血清 CK 增高
- C、寿命缩短
- D、X-连锁隐性遗传
- E、肌电图呈肌原性损害

2. 55 岁男性患者 , 表情呆板 , 运动减少 , 右手不自主震颤 , 呈搓药丸状。

其临床表现还应包括以下哪项 ? (1.0)

- A、肌张力呈折刀样增强
- B、肌张力低下
- C、肌束颤动
- D、肌张力呈齿轮样增强 P160 帕金森 铅管样肌强直 齿轮样肌强直
- E、肌肉萎缩

3. 一病人体检发现角膜 K-F 环 , 此现象可见于下列哪种疾病 ? (1.0)

- A、视神经脊髓炎
- B、小舞蹈病
- C、肝豆状核变性
- D、大舞蹈病
- E、帕金森病

4. 重症肌无力常与哪一种疾病同时存在？____胸腺异常 70%为胸腺增生（ ）（1.0）

- A、甲状腺炎
- B、甲状腺功能亢进
- C、胸腺肿瘤或胸腺增生
- D、系统性红斑狼疮
- E、类风湿性关节炎

5. 重症肌无力患者，治疗过程中出现发热 39℃，呼吸急促。体检：右下肺可闻及细湿罗音。下列哪项处理是错误的？（1.0）

- A、急检血常规
- B、急查血气分析
- C、庆大霉素静点
- D、急摄胸片

E、准备气管切开器械

6. 下列的临床表现其病变应在哪一个部位,患者上肢周围性瘫痪,下肢中枢性瘫痪? (1.0)

A、脑干

B、右侧内囊

C、颈膨大 P57

D、高颈髓

E、腰膨大

7. 周期性瘫痪发病时最常见的临床表现为 (1.0)

A、对称性四肢弛缓性瘫痪

B、不对称性四肢弛缓性瘫痪

C、四肢弛缓性瘫痪+呼吸肌麻痹

D、四肢弛缓性瘫痪+眼外肌, 吞咽肌麻痹

E、痛性肌痉挛

8. 下列的临床表现其病变应在哪一个部位? 交叉性瘫痪? (1.0)

A、脑干

- B、右侧内囊
- C、颈膨大 P57
- D、高颈髓
- E、腰膨大

9. 某男性患者，32岁，在玩牌时突起头痛，伴呕吐。即来我急诊室就诊。

检查：神志清，左侧瞳孔大于右侧瞳孔，左眼处于外展位，不能内收，颈强硬，克氏征及布氏征均阳性。余神经系统检查（-）。两周后患者病情稳定，为明确病因，最好做以下哪种检查？（1.0）

- A、腰穿脑脊液检查
- B、脑电图检查
- C、头部CT扫描
- D、脑超声波检查
- E、脑血管造影

10. 中年，男性，右下肢麻木、无力2月余。体检：左下肢肌张力高，腱反射亢进。Chaddock征阳性，左脐水平以下深感觉丧失，右侧痛，温觉丧失。根据临床表现，病人属于何种综合征？（1.0）

- A、Weber综合征
- B、Foster-kennedy综合征

C、Brown-sequard 综合征

D、Horner s 综合征

E、parinaud s 综合征

11. 女性,50岁,既往有房颤病史,突然出现四肢抽搐伴意识障碍1天。

体检:呼吸减慢,双侧瞳孔不等大,拟诊脑栓塞,早期脑疝。患者最宜选择何种治疗方法?(1.0)

A、颈内动脉内膜剥离术

B、脱水,降颅压

C、加强肢体功能锻炼

D、止血药物

E、腰穿

12. 男性,50岁。下棋时突感头痛,视物成双,颈部僵硬,头CT示脑池内高密度影。(1.0)

A、蛛网膜下腔出血

B、基底节区出血

C、中脑出血

D、桥脑出血

E、小脑出血

13. 50 岁，男性患者因表情呆板，动作缓慢，右手不自主震颤，长期服用左旋多巴中出现病情反复，时轻时重，最应该采取的措施是_____ P164 症状波动 增加每日服药次数或增加每次服药剂量（1.0）

- A、降低药物剂量
- B、加用泰必利
- C、药剂更加分散服用
- D、加用维生素 B
- E、加用安定

14. 30 岁男患，晨起时发现四肢无力，不能行走。查体：颅神经正常，四肢对称性弛缓性瘫痪，无感觉障碍，二头肌，三头肌及膝反射消失，为明确诊断，最重要的实验室检查是（1.0）

- A、测空腹血糖
- B、做头部 CT 扫描
- C、查脑脊液
- D、测血钾
- E、脑电图描记

15. 脑底动脉环在脑循环中起非常重要的作用，能沟通脑前、后、左、右的血液供应，下列哪条动脉不参与脑底动脉环的组成：_____ P81 (1.0)

- A、大脑前动脉
- B、前交通动脉
- C、颈内动脉
- D、大脑后动脉
- E、椎动脉

16. 双眼失明，瞳孔直接和间接对光反射均存在，眼底正常，视野无法检测，其病变部位应在() (1.0)

- A、视神经
- B、视束
- C、视交叉
- D、枕叶 枕叶视觉中枢受损引起偏盲，瞳孔对光反射中枢在中脑上丘 E-W核
- E、颞叶

17. 66岁男性，行动迟缓，双手上肢抖动6年，体检：瞬目动作减少，双上肢静止震颤，慌张步态，可用下列药物治疗，除了哪项 (1.0)

- A、抗胆碱能药物--安坦

- B、金刚烷胺
- C、左旋多巴或美多巴
- D、多巴胺能受体激动剂--溴隐亭
- E、吩噻嗪类药物--冬眠灵

18. 治疗三叉神经痛的首选药物是 () (1.0)

- A、苯妥英钠
- B、安定
- C、卡马西平
- D、阿斯匹林
- E、维生素 B

19. 交叉性瘫痪的病变部位在 (1.0)

- A、大脑
- B、脑干
- C、颈髓
- D、胸髓
- E、前角

20. 男性，55 岁教师。讲课时突然昏倒在讲台，呼之不应急送医院。体检：昏迷，左侧瞳孔 5mm，右侧瞳孔 3mm，右侧肢体无力，呼吸深慢，血压 26/10kPa，下列哪项处理不妥？_____（1.0）

- A、20%甘露醇静脉滴注
- B、保持呼吸道通畅
- C、为明确诊断，立刻行腰穿检查
- D、调整血压
- E、观察生命体征

21. 蛛网膜下腔出血最常见的原因是（1.0）

- A、脑血管畸形
- B、高血压
- C、先天性颅内动脉瘤 P100
- D、脑动脉炎
- E、血液病

22. 患者，男性，14 岁，频繁发作意识丧失，四肢抽搐四小时来诊。过去三年中有反复意识丧失，肢体抽搐史。此病人首选治疗是（1.0）

- A、安定肌注
- B、安定静注

C、苯妥因钠肌注

D、鲁米那肌注

E、副醛灌肠

23. 重症肌无力胆碱能危象除维持呼吸外最合理的处理措施是()(1.0)

A、增加肌注新斯的明

B、加用阿托品

C、停用抗胆碱酯酶剂

D、停用抗胆碱酯酶剂加用阿托品

E、做 Tensilon 试验

24. 女性，36岁，昨日晨起感右眼闭合不全，口角左歪，进食滞留在右颊部，今日感右耳部疼痛，查见右侧周围性面瘫征，右舌前2/3味觉丧失，右侧外耳道小疱疹，触及疼痛，该病变部位最可能在 (1.0)

A、脑干

B、右侧内听道

C、右侧膝状神经节 P51 膝状神经节带状疱疹病毒感染 Hunt 综合征

D、右面神经管内

E、右侧茎乳突孔内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736034014112010043>