

急诊医学模拟试题与答案

1、以下关于重症肌无力治疗方案错误的是()。

- A、 胸腺切除
- B、 抗胆碱酯酶药
- C、 白蛋白
- D、 皮质类固醇
- E、 免疫抑制剂

答案：C

2、男性, 38岁, 曾行射频消融房性心动过速治疗, 术后6天, 患者出现间断性左胸部疼痛, 24小时前再次发作, 并出现呼吸困难。呼吸频率30次/min, 血氧分压62mmHg, 体检无异常发现, ECG和X线胸片无明显异常。下一步最佳检查是()。

- A、 超声心动图
- B、 Holter
- C、 运动试验
- D、 肺通气灌注扫描
- E、 冠状动脉造影

答案：D

3、女, 18岁。因鼻出血、皮肤紫癜入院。查体: 肝脾不大。血常规: PLT $24 \times 10^9/L$, 怀疑为特发性血小板减少性紫癜。该患者以下检查最可能正常的是()。

- A、 出血时间
- B、 凝血时间
- C、 血小板平均寿命
- D、 毛细血管脆性试验
- E、 血小板相关免疫球蛋白

答案：B

4、不稳定型心绞痛治疗最重要的措施是()。

- A、 溶栓治疗
- B、 抗凝、抗血小板聚集
- C、 静脉泵入硝酸甘油
- D、 止痛
- E、 抗心力衰竭治疗

答案：B

5、关于癫痫的治疗原则错误的是()。

- A、 联合用药原则
- B、 个体化用药原则
- C、 长期用药原则
- D、 停药应遵循缓慢和逐渐减量的原则
- E、 增药可适当的快, 减药一定要慢

答案: A

6、 老年患者, 突发剧烈胸痛 2 小时入院, 诊断为急性前壁心肌梗死。溶栓后出现非阵发性室性心动过速。此时针对室速, 应采取的措施为()。

- A、 严密观察
- B、 胺碘酮静注
- C、 维拉帕米静注
- D、 利多卡因静注
- E、 异丙肾上腺素静滴

答案: A

7、 患者, 男性, 45 岁, 快速行走后胸痛发作, 休息缓解。运动平板阳性, 冠状动脉造影示前降支中段心肌桥。下列哪项不正确?()

- A、 β 受体阻滞剂可明显减轻症状, 甚至预防猝死
- B、 可以手术分离受压的冠状动脉
- C、 可以有典型的劳力性胸痛
- D、 主要应用硝酸酯类药物治疗
- E、 严重病例可以考虑搭桥治疗

答案: D

8、 反映肝纤维化的血清学指标是()。

- A、 胆固醇
- B、 乳酸脱氢酶 LDH
- C、 γ -谷氨酰转肽酶 γ -GT, GGT
- D、 透明质酸 HA
- E、 胆汁酸

答案: B

9、 高渗性缺水引起体液容量的变化为()。

- A、 细胞外液与细胞内液均减少
- B、 若缺水未能纠正, 细胞外液的减少将超过细胞内液
- C、 细胞外液减少, 细胞内液正常
- D、 细胞外液正常, 细胞内液减少
- E、 血浆量减少, 而组织间液和细胞内液均正常

答案：A

10、男, 25 岁。发热咳嗽、胸痛 4 天入院, 抗感染治疗 1 周后未见明显效果, 仍咳嗽, 胸痛加重, 深呼吸时明显。查体: 体温 37.5℃, 右下肺呼吸音减弱, 语颤减弱。胸片提示: 右下肺大片状阴影, 上缘呈弧形。为明确诊断, 首选检查是()。

- A、 支气管镜
- B、 胸部 CT
- C、 痰找抗酸杆菌
- D、 PET
- E、 胸腔穿刺

答案：E

11、下面血尿应考虑为上尿路结石的是()。

- A、 终末血尿
- B、 初期血尿
- C、 活动后血尿
- D、 血尿伴血块
- E、 无痛性血尿

答案：C

12、患者男, 45 岁, 上腹痛伴恶心呕吐 12 小时, 吐后疼痛不减轻。查体: 体温 38℃, 上腹部压痛, 白细胞 $15 \times 10^9/L$, 血淀粉酶 560 索氏单位, 尿淀粉酶 256 索氏单位, 可考虑为()。

- A、 急性胰腺炎
- B、 急性胆囊炎
- C、 急性胃炎
- D、 急性肠系膜淋巴结炎
- E、 溃疡穿孔

答案：A

13、引起感染性休克最常见的致病菌是()。

- A、 革兰阳性菌
- B、 革兰阴性菌
- C、 病毒
- D、 真菌
- E、 钩端螺旋体

答案：B

14、28 岁女性, 月经规律, 末次月经 42 天后出现下腹痛, 伴肛门坠胀感, 最无诊断价值的阳性体征是()。

- A、 宫颈中度糜烂
- B、 移动性浊音+
- C、 腹部包块
- D、 宫颈举痛
- E、 子宫稍大变软

答案： A

15、 有关缺水的叙述, 下列哪项是错误的?()

- A、 高渗性缺水细胞内缺水>细胞外缺水
- B、 低渗性缺水细胞外缺水>细胞内缺水
- C、 等渗性缺水时水和钠成比例急剧丧失
- D、 高渗性缺水时缺水>缺钠
- E、 高渗性缺水时血清钠浓度>190mmol/L

答案： E

16、 28 岁经产妇, 妊娠 39 周, 今晨 5 时突然出现轻微腹痛和少量阴道流血来院。腹痛呈阵发性, 约 7~8 分钟 1 次。检查子宫无压痛区, 胎头在宫底部, 胎心率 140 次/分。血压 100/70mmHg。阴道检查宫口开大 1cm, 先露部胎臀。本例出血最可能原因是()。

- A、 前置胎盘
- B、 胎盘早剥
- C、 先兆临产
- D、 宫颈裂伤
- E、 子宫破裂

答案： C

17、 心肌梗死最常发生的部位在()。

- A、 室间隔后 1/3
- B、 左心室后壁
- C、 右心室前壁
- D、 左心室前壁
- E、 右心室后壁

答案： D

18、 术中输血几毫升后, 突然咳嗽, 面色潮红, 腹泻, 疑发生了变态反应和过敏反应, 其处理宜()。

- A、 四肢轮流扎止血带
- B、 立即停止输血、 半坐位、 吸氧
- C、 立即减慢输血速度+肌内注射异丙嗪

- D、 停止输血+口服阿司匹林
- E、 立刻终止输血并保持静脉输液畅通+抗过敏药物

答案： E

19、 以下哪项最支持慢性肾盂肾炎的诊断?()

- A、 影像学检查有局灶粗糙的肾皮质瘢痕
- B、 反复发作的尿路感染史
- C、 尿路感染反复发作伴高血压
- D、 尿路有复杂情况
- E、 以上都不对

答案： A

20、 关于中心静脉置管操作, 叙述错误的是()。

A、 在穿刺过程中如需改变进针方向, 应先将针尖撤至皮下后再改变进针方向, 以免增加损伤

B、 如需监测患者中心静脉压, 一般不采用股静脉置管

C、 对于低血容量的患者, 有时穿透静脉也未能抽到回血, 因此负压进针至一定深度后如未抽到回血就应缓慢退针, 同时注射器仍保持负压, 往往会在退针过程中抽得回血

D、 当穿刺成功, 静脉导管沿导丝进入中心静脉, 在导丝退出时为防止血液凝固阻塞导管, 应立即接上等渗液体, 并注意观察

E、 进行锁骨下或颈内静脉置管时, 患者应取仰卧、 头低位, 面部转向术者对侧, 但对重症患者不宜勉强

答案： D

21、 高渗性缺水亦称()。

- A、 原发性缺水
- B、 急性缺水
- C、 慢性缺水
- D、 继发性缺水
- E、 混合性缺水

答案： A

22、 尿崩症病人尿液比密常低于()。

- A、 1.001
- B、 1.002
- C、 1.003
- D、 1.004
- E、 1.005

答案：C

23、休克抑制期的微循环改变是()。

- A、微循环收缩期
- B、微循环扩张期
- C、微循环衰竭期
- D、直接通道开放
- E、动-静脉短路关闭

答案：B

24、细胞外液中最重要阳离子是()。

- A、Na⁺
- B、K⁺
- C、Ca²⁺
- D、Mg²⁺
- E、以上都不是

答案：A

25、关于原发性纤溶亢进症,下列说法错误的是()。

- A、PT、APTT 延长
- B、血浆硫酸鱼精蛋白副凝固试验阳性
- C、血浆纤维蛋白原含量明显降低
- D、优球蛋白溶解时间明显缩短
- E、血浆 FDP 明显增高

答案：B

26、患者,男,20岁。发热、咳嗽、水肿、肺部可闻湿啰音,胸片示右下肺炎,BUN40mmol/L,Cr1080 μmol/L,24h尿量500ml,拟行血液透析。下列哪一项不适宜做血液透析?()

- A、腹腔局灶性炎症
- B、中毒
- C、严重出血倾向
- D、MODS
- E、急性肾衰竭

答案：C

27、人体日需要NaCl为()。

- A、5.0g
- B、4.0g
- C、4.5g

D、 3.5g

E、 5.5g

答案： C

28、关于 aVL 导联的描述, 错误的是()。

A、 横位心时, QRS 波群以负向波为主

B、 左上肢接正极, 右上肢和左下肢相连接负极

C、 垂位心时, T 波可倒置

D、 P 波可直立、双向或倒置

E、 QRS 波群可呈 qR 波

答案： A

29、除哪项外, 急性胰腺炎需与下列疾病进行鉴别?()

A、 消化性溃疡急性穿孔

B、 急性阑尾炎

C、 胆石症和急性胆囊炎

D、 急性肠梗阻

E、 心肌梗死

答案： B

30、乙醇在体内的主要吸收部位是()。

A、 胃和空肠

B、 胃和回肠

C、 胃和十二指肠

D、 空肠和十二指肠

E、 回肠和十二指肠

答案： D

31、破伤风患者应用破伤风抗毒素的目的是()。

A、 抑制破伤风杆菌

B、 中和游离毒素

C、 控制和解除痉挛

D、 防治并发症

E、 减少毒素的产生

答案： B

32、下列情况除()外都能引起多尿。

A、 饮水过多或输注大量液体

B、 使用某些利尿的药物

C、 尿崩症

D、 肾结石

E、 糖尿病

答案： D

33、 肠梗阻诊断明确后, 最重要的是确定()。

A、 梗阻的原因

B、 梗阻的部位

C、 梗阻的程度

D、 梗阻的发生速度

E、 梗阻是否引起肠绞窄

答案： E

34、 急性胰腺炎时可引起胰腺实质凝固性坏死和溶血的酶是()。

A、 淀粉酶

B、 磷脂酶 C

C、 磷脂酶 A

D、 脂肪酶

E、 胰蛋白酶

答案： C

35、 急性肾损伤时, 下列哪种情况需紧急血液透析?()

A、 血尿素氮 $>20.4\text{mmol/L}$

B、 持续呕吐

C、 血钾 $>6.0\text{mmol/L}$

D、 急性肺水肿, 对利尿剂无反应

E、 动脉血气分析 $\text{pH}<7.35$

答案： D

36、 下列抗体中哪一项是 Graves 病的直接致病原因?()

A、 TSAb

B、 TSBAb

C、 TGI

D、 TPOAb

E、 TgAb

答案： A

37、 关于参与支气管哮喘的发病机制, 以下叙述正确的是()。

A、 胃食管反流与哮喘的发生无关

B、 青少年运动性哮喘与热天户外活动有关

C、 与呼吸道细菌感染相关

- D、 支气管哮喘属于单基因遗传
- E、 阿司匹林-哮喘-鼻息肉三联症的发病机制与花生四烯酸代谢有关

答案： E

38、 输注羟乙基淀粉代血浆时，下列哪项不是羟乙基淀粉代血浆的作用？()

- A、 增加血容量
- B、 维持胶体渗透压
- C、 补充细胞外液的电解质和提供碱储备
- D、 可引起急性肾功能不全
- E、 作为低血容量性休克的容量治疗及手术中扩容的常用制剂

答案： D

39、 高血压合并心肌梗死宜选用()。

- A、 哌唑嗪
- B、 氢氯噻嗪
- C、 硝苯地平
- D、 美托洛尔
- E、 呋塞米

答案： D

40、 下列哪项不符合重型胎盘早剥的临床表现？()

- A、 腹痛剧烈
- B、 产妇面色苍白
- C、 脉搏细弱
- D、 阴道出血量
- E、 有正常宫缩

答案： E

41、 21 岁女性，停经 2 个月，两天前在外自行堕胎，体温 38.8℃，脉搏 130 次/分，血压正常，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 90%，子宫如孕 2 个月大小，软，有压痛，经抗炎治疗，感染未能控制，突然大量阴道出血，下列哪项处理为宜？()

- A、 催产素肌肉注射
- B、 卵圆钳轻取胚胎，术后应用抗生素
- C、 即刻刮宫去除病灶，术后应用抗生素
- D、 抗生素及催产素
- E、 抗生素及止血治疗

答案： B

42、 应用胰岛素的最常见不良反应()。

- A、 胰岛素抗药性

- B、 胰岛素过敏
- C、 低血糖
- D、 脂肪营养不良
- E、 注射部位感染

答案： C

43、 标准 II 导联的连接方式是()。

- A、 左上肢为正极, 右上肢为负极
- B、 左上肢为负极, 左下肢为正极
- C、 右上肢为负极, 右下肢为正极
- D、 右上肢为正极, 左下肢为负极
- E、 左下肢为正极, 右上肢为负极

答案： E

44、 抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是()。

- A、 出现低钾血症
- B、 合并严重感染
- C、 出现严重心律失常
- D、 血碳酸氢根 $<5.0\text{mmol/L}$ 或血 $\text{pH}<7.1$
- E、 常规应用

答案： D

45、 低渗性缺水引起血压下降的最主要原因是()。

- A、 抗利尿激素分泌增加使细胞外液量进一步减少
- B、 低钠血症导致外周血管张力降低
- C、 细胞内液和细胞外液同时大量丢失
- D、 低钠血症导致心肌收缩力下降
- E、 细胞外液量急剧减少导致循环血量不足

答案： E

46、 关于中性粒细胞核象的叙述, 正确的是()。

- A、 指细胞核的染色致密程度
- B、 指细胞核是否处于分裂状态
- C、 指细胞核的分叶状况
- D、 指细胞核的位置
- E、 指核质比例

答案： C

47、 弥散性血管内凝血的治疗, 最根本的措施是()。

- A、 抗凝治疗

- B、及时补充凝血因子
- C、积极抗休克
- D、消除病因
- E、输血

答案：D

48、骨盆骨折伴有失血性休克,经快速补充全血效果不佳,此时应当()。

- A、立即手术止血
- B、快速补充晶体
- C、选择性血管造影、栓塞出血血管
- D、立即手术止血并固定骨折
- E、腹带压迫止血

答案：C

49、女性,28岁。3小时前因感冒服用解热镇痛药物,并出现上腹部不适,其后呕吐咖啡样物约50ml,现拟诊为急性胃炎并发上消化道出血,为了确诊,首选的检查方法为()。

- A、胃镜
- B、X线钡餐透视
- C、上腹部增强CT
- D、胃液分析
- E、剖腹探查

答案：A

50、左肾结石1.2cm,肾积水轻度,尿检有红细胞,应采取的治疗方法是()。

- A、肾盂切开取石
- B、肾镜取石
- C、药物排石治疗
- D、肾盂肾窦切开取石
- E、体外冲击波碎石

答案：E

51、关于房颤的叙述,下列哪项不正确?()

- A、心室率多在350~600次/分
- B、心室率快时可伴有脉搏短绌
- C、持久房颤易发生动脉栓塞
- D、心室搏动快而不规则
- E、第一心音常强弱不等

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736053140010010051>