

口腔颌面外科试题

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 颌骨骨折的重要治愈标准是

- A. 骨性愈合
- B. 纤维性愈合
- C. 骨折线上的牙齿不松动
- D. 恢复原有咬合关系
- E. 无感染发生

正确答案：D

2. 腭裂发生于

- A. 胚胎第3周
- B. 胚胎第6周
- C. 胚胎第7周
- D. 胚胎第8周
- E. 胚胎第9~12周

正确答案：E

3. 口腔颌面部感染中最易发生全身并发症的是

- A. 智齿冠周炎
- B. 间隙感染
- C. 化脓性颌骨骨髓炎

D. 化脓性淋巴结炎

E. 颜面部疔痈

正确答案：E

4. 上3腭侧有下列神经吻合

A. 上牙槽前神经，网收集整理神经与上牙槽中神经

B. 鼻腭神经与腭中神经

C. 腭前神经与腭中神经

D. 腭中神经与腭后神经

E. 腭前神经与鼻腭神经

正确答案：E

5. 环甲膜切开术后插管时间最长不宜超过

A. 8 小时

B. 10 小时

C. 12 小时

D. 24 小时

E. 48 小时

正确答案：E

6. 关于下颌切牙拔除描述哪项是正确的

A. 下颌切牙与上颌切牙牙根外形类似可使用旋转力

B. 下颌切牙牙根较细易折断，不可使用旋转力转自学易网

C. 下颌切牙牙根较细易折断，可稍加旋转力

D. 下颌切牙牙根较细但不易折断，故摇动力和旋转力可同时使用

E. B+D

正确答案：B

7. 上颌骨骨折 X 线检查首选

A. 华特位片

B. 铁氏位片

C. 颞顶位片

D. 许勒位片

E. 颧弓位片

正确答案：A

8. 通常不会引起张口受限的间隙感染是

A. 咬肌间隙感染

B. 翼下颌间隙感染

C. 颞下间隙感染

D. 眶下间隙感染

E. 下颌骨急性化脓性骨髓炎

正确答案：D

9. 在 X 线片上显示髁状学易，网收集整理突头部一小部分骨折，折断小骨块向前上内移位，称为

A. 一般规律类髁状突骨折

B. 髁状突内弯移位类髁状突骨折

C. 前脱帽类髁状突骨折

D. 髁状突骨折伴前脱位

E. 髁状突嵌入颅中窝

正确答案：C

10. 血压高于多少时应先治疗后拔牙

- A. 120 / 80mmHg
- B. 130 / 85mmHg
- C. 140 / 85mmHg
- D. 160 / 90mmHg
- E. 180 / 100mmHg

正确答案：E

11. 牙槽突裂的治疗以下哪项为主

- A. 唇裂整复术转自学易网
- B. 腭裂整复术
- C. 牙槽突裂修复术
- D. 正畸治疗
- E. 固定义齿修复

正确答案：C

12. 可扪及搏动感的肿瘤是

- A. 神经纤维瘤
- B. 牙龈瘤
- C. 成釉细胞瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 颈动脉体瘤

正确答案：E

13. 下列不属于拔牙禁忌证的是

- A. 频发心绞痛
- B. 充血性心功能衰竭
- C. 双束支传导阻滞者
- D. 未控制的心律不齐
- E. 8个月前发生过心肌梗死

正确答案：E

14. 下列哪种间隙感染为最常见口腔颌面部间隙感染之一

- A. 咬肌间隙感染
- B. 舌下间隙感染
- C. 咽旁间隙感染
- D. 颞下间隙感染
- E. 翼下颌间隙感染

正确答案：A

15. 以下关于良性肿瘤特点的叙述，哪项是错误的

- A. 永不威胁生命
- B. 细胞分化程度高
- C. 多呈膨胀性生长，不发生转移
- D. 有包膜，界限清，少数可恶变
- E. 肿瘤细胞与来源组织细胞相似

正确答案：A

16. 普鲁卡因安全剂量每小时不宜超过

- A. 1g
- B. 1. 5g
- C. 2g 转自学易网
- D. 2. 5g
- E. 3g

正确答案：A

17. 口腔种植学的指导理论是

- A. 骨结合理论
- B. 纤维结合理论
- C. 骨牵张理论
- D. 微创理论
- E. 骨粘连理论

正确答案：A

18. 以下关于颞下颌关节紊乱综合症的叙述哪项是错误的

- A. 好发于青壮年，是一组疾病的总称
- B. 关节内微小创伤与精神心理因素是本病的两个主要致病因素
- C. 本病有自限性，一般不会发生关节强直
- D. 三个主要临床症状是：下颌运动异常、自发痛及关节弹响和杂音
- E. 以保守治疗为主

正确答案：D

19. 局部麻醉术后麻木症状仍未恢复的可能原因是

- A. 注射区有血肿
- B. 注射区有感染
- C. 注射区有神经损伤
- D. 注射针折断
- E. 注射区有水肿

正确答案：C

20. 关于唾液腺肿瘤以下哪种说法是正确的

- A. 腮腺肿瘤 80%发生于腮腺深叶
- B. 颌下腺良性肿瘤全是混合瘤
- C. 舌下腺肿瘤良性多见
- D. 小涎腺肿瘤大部分发生于腭部
- E. 涎腺肿瘤大多数发生在小涎腺

正确答案：D

21. 下列哪种现象不是智齿冠周炎局部检查的常见表现

- A. 局部糜烂颗粒状增生似菜花状
- B. 挤压龈袋可有脓液溢出
- C. 肿胀的龈瓣覆盖低位阻生齿
- D. 严重者炎症可波及舌腭弓和咽侧壁
- E. 化脓性炎症局限后，可形成冠周脓肿

正确答案：A

22. 超声检查在口腔颌面部适用于

- A. 确定有无占位性病变
- B. 确定囊性或实性肿物
- C. 为评价肿瘤学易，网收集整理性质提供信息
- D. 确定深部肿物与邻近重要血管的关系
- E. 以上均适用

正确答案：E

23. 不适合用作牙周病影像学检查方法的是

- A. 根尖片
- B. 合翼片
- C. 下颌骨侧位片
- D. 曲面体层片
- E. 根尖片数字减影技术

正确答案：C

24. 两段式两次法种植术第1次和第2次手术间隔时间为

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 2~3个月
- D. 4~6个月
- E. 7~9个月

正确答案：D

25. 面横裂发生的原因是

- A. 下颌突未能相互融合

B. 上颌突与下颌突未能融合

C.

外侧髁突未能融合

D. 外侧髁突与内侧髁突未能融合

E. 上颌突与球状突未能融合

正确答案：B

26. 双侧上颌骨横断骨折或颅颌分离的骨折常用

A. 单颌牙弓夹板固定

B. 切开复位，骨间固定转自学易网

C. 带钩牙弓夹板颌间固定

D. 黏片颌间固定

E. 颅颌固定

正确答案：E

27. 固定桥受力时桥体弯曲程度与

A. 桥体厚度的立方成反比

B. 桥体长度的立方成正比

C. 桥体宽度成反比

D. 桥体的硬度有关

E. 以上均是

正确答案：E

28. 以下关于海绵状血管瘤的叙述哪项是错误的

- A. 表浅肿瘤呈现蓝色或紫色
- B. 扪之柔软，可被压缩
- C. 有时可扪到静脉石
- D. 扪诊有震颤感，听诊有吹风样杂音
- E. 体位移动试验阳性

正确答案：D

29. 中枢性面瘫表现为

- A. 一侧面部表情肌完全瘫痪
- B. 一侧眼裂以下表情肌瘫痪
- C. 一侧面瘫+味觉丧失
- D. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍
- E. 一侧面瘫+味觉丧失+唾液分泌障碍+听觉改变

正确答案：B

30. 下列哪种情况下不能做口腔种植术

- A. 活动义齿固位差，黏膜不学，易网收集整理能耐受，但患者患有严重的无法控制的糖尿病
- B. 口腔内急性炎症已治愈者个别牙缺失，邻牙不宜作基牙
- C. 颌骨内有肿瘤，经手术后需功能性修复者
- D. 对义齿的修复要求高，常规义齿无法满足者
- E. 磨牙游离端缺失者

正确答案：A 转自学易网

31. 用于皮肤消毒的洗必泰液浓度为

- A. 0. 1%
- B. 0. 3%
- C. 0. 4%
- D. 0. 5%
- E. 1%

正确答案：D

32. 恶性淋巴瘤的治疗应首选

- A. 手术加化疗
- B. 手术加放疗
- C. 化疗加放疗
- D. 中药治疗
- E. 热疗

正确答案：C

33. 长期吸雪茄烟和烟斗的人易发生

- A. 牙龈癌
- B. 舌癌
- C. 颊黏膜癌
- D. 腭癌
- E. 唇癌

正确答案：E

34. 脓肿切开引流操作哪项是错误的

- A. 切口的位置在脓肿的低位

- B. 切口的位置选择在愈合后瘢痕隐蔽的位置
- C. 最好选择在口内切开引流
- D. 切开至黏膜下或皮下，可钝性分离扩大创口
- E. 颜面危险三角区的脓肿切开后只能轻度挤压，以保证引流通畅

正确答案：E

35. 腭裂手术时在腭部粘骨膜下注射含肾上腺素的麻药或生理盐水的主要目的是

- A. 减少疼痛
- B. 减少出血、便于剥离
- C. 减少肿胀
- D. 防止血管损伤
- E. 以上都不是

正确答案：B

36. 下颌第三磨牙阻生，什么情况下适宜作龈瓣切除术转自学易网

- A. 水平阻生，冠周炎反复发作
- B. 垂直阻生，升支前方有足够空隙，对合牙位置正常
- C. 前倾阻生，前方邻牙远

中龋坏

- D. 前倾阻生，龈瓣上有咬痕
- E. 颊向阻生，对牙位置正常

正确答案：B

37. 易发生骨折的面骨为

- A. 颧骨
- B. 颧弓
- C. 上颌骨
- D. 下颌骨
- E. 腭骨

正确答案：D

38. 右上 23 固定义齿修复中，缺失，选择哪一种

- A. 右上 14 作基牙
- B. 右上 14 左上 1 作基牙
- C. 右上 145 左上 1 作基牙
- D. 右上 145 作基牙
- E. 以上均不宜

正确答案：C

39. 下颌骨 X 线片显示有学，易网收集整理明显的骨密质增生，骨质呈致密影像的颌骨骨髓炎是

- A. 中央性颌骨骨髓炎急性期
- B. 中央性颌骨骨髓炎慢性期
- C. 边缘性颌骨骨髓炎增生型
- D. 边缘性颌骨骨髓炎溶解破坏型
- E. 新生儿颌骨骨髓炎

正确答案：C

40. 以下哪种囊肿不属于牙源性囊肿

- A. 含牙囊肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737006201026006041>