

泌尿外科学找答案（题库版）

1、单选 良性前列腺增生的并发症中，不包括（）。

- A. 血尿
- B. 腹股沟疝
- C. 尿潴留
- D. 双肾积水
- E. 膀胱真性憩室

正确答案：E

2、单选 女性，40岁。近日出现尿频、尿急伴腰痛。查体：（江南博哥）BP150/90mmHg。双肾区无叩击痛，无水肿。下列检查首选（）。

- A. 腹部平片
- B. 泌尿系B超
- C. 中段尿培养
- D. 尿常规及尿沉渣镜检
- E. CT

正确答案：D

3、单选 急性细菌性前列腺炎的最常见致病菌是（）。

- A. 革兰阴性杆菌或假单孢菌
- B. 葡萄球菌、链球菌
- C. 淋球菌、病毒
- D. 支原体、衣原体
- E. 肺炎双球菌、真菌

正确答案：A

4、单选 下列哪项检查，一般不列为肾损伤的常规检查（）。

- A. 肾动脉造影或选择性肾动脉造影
- B. 腹部X线平片
- C. B超检查
- D. CT检查
- E. 大剂量静脉肾盂造影

正确答案：A

参考解析：

腹部 X 线平片对轻型肾损伤常无重要发现，在中型及重型肾损伤，可见伤肾影模糊不清、膈肌升高，肠袢阴影向对侧移位，腰大肌影不清晰等征象。若合并空腔脏器损伤可见膈下游离气体，若为火器伤，可了解有无金属异物。B 超检查可辨认肾结构的改变及异常体液的积聚，对肾裂伤、碎裂伤、肾周血肿、尿外渗及肾内血肿等均有肯定的诊断价值。CT 检查是目前最能正确判断肾脏损伤程度的检查方法，准确性达到 98% 以上，增强扫描可显示双侧肾脏功能，并能同时发现腹腔其他脏器损伤，有条件者应行此项检查。静脉肾盂造影的适应证：①腹部或腰部贯通伤；②肾脏闭合性损伤伴血尿及休克者。如患者无休克或休克已经纠正，应尽快实施静脉肾盂造影检查，常规造影剂量常受到肾血流量减少及肾功能受损的影响，宜采用大剂量静脉肾盂造影。肾动脉造影或选择性肾动脉造影不仅可以明确肾损伤的范围和程度，还可行选择性肾动脉栓塞以达到治疗目的，但由于操作较复杂，有一定危险性，一般不列为常规检查。

5、单选 女性，46 岁。无痛性全程肉眼血尿 7 个月。B 超检查：左肾增大，呈结节状。膀胱镜检查：左侧输尿管口喷血。最可能的诊断是（）。

- A. 肾癌
- B. 肾胚胎癌
- C. 多囊肾
- D. 肾盂癌
- E. 输尿管癌

正确答案：A

6、单选 下列急性附睾炎的临床特点，不正确的是（）。

- A. 常由泌尿系感染和前列腺炎、精囊炎扩散所致
- B. 畏寒、高热，阴囊明显肿胀、疼痛，可伴膀胱刺激症状
- C. 缺血、坏死发生率较高
- D. 可形成脓肿，可继发附睾睾丸炎、睾丸鞘膜积液
- E. 需与附睾结核、睾丸扭转鉴别

正确答案：C

7、单选 男性，30 岁。2 天前突然出现尿频、尿急、尿痛，伴有发热、全身乏力、食欲缺乏等症状。直肠指检发现前列腺增大，压痛明显，有明显波动感。血常规检查白细胞明显增高。诊断首先要考虑（）。

- A. 急性前列腺炎
- B. 急性前列腺膀胱炎
- C. 急性前列腺炎伴脓肿形成
- D. 慢性前列腺炎急性发作
- E. 急性精囊炎

正确答案：C

8、单选 男，51 岁，间断性排尿中断 6 天，腹部平片示膀胱区直径约 2.5cm 椭圆形阴影，追问病史有尿频伴排尿困难 2 年，为明确诊断应做哪项检查（）。

- A. IVP
- B. 膀胱镜
- C. 肾动脉造影
- D. CT
- E. MRI

正确答案： B

参考解析：

患者考虑膀胱结石的可能性大，膀胱镜可直接检查尿道及膀胱内病变。

9、单选 下列哪项是前列腺增生的手术指征（）。

- A. 最大尿流率为 16ml / s
- B. 残余尿量 30ml
- C. 前列腺体积超过 50g (ml)
- D. 合并反复的下尿路感染
- E. 尿动力学检查提示不稳定性膀胱

正确答案：D

10、单选 男性，28 岁。骑跨伤 8 小时，排尿困难，尿道口流血，排尿时会阴部疼痛加重。查体：尿道口有血尿外渗，尿管不能插入，阴囊明显肿大。根据患者情况，治疗宜采取（）。

- A. 行金属导尿管导尿
- B. 行尿道修补术
- C. 行尿道会师术
- D. 行耻骨上膀胱造瘘术
- E. 行尿道修补、尿外渗引流术

正确答案：E

11、单选 膀胱结石的诊断方法不包括（）。

- A. X 线平片
- B. B 超
- C. 膀胱镜
- D. 直肠指诊
- E. 肾动脉造影

正确答案：E

参考解析：X 线平片、B 超、膀胱镜、直肠指诊均为膀胱结石的诊断方法，而肾动脉造影不是膀胱结石的诊断方法。

12、单选 女性，30 岁，左腰部剧痛 3 天，尿常规示红细胞（+++），B 超提示左肾积水。肾积水的原因最可能是（）。

- A. 左肾结核
- B. 左肾肿瘤
- C. 左输尿管结石
- D. 左输尿管肿瘤
- E. 肾盂输尿管连接部狭窄

正确答案：C

参考解析：肾绞痛及镜下血尿是输尿管结石的典型临床表现。

13、单选 诊断膀胱结石，最可靠的检查方法是（）。

- A. 依据典型的尿流中断症状
- B. 双合诊检查

- C. 金属尿道探子检查
- D. 腹部平片检查
- E. 膀胱镜检查

正确答案： E

14、单选 逆行尿路造影的禁忌证是（ ）。

- A. 下尿路感染
- B. 尿频
- C. 膀胱结石
- D. 膀胱肿瘤
- E. 血尿

正确答案： A

15、单选 下列哪项不是肾损伤晚期的并发症（ ）。

- A. 尿囊肿
- B. 肾囊肿
- C. 肾盂积水
- D. 肾血管性高血压
- E. 假性肾动脉瘤

正确答案： B

16、单选 肾结核早期最常见的临床表现是（ ）。

- A. 肉眼或镜下血尿
- B. 肾区疼痛
- C. 结核中毒症状
- D. 尿路感染症状
- E. 肾盂造影有破坏病灶

正确答案： D

17、单选 男性，37岁。左肾绞痛3天，应用解痉药物后好转。排泄性尿路造影：双肾显示好，左肾轻度积水，左输尿管上段结石1.0cm×0.8cm，非手术治疗两周，结石下移1cm。目前最适宜的治疗方法是（ ）。

- A. 继续非手术治疗
- B. 肾镜取石
- C. 体外冲击波碎石
- D. 输尿管镜取石
- E. 输尿管切开取石

正确答案： C

18、单选 急性尿潴留病因中，属于非机械性梗阻的是（ ）。

- A. 尿道结石
- B. 外伤性高位截瘫
- C. 尿道断裂

- D. 尿道肿瘤
- E. 前列腺增生

正确答案：B

19、单选 尿失禁是指尿不能控制而自行排出，其分类中不包括（）。

- A. 真性尿失禁
- B. 间歇性尿失禁
- C. 压力性尿失禁
- D. 急迫性尿失禁
- E. 充溢性尿失禁

正确答案：B

20、单选 女性，58岁。尿频、尿急、尿痛、小腹痛伴终末血尿2天。尿常规：高倍镜视野下见大量红、白细胞。目前，首先要做的检查是（）。

- A. 膀胱镜检查
- B. B超检查
- C. 逆行肾盂造影
- D. 静脉肾盂造影
- E. 中段尿细菌培养加药敏测定

正确答案：E

21、单选 有关尿路结石的发病，下列说法错误的是（）。

- A. 男性多于女性
- B. 南方多于北方
- C. 我国以上尿路结石多见
- D. 膀胱结石中，原发结石多于继发结石
- E. 尿路结石的病因不明

正确答案：D

参考解析：膀胱结石中，原发结石明显少于继发结石。

22、单选 男性，25岁。尿急、尿痛伴尿道口脓性分泌物2天就诊。分泌物涂片检查发现白细胞内大量革兰阴性双球菌。诊断可明确为（）。

- A. 慢性前列腺炎
- B. 急性前列腺炎
- C. 淋菌性尿道炎
- D. 非淋菌性尿道炎
- E. 精囊炎

正确答案：C

23、单选 膀胱镜检时，膀胱结核病灶多位于（）。

- A. 膀胱侧壁
- B. 膀胱顶壁
- C. 膀胱三角

- D. 膀胱后壁
- E. 膀胱颈口

正确答案：C

24、单选 下列关于肾积水的临床特点，不正确的是（）。

- A. 肾积水合并感染时可出现全身中毒症状
- B. 长期梗阻引起的肾积水，最终会导致肾功能减退和丧失
- C. 肾积水由上尿路梗阻引起，下尿路梗阻不引起肾积水
- D. 轻度肾积水多无症状，中重度积水可引起腰部疼痛甚至出现腹部肿块
- E. 双侧肾完全梗阻可导致急性肾衰竭

正确答案：C

参考解析：下尿路梗阻，如良性前列腺增生等原因引起的梗阻也可以引起肾积水。

25、单选 关于肾结核的手术治疗原则，下列不正确的是（）。

- A. 手术前应正规抗结核治疗
- B. 有泌尿男性生殖系统以外的活动结核病灶存在，不手术
- C. 有附睾结核存在，不切除病肾
- D. 手术应尽量保留正常肾组织
- E. 手术后继续抗结核治疗

正确答案：C

26、单选 输尿管下段结石行开放手术的适应证是（）。

- A. 体外震波碎石治疗失败
- B. 结石直径超过 1cm
- C. 输尿管镜手术失败
- D. 结石嵌顿过久，肾脏重度积水
- E. 保守排石治疗失败

正确答案：C

27、单选 肾结核的原发灶多见于（）。

- A. 骨关节
- B. 淋巴结
- C. 肠道
- D. 肺
- E. 腹腔

正确答案：D

28、单选 男性，42岁，活动多时常出现右腰部钝痛。尿常规检查：红细胞 15~20 个 / 高倍视野，白细胞 3~5 个 / 高倍视野。B 超：肾盂内可见 3cm×2cm 不规则形弱强回声，其后不伴声影。为明确诊断首先选择的检查是（）。

- A. KUB 及 IVP
- B. CT 和尿培养

- C. 磁共振检查
- D. 肾动脉造影
- E. 膀胱镜检查

正确答案：A

29、单选 对诊断肾结核最有临床意义的检查是（）。

- A. KUB
- B. 肾图
- C. B超
- D. IVU
- E. 膀胱镜

正确答案：D

30、单选 临床评估肾结核病情，除全身情况外，主要依据（）。

- A. 膀胱刺激症状的程度
- B. 血尿程度
- C. 尿中是否找到结核杆菌
- D. 膀胱镜检查结果
- E. 静脉尿路造影或逆行肾盂造影结果

正确答案：E

31、单选 男性，69岁。进行性排尿困难2年就诊。直肠指诊发现前列腺左侧有一1.5cm×2cm的硬结。PSA检查为120ng/ml。核素全身骨扫描示骨盆及腰椎多处放射性浓聚区。诊断为前列腺癌骨转移。目前，最适宜的治疗是（）。

- A. 前列腺切除+放射治疗
- B. 根治性前列腺切除+盆腔淋巴结清扫
- C. 根治性前列腺切除+化学治疗
- D. 根治性前列腺切除+放射治疗
- E. 双侧睾丸切除+抗雄性激素药物+放射治疗

正确答案：E

32、单选 男性，41岁。诊断为肾癌。下列症状中，哪一项不是肾癌的肾外表现（）。

- A. 低热
- B. 血沉快、高血压
- C. 红细胞增多症、高血钙
- D. 精索静脉曲张
- E. 头痛

正确答案：E

33、单选 下列哪一种症状不属于前列腺增生引起的膀胱出口梗阻症状（）。

- A. 排尿迟缓
- B. 尿急

- C. 尿后滴沥
- D. 射程变短
- E. 尿线细而无力

正确答案：B

参考解析：前列腺增生症的临床表现有三组症状：下尿路症状（LUTS）、膀胱出口梗阻症状（BOO）和并发症的症状。尿急是下尿路症状，而其他选项都是膀胱出口梗阻症状（BOO）。

34、单选 病人长时间表现膀胱刺激症状和脓尿，应首先考虑为（）。

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾结石
- C. 输尿管结石
- D. 泌尿系结核
- E. 急性膀胱炎

正确答案：D

参考解析：长时间的表现可确定为慢性疾病，所以排除 A 和 E，而泌尿系结石的主要症状是肾绞痛和血尿，所以选 D。

35、单选 一男性患者，20 岁，反复尿频、尿急 1 年余，伴有会阴部胀痛，饮酒后症状加重，多次尿常规检查未见明显异常，B 超检查双肾、膀胱、前列腺未见异常，抗感染效果不佳。下一步应做哪项检查（）。

- A. 再行尿常规检查
- B. 前列腺液常规检查
- C. 前列腺 CT 检查
- D. 膀胱镜检查
- E. 经直肠 B 超检查

正确答案：B

参考解析：患者年轻男性尿频、尿急伴会阴部胀痛是典型的前列腺炎的症状，尿常规及 B 超均未见异常，应检查前列腺液，其他检查暂时意义不大。

36、单选 诊断前列腺增生症时应主要与下列哪些疾病相鉴别（）。

- A. 膀胱颈部挛缩
- B. 膀胱结石
- C. 膀胱憩室
- D. 输尿管结石
- E. 肾囊肿

正确答案：A

参考解析：前列腺增生症在临床上应注意与膀胱颈部挛缩、神经源性膀胱等原因引起的排尿困难相鉴别。

37、单选 男性，57岁。无痛性间歇性肉眼血尿2个月。查体：一般情况良好，腹部未扪及肿块，双肾区无叩击痛。直肠指检：前列腺增大，光滑，无结节。B超检查：双肾未见异常，膀胱内有一2cm×2.5cm实质占位。检查发现左输尿管开口外侧有一2.5cm包块，呈乳头状，蒂长0.5cm。活检病理报告为移行上皮细胞癌。手术治疗宜采取（）。

- A. 全膀胱切除，回肠代膀胱术
- B. 膀胱部分切除术
- C. 经尿道膀胱肿瘤切除或膀胱切开肿瘤切除
- D. 膀胱灌注抗癌药和BCG
- E. 先行放射治疗，后再行膀胱部分切除

正确答案：C

38、单选 急性尿潴留的病因不包括（）。

- A. 前列腺增生症
- B. 膀胱结石
- C. 会阴部手术后
- D. 大量饮水并应用利尿剂
- E. 前列腺增生症患者服用平喘药后

正确答案：D

39、单选 男，50岁，右肾下极多发结石，左输尿管上段结石直径1.5cm。IVP示右肾下极重度积水，左肾中度积水。平时无症状，血BUN、CREA均正常。治疗应采用（）。

- A. 左输尿管切开取石术
- B. 右肾实质切开取石术
- C. 右肾盂切开取石术
- D. 右肾部分切除术
- E. 左肾造瘘术

正确答案：A

40、单选 女性，55岁。每咳嗽、大笑时有尿液自尿道流出而不能控制2年，逐渐加重4个月。既往有多次生育史。其尿失禁属于（）。

- A. 充溢性尿失禁
- B. 急迫性尿失禁
- C. 压力性尿失禁
- D. 真性尿失禁
- E. 混合性尿失禁

正确答案：C

41、单选 女性，57岁。无痛性血尿4个月。体格检查无阳性体征。B超检查：右肾轻度积水，尿脱落细胞检查3次，未发现癌细胞。根据患者情况，目前首先要做的检查是（）。

- A. B 超检查和 X 线胸片检查
- B. 尿路 X 线平片和排泄性尿路造影

- C. 膀胱镜检查
- D. 膀胱造影
- E. 重复尿细胞学检查

正确答案： B

42、单选 男性，30岁。突发高热寒战，会阴部疼痛，排尿痛，尿道有炎性分泌物。肛诊前列腺肿胀、压痛、局部温度升高。首先应考虑（）。

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性前列腺炎
- C. 淋菌性尿道炎
- D. 非淋菌性尿道炎
- E. 急性肾盂肾炎

正确答案： B

43、单选 血尿者如发现有条状的血块，提示血尿来源于（）。

- A. 输尿管及其以上部位
- B. 尿道及其以上部位
- C. 膀胱颈及其以上部位
- D. 尿道前列腺部
- E. 精囊腺

正确答案： A

44、单选 男性，31岁。发现左侧阴囊软性肿块2年，平时无不适，卧位不消失。结婚4年未育。查体：左侧阴囊明显松弛下垂，似蚯蚓团块状物清晰可见，触之柔软，透光试验（-）。检查精液常规提示弱精症。如果选择手术治疗，最常见的并发症是（）。

- A. 切口感染
- B. 睾丸扭转
- C. 损伤精索动脉，睾丸萎缩
- D. 止血不彻底形成血肿
- E. 手术不彻底而复发

正确答案： E

45、单选 男性，55岁。无痛性肉眼血尿3个月，偶伴有面条状血块。尿细胞学检查4次未发现癌细胞，B超可见左肾轻度积水。如检查发现左肾盂及输尿管中段两处充盈缺损，最可能的诊断是（）。

- A. 肾癌
- B. 输尿管狭窄
- C. 肾结核
- D. 上尿路上皮肿瘤
- E. 肾及输尿管结石

正确答案： D

46、单选 有助于腹膜外膀胱破裂区别于后尿道断裂的是（）。

- A. 休克
- B. 骨盆骨折
- C. 尿道口流出少量血性尿液
- D. 排尿困难
- E. 导尿管易插入膀胱，造影时造影剂漏至膀胱外盆腔内

正确答案：E

47、单选 上尿路结石多数为（）。

- A. 草酸钙结石
- B. 磷酸钙结石
- C. 尿酸结石
- D. 胱氨酸结石
- E. 磷酸镁铵结石

正确答案：A

参考解析：上尿路结石好发于青壮年，以草酸钙成分最为多见。目前认为该结石发病率明显增高可能与生活水平提高，营养过剩有关（进食过多的动物蛋白、高热量、高糖和低纤维素）。

48、单选 急性细菌性前列腺炎的治疗，下列错误的是（）。

- A. 卧床休息，大量饮水，应用抗菌药物
- B. 适当应用止痛、解痉药物
- C. 急性尿潴留避免经尿道导尿，采取耻骨上套管穿刺造瘘
- D. 加强前列腺按摩，促使脓性分泌物排出
- E. 并发前列腺脓肿，经会阴切开引流

正确答案：D

49、单选 有关膀胱肿瘤所致的血尿，下列哪项不是正确的（）。

- A. 大多数为无痛性
- B. 一般为间歇性出现
- C. 多数为全程肉眼血尿
- D. 血尿程度与肿瘤大小不一致
- E. 血尿轻重与肿瘤恶性程度相平行

正确答案：E

参考解析：膀胱肿瘤所致的血尿，大多数为无痛性、间歇性、全程肉眼血尿，其程度与肿瘤大小不一致。

50、单选 男性，67岁。夜间尿频半年余，排尿困难2个月。B超检查：双肾未见占位性病变，膀胱充盈良好，前列腺4.5cm×4cm×3cm大小，残余尿量120ml。如果最大尿流率<10ml/s，膀胱顺应性尚好，治疗方法最好采取（）。

- A. 药物治疗

- B. 开放手术
- C. 经尿道电切术
- D. 留置导尿管
- E. 留置导尿管+药物治疗

正确答案： C

51、单选 诊断肾脏肿块最可靠的检查方法是（）。

- A. B超
- B. 肾图
- C. IVU
- D. 腹平片
- E. CT

正确答案： E

52、单选 膀胱三角区有蒂乳头瘤（T1期），肿瘤直径小于2cm，治疗应选择（）。

- A. 经尿道电切或电灼
- B. 膀胱部分切除
- C. 膀胱全切除
- D. 化学疗法
- E. 放射疗法

正确答案： A

参考解析： T1期膀胱肿瘤仅侵犯黏膜下层，如有蒂，且直径小于2cm，可采用经尿道电切或电灼。

53、单选 男性，30岁。2年来反复尿频，尿急，尿痛，自服抗生素治疗后症状无明显改善。近1个月来，症状加重，尿频次数明显增加，约30次/日，伴有终末肉眼血尿。下列检查，不必要的是（）。

- A. 前列腺指检及前列腺液常规检查
- B. IVU检查
- C. 尿常规检查
- D. 尿细菌培养
- E. 尿沉渣查抗酸杆菌

正确答案： A

54、单选 男性，28岁。尿急、尿痛伴尿道口脓性分泌物2天就诊。否认不洁性行为史。检查发现白细胞内有革兰阴性双球菌。目前可诊断为（）。

- A. 尿路感染
- B. 急性前列腺炎
- C. 淋菌性尿道炎
- D. 非淋菌性尿道炎
- E. 精囊炎

正确答案：C

55、单选 阴囊鞘膜腔内液体增多形成的囊肿称为鞘膜积液。其临床特点，下列不正确的是（）。

- A. 根据病因分原发性和继发性，根据部位与鞘状突闭锁情况分 4 种类型
- B. 一侧多见，少症状，大者下坠感，影响排尿、工作与生活
- C. 连续穿刺抽液，多数可获治愈
- D. 需要与腹股沟斜疝、睾丸肿瘤、精液囊肿进行鉴别
- E. 透光试验是其诊断要点

正确答案：C

56、单选 泌尿系结核最早受到感染的器官是（）。

- A. 膀胱
- B. 尿道
- C. 双侧肾脏
- D. 单侧肾脏
- E. 输尿管

正确答案：C

57、单选 男性，28 岁。尿急、尿痛伴尿道口脓性分泌物 2 天就诊。否认不洁性行为史。治疗原则中，不包括（）。

- A. 早期治疗，正规合理用药
- B. 配偶应同时检查治疗
- C. 治疗期间禁止性生活
- D. 长效青霉素 80 万 U，肌注，一日 2 次
- E. 治疗效果不佳，应行淋球菌培养及药敏试验

正确答案：D

58、单选 膀胱结石直径 2cm，尿检白细胞 3~5 个/HP。最佳的治疗方法是（）。

- A. 经尿道膀胱碎石
- B. 膀胱切开取石
- C. 经膀胱镜取石
- D. 体外冲击波碎石
- E. 中药排石

正确答案：A

59、单选 男性，69 岁。右侧睾丸痛伴畏寒、发热 1 天。查体：右侧附睾肿大，质硬，压痛明显。血常规：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N87%，B 超：右侧附睾增大，血流信号增加。诊断首先应考虑（）。

- A. 右侧附睾睾丸炎
- B. 右侧急性附睾炎
- C. 右侧附睾肿瘤

- D. 右侧附睾结核
- E. 右侧睾丸扭转

正确答案：B

60、单选 男性，20岁，高空作业时不慎坠下，半空中左腰部受钢管阻拦后身体落地，查神清，面色苍白，四肢厥冷，心率130次/分，血压70/50mmHg，左腰部局部隆起，皮下见大片淤斑，插入尿管，尿色清，超声提示左肾周围大量血凝块，诊断考虑（）。

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾蒂损伤
- E. 皮下组织大面积损伤

正确答案：D

参考解析：肾蒂损伤时血尿程度与出血程度不相符，因肾血管受损，伤肾无灌注，无尿生成，膀胱内尿液为对侧肾产生，可无肉眼血尿，但出血很严重。

61、单选 男性，32岁。右肾绞痛后尿闭1天。腹部X线平片可见双侧输尿管中段各有一约1cm大小结石，左肾鹿角形结石。此时，急诊处理应先采用（）。

- A. 服中药排石
- B. 中西医结合解痉排石
- C. 膀胱镜下输尿管插管引流尿液
- D. 应用利尿药物
- E. 立即手术输尿管切开取石

正确答案：C

62、单选 女性，30岁。右肾结石行体外震波碎石3天后排出结石。两周复查右肾结石已排净，结石成分分析为磷酸盐结石。此后应采取的预防方法是（）。

- A. 口服维生素B或氧化镁
- B. 口服别嘌醇
- C. 碱化尿液，服卡托普利
- D. 碱化尿液，少食动物内脏
- E. 控制感染，服氯化铵

正确答案：E

63、单选 以下尿道损伤的临床表现，错误的是（）。

- A. 休克
- B. 尿道出血、局部疼痛及压痛
- C. 排尿困难、尿潴留及尿外渗
- D. 会阴部血肿及瘀斑

E. 全程肉眼血尿

正确答案： E

64、单选 肾碎裂伤的临床特点，下列不正确的是（）。

- A. 约占肾损伤的 3%
- B. 肾实质有多处裂伤，肾实质破碎成多块
- C. 尿血反而不明显
- D. 有严重的肾周血肿及尿外渗
- E. 需紧急手术治疗

正确答案： C

65、单选 男性，27 岁。墙倒被压致骨盆骨折 10 小时入院。查体：P110 次 / 分，BP80/50mmHg。全身皮肤擦伤，骨盆处瘀斑重，当地医院插入导尿管流出新鲜血性液体 400ml，膀胱仍胀满。直肠指检：可触及浮动的前列腺。目前，宜采取的处置措施是（）。

- A. 继续留置导尿管观察
- B. 立即行膀胱造瘘术
- C. 纠正休克行尿道探查，根据情况采取尿道会师或缝合修补；休克不易纠正行膀胱造瘘
- D. 立即行膀胱造影
- E. B 超和 CT 检查

正确答案： C

66、单选 股沟或睾丸上方囊肿，透光试验阳性，囊肿与睾丸有明显分界。此符合下列哪一项诊断（）。

- A. 交通性鞘膜积液
- B. 精索鞘膜积液
- C. 睾丸鞘膜积液
- D. 婴儿腹型鞘膜积液
- E. 输精管囊肿

正确答案： B

参考解析： 透光试验阳性证明有积液存在，囊肿与睾丸有明显分界，可排除睾丸鞘膜积液和交通性鞘膜积液。

67、单选 关于尿病原学的检查，下列不正确的是（）。

- A. 应包括定量培养和涂片检查
- B. 绝对不能穿刺膀胱收集尿液
- C. 标本应取自新鲜中段尿
- D. 一般应同时加做药物敏感试验
- E. 取尿样时，男性应上翻包皮，女性应清洁外阴，也可经导尿获取尿液

正确答案： B

68、单选 下列不属于肾损伤手术适应证的是（）。

- A. 开放性肾损伤者
- B. 合并有腹腔其他脏器损伤者
- C. 诊断明确的肾挫裂伤者
- D. 腰部肿块增大，出现高热、腰痛加重者
- E. 抗休克血压不升或升而复降者

正确答案：C

69、单选 血尿伴肾绞痛时应首先考虑（）。

- A. 肾肿瘤
- B. 肾输尿管结石
- C. 泌尿系结核
- D. 肾盂肾炎
- E. 腰肌劳损

正确答案：B

参考解析：血尿伴肾绞痛是肾输尿管结石的典型表现。

70、单选 前列腺增生在下列哪种情况下不宜手术治疗（）。

- A. 伴有长期、反复的下尿路感染
- B. 伴有反复肉眼及镜下血尿
- C. 合并腹股沟斜疝
- D. 伴有急性尿潴留病史
- E. 伴有尿道括约肌功能障碍

正确答案：E

参考解析：其他选项均为前列腺增生症的手术适应证，而尿道括约肌功能障碍是手术的禁忌证。前列腺增生的手术适应证概括地可分为3类：①症状明显，严重影响生活质量并且药物治疗效果不好；②最大尿流率 $<10\text{ml/s}$ 和（或）残余尿 $>60\text{ml}$ ；③伴有并发症出现时，如急、慢性尿潴留，膀胱结石，尿路感染及肾功能不全等。

71、单选 男性，28岁。右侧结核性无功能肾切除术后一年，左肾中度积水，膀胱容量45ml，排尿费力。尿常规检查：白细胞3~5个/HP，红细胞0~1个/HP，尿抗酸菌染色3次阴性。行尿道扩张失败，尿道仅能插入8号尿管。目前的治疗宜采取（）。

- A. 左肾造瘘术
- B. 左输尿管腹壁造口
- C. 膀胱造瘘术
- D. 乙状结肠扩大膀胱术
- E. 膀胱成形术

正确答案：B

参考解析：该题患者已出现膀胱挛缩合并尿道狭窄，因此单纯膀胱扩大已不能解决排尿问题，只能选择输尿管腹壁造口。

72、单选 用于泌尿生殖系统腔道检查的器械大小是以法制单位来表示的，其中 18F 表示该器械的直径为（）

- A. 3mm
- B. 6mm
- C. 9mm
- D. 12mm
- E. 18mm

正确答案： B

73、单选 关于尿液的 pH，下列不正确的是（）。

- A. 通常在 4.5~8.0，平均为 5.5~6.5
- B. 多数情况下，尿的 pH 可以大致反映出血清的 pH
- C. I 型肾小管酸中毒，无论合并多严重的代谢性酸中毒，其尿液均为碱性
- D. 肾结核的尿液呈碱性
- E. 尿酸结石和胱氨酸结石的尿液 pH 一般为酸性

正确答案： D

74、单选 右肾结石 2cm 大小，以下哪项不是（）。

- A. 患侧输尿管有狭窄
- B. 患有严重的心脏疾病
- C. 患有前列腺增生症
- D. 患有急性尿路感染
- E. 伴有双侧输尿管结石

正确答案： C

75、单选 单纯使用抗结核药物治疗肾结核的指征是（）。

- A. 肾盂造影显示病变轻
- B. 静脉肾盂造影一侧广泛破坏
- C. 静脉肾盂造影一侧不显影
- D. 一侧肾自截，对侧肾轻度积水
- E. 肾结核合并结核性小膀胱

正确答案： A

76、单选?女性，40 岁。右腰痛 3 个月，无尿频、尿急、尿痛、发热等伴随症状。B 超检查发现右肾大量积水，左肾正常。

检查失败，应考虑采取（）。

- A. 逆行肾盂造影
- B. 核素扫描
- C. CT
- D. MRI
- E. 右侧肾盂穿刺造影

正确答案： E

77、单选 男性，62岁，排尿费力多年，因饮酒后下腹胀痛，一天未排尿。查体：膀胱膨胀达脐下一指，触痛。为确定诊断，首先考虑的检查是（）。

- A. 肝功能
- B. 尿常规
- C. B超
- D. 血常规
- E. 腹部X线平片

正确答案：C

78、单选 膀胱结石典型的临床症状是（）。

- A. 尿频、尿急
- B. 排尿困难
- C. 血尿
- D. 排尿突然中断
- E. 尿痛

正确答案：D

79、单选 美国创伤外科协会器官外伤委员会制订的肾损伤分级中，不正确的是（）。

- A. I级：单纯肾挫裂伤
- B. II级：肾周围血肿局限在腹膜后或肾皮质裂伤小于1.0cm，无尿外渗
- C. III级：肾皮质裂伤大于1.0cm，无尿外渗
- D. IV级：肾实质裂伤超过皮髓交界处，并进入集合系统，肾段动静脉损伤
- E. V级：肾碎裂伤，肾蒂撕裂，肾动脉血栓形成

正确答案：A

参考解析：美国创伤外科协会器官外伤委员会制订的肾损伤分级中，I级损伤为肾挫伤或包膜下血肿。

80、单选 女性，24岁。尿频、尿急、终末血尿2年。尿常规检查：脓细胞（+++），红细胞（+）。尿细菌培养阴性，IVU检查：左肾未显影，左肾区可见斑片状高密度阴影，右肾盂肾盏显示光滑，有轻度积水。诊断首先考虑（）。

- A. 左肾结核
- B. 左肾结石并感染
- C. 慢性细菌性膀胱炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 左肾积脓

正确答案：A

81、单选 双侧肾结核，治疗宜采取（）。

- A. 选择较严重的一侧作肾切除
- B. 先给予抗结核治疗，再根据情况决定是否切除无功能或病变严重的一侧肾
- C. 结肠代膀胱术

- D. 肾造瘘术
- E. 空洞引流术

正确答案：B

82、单选 男性，75岁。排尿困难5年，腰背痛2个月。查体：前列腺左叶有一直径1cm大小质硬结节。血PSA>100ng/ml。患者主诉腰痛明显，根据其病情，药物治疗宜选择（）。

- A. 布洛芬
- B. 哌替啶
- C. 曲马多或奥施康定
- D. 择泰（唑来膦酸）
- E. 中药

正确答案：D

83、单选 男性，46岁。右肾区疼痛，间歇性肾绞痛1个月。尿检：红细胞10~15个/HP。B超检查：左肾积水轻至中度。IVU检查：左输尿管上段有一1.0cm结石，结石以上输尿管扩张1.2cm，双侧肾盂肾盏显影好。根据患者情况，最佳的治疗方案是（）。

- A. 输尿管切开取石
- B. 输尿管套石术
- C. 左肾造瘘术
- D. 体外冲击波碎石
- E. 中西医结合排石

正确答案：D

84、单选 男性，57岁。无痛性间歇性肉眼血尿2个月。查体：一般情况良好，腹部未扪及肿块，双肾区无叩击痛。直肠指检：前列腺增大，光滑，无结节。B超检查：双肾未见异常，膀胱内有一2cm×2.5cm实质占位。为预防肿瘤复发，最好的控制方法是（）。

- A. 放射疗法
- B. 顺铂、阿霉素及甲氨蝶呤全身化学疗法
- C. 定期复查膀胱镜及膀胱内灌注抗癌药物
- D. 干扰素、IL-2免疫治疗
- E. 放疗+化疗

正确答案：C

85、单选 保列治（非那雄胺）治疗前列腺增生的机制是（）。

- A. 抑制 α 受体
- B. 抑制5- α 还原酶
- C. 抑制H₂受体
- D. 抑制 β 受体
- E. 抑制雄性激素受体

正确答案：B

参考解析：保列治是通过抑制 5- α 还原酶，减少睾酮向双氢睾酮的转化，从而抑制前列腺的增生。

86、单选 临床诊断前列腺癌的基本方法是（）。

- A. CT
- B. MRI
- C. 全身放射性核素骨扫描
- D. 排泄性尿路造影
- E. 直肠指诊、经直肠超声和血 PSA 测定

正确答案：E

87、单选 男性，61 岁。尿频 5 年，反复血尿半年余。直肠指诊：前列腺鸡蛋大小，质中，未触及明显结节。PSA3ng/ml。超声检查：前列腺增大，前列腺内低回声灶，大小约 2cm；双肾、输尿管、膀胱未见明显异常。下一步诊疗计划中，哪一项检查最为重要（）。

- A. 尿流动力学检查
- B. B 超测残余尿
- C. 前列腺穿刺活检
- D. IPSS 评分
- E. 膀胱镜检查

正确答案：C

88、单选 男，72 岁，排尿困难 5 年，近 2 个月加重伴食欲不振。直肠指诊前列腺明显增大 5~6cm，叩诊膀胱脐下 3 横指。B 超示双肾中度积水。下面哪一种治疗最为合理（）。

- A. 耻骨上经膀胱前列腺切除术
- B. 经尿道前列腺切除术
- C. 服用 α 受体阻滞剂和 5 α 还原酶抑制剂
- D. 留置导尿管或耻骨上膀胱穿刺造瘘
- E. 经尿道前列腺热疗

正确答案：D

89、单选 男，25 岁，KUB 示双侧肾盂各有一直径约 1.5cm 大小阴影，排泄性尿路造影示双肾中度积水，双侧输尿管通畅，一次体外碎石将双侧结石粉碎，术后当天出现血尿及碎石排除，第二天出现双肾绞痛、发热、无尿，考虑治疗有何不妥之处（）。

- A. 术前未行抗感染治疗
- B. 术前未能先行解决双肾积水
- C. 术前未做定位 X 线
- D. 双侧一次性碎石治疗
- E. 错误地选择了 ESWL

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737153044102006142>