

皮肤与性病学主治医师：相关专业知识与专业知识（题库版）

1、单选 患者，女性，18岁。面部、手背部皮疹10余年，不痛不痒，日晒后加重。查体：面部、手背部可见散在的米粒大的淡褐色的斑疹。目前不适当的处理是（）。

- A. 避免（江南博哥）日光照射
- B. 外用2%~3%氢醌霜
- C. 液氮冷冻
- D. Alex755nm 激光
- E. 外用化学剥脱剂

正确答案：E

2、单选 艾滋病的筛查试验是（）。

- A. RPR
- B. TPPA
- C. WB
- D. HIV-Ab
- E. HSVELISA

正确答案：D

参考解析：梅毒的筛查试验是以非梅毒螺旋体为抗原来检测抗体，如RPR、VDRL等，确诊试验采用乳胶凝集试验（PA），如TPHA、TP-PA等。

3、单选 结缔组织病患者可合并下列症状，其中不包括（）。

- A. 脱发
- B. 白癜风样痣
- C. 色素痣
- D. 疣状痣样皮损
- E. 血管瘤

正确答案：E

4、单选 局部多汗症的临床特点不包括（）。

- A. 手足皮肤湿冷
- B. 多汗部位常见皮肤浸渍发白
- C. 多伴有足臭
- D. 局部皮肤易过敏
- E. 易患冻疮

正确答案：D

5、单选 患者，女性，28岁。四肢皮疹伴阵发性剧烈瘙痒半年。专科检查：全身皮肤黏膜无黄染，未见风团，划痕征阴性。四肢散在坚实性丘疹和结节。部分皮损表面破溃、出血，少许血痂。皮损以四肢伸侧为重。为缓解此类皮损的瘙痒程度，通常选用的外用皮质激素药物是（）。

- A. 弱效激素

- B. 中效激素
- C. 强效激素
- D. 中效或弱效激素
- E. 中效或强效激素

正确答案：E

6、单选 自身免疫病治疗方法不包括（）。

- A. 免疫抑制剂
- B. 免疫调节
- C. 血浆置换
- D. 抗感染治疗
- E. 过继免疫疗法

正确答案：E

参考解析：自身免疫的治疗方法有免疫抑制、调节，易致炎症反应需抗感染治疗，血浆置换属免疫调节范畴。

7、单选 急性湿疹的好发部位是（）。

- A. 耳后
- B. 颈部
- C. 胸部
- D. 背部
- E. 四肢

正确答案：A

8、单选 下列关于硬红斑，错误的是（）。

- A. 多发于年轻女性
- B. 冬春季发病
- C. 不伴有其他内脏结核
- D. 好发于小腿中下部屈侧
- E. 冬春季加剧

正确答案：C

参考解析：硬红斑常伴有其他内脏结核。

9、单选 非淋菌性尿道炎的主要病原微生物是（）。

- A. 链锁状杆菌
- B. 葡萄球菌
- C. 痘病毒
- D. 乳头瘤病毒
- E. 沙眼衣原体及支原体

正确答案：E

10、单选 患者，男性，28岁。阴茎溃疡5天，伴疼痛。起病前一周有不洁性交史。查体：阴茎中段上方可见3个蚕豆大小溃疡，互相融合，边缘不整齐，其表面覆盖灰黄色脂性脓苔，有触痛。分泌物涂片可查到末端钝圆两极染色的短小杆菌，呈鱼群状排列。本病最可能的诊断为（）。

- A. 硬下疳
- B. 软下疳
- C. 生殖器疱疹
- D. 性病性淋巴肉芽肿
- E. 腹股沟肉芽肿

正确答案：B

参考解析：分泌物涂片可查到末端钝圆两极染色的短小杆菌，呈鱼群状排列是杜雷克嗜血杆菌的特点。再结合病史和体征不难判断为软下疳。

11、单选 患者，男，60岁。面部皮损数年，无明显自觉症状。体格检查：面部散在扁平丘疹、斑片，深褐色，表面光滑，境界清楚，主要分布于颞部和颧部，皮损呈对称性分布。以下因素与本病的发生无关的是（）。

- A. 遗传
- B. 皮肤老化
- C. 日晒
- D. 细菌感染
- E. 皮肤轻微损伤

正确答案：D

12、单选 早期梅毒（包括一期、二期及早期潜伏梅毒）推荐普鲁卡因青霉素G治疗总量（一疗程）应是（）。

- A. 1500万单位
- B. 600万单位
- C. 800万~1200万单位
- D. 1200万~1800万单位
- E. 2400万单位

正确答案：C

13、单选 患者，女，34岁。四肢反复起水疱伴瘙痒2年，身体易受摩擦部位易发生水疱。体格检查：四肢末端、肘膝关节伸侧见绿豆大小水疱，基底不红，疱壁厚，尼氏征（-），皮损愈合处见瘢痕。皮损组织病理示：表皮下水疱，疱内可见中性粒细胞浸润。该病最可能的诊断为（）。

- A. 疱疹样天疱疮
- B. 获得性大疱性表皮松解症
- C. 大疱性类天疱疮
- D. 疱疹性皮炎
- E. 先天性大疱性表皮坏死松解症

正确答案：B

14、单选 寻常型天疱疮的病因是（）。

- A. 细菌感染、病毒感染、真菌感染
- B. 细菌感染
- C. 病毒感染
- D. 真菌感染
- E. 自身免疫性

正确答案：E

参考解析：寻常型天疱疮是一种自身免疫性疾病，在患者血中存在天疱疮抗体，而且抗体滴度与病情轻重有关。

15、单选 患者，男，43岁。10余年前每于夏季在腹股沟、大腿内侧、腋下出现皮疹，主要表现为红斑、小水疱，自觉瘙痒，抓挠后有渗出。一般夏季加重，冬季缓减，每年反复发作。其父有类似病史。皮科情况：双腋下0.5cm×1.0cm~1.0cm×2.0cm大小红斑，无糜烂及渗液；双大腿根部内侧大片红斑，中央糜烂渗液，有异味。红斑边缘见黄豆大水疱，壁松弛，疱液混浊，尼氏征阳性。该病的组织病理特征性改变是（）。

- A. 表皮内广泛的棘层松解，宛如倒塌的砖墙
- B. 表皮角化过度
- C. 棘层增厚
- D. 真皮有不同的炎症细胞浸润
- E. 颗粒层消失

正确答案：A

16、单选 患者，女性，40岁。躯干、上肢皮疹伴瘙痒2天就诊。患者2天前于颈前、上胸部、双前臂伸侧出现红色皮疹，有明显瘙痒，皮疹渐加重、扩大，出现局部渗出，该患者发病前有去海边旅游日晒史。查体：颈前、上胸部、双前臂伸侧密集成簇分布的小丘疱疹、水疱，局部轻度肿胀、渗液。该患者临床表现属于（）。

- A. 丘疱疹型
- B. 丘疹型
- C. 红斑水肿型
- D. 痒疹型
- E. 混合型

正确答案：A

17、单选 银屑病皮损好发于（）。

- A. 四肢伸侧
- B. 面部
- C. 四肢屈侧
- D. 掌跖部
- E. 阴囊

正确答案：A

18、单选 利福平治疗正常成人皮肤结核的用量是（）。

- A. 每日口服 400mg
- B. 每日口服 450mg
- C. 每日口服 500mg
- D. 每日口服 550mg
- E. 每日口服 600mg

正确答案：E

19、单选 大疱性表皮松解症的皮损好发部位是（）。

- A. 皮肤黏膜交界处
- B. 腹股沟及臀沟等部位
- C. 肢端及四肢关节伸面等易受到摩擦处
- D. 四肢及躯体屈侧等皮肤较薄处
- E. 头皮及躯体等部位

正确答案：C

20、单选 关于接触性皮炎，患者再次接触相同的过敏原之后一般在多长时间
内发病（）。

- A. 24 小时
- B. 48 小时
- C. 72 小时
- D. 4 天
- E. 一周

正确答案：A

21、单选 甲下堆屑最常见于（）。

- A. 银屑病
- B. 扁平苔藓
- C. 甲癣
- D. 甲营养不良
- E. 甲沟炎

正确答案：C

22、单选 疖病的好发因素不包括（）。

- A. 糖尿病
- B. 肾病
- C. 皮肤瘙痒
- D. 老年患者
- E. 贫血

正确答案：D

参考解析：疖病发生可能与机体免疫力低下、长期服用糖皮质激素或并发糖尿病有关。皮肤不洁、多汗、搔抓、摩擦常为诱发因素。

23、单选 患者，女，16岁。全身皮疹4天伴痒，病程中伴有发热，每天最高体温为38.4℃，同时有四肢大关节的轻度酸痛。皮疹时起时消。既往无异常。体检：咽部充血，扁桃体Ⅱ度肿大。全身大小不等的风团。该患者最有可能的诊断（）。

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 药疹
- C. 败血症
- D. 急性荨麻疹
- E. 麻疹

正确答案：D

24、单选 患儿，男，3岁。因全身皮肤如羊皮纸样入院。系第1胎第1产，胎龄36周，剖宫产娩出，出生时羊水混浊，评分10分。父母非近亲婚配，母亲、舅舅皮肤较干燥，易脱屑。体检：体温正常，脉搏140次/分，呼吸45次/分，体重2600g。神清，哭声响，前囟平，眼睑、口唇外翻。结膜充血，有黄色分泌物，颈软，全身皮肤薄而发亮，多皱褶，如涂过油的羊皮纸。板层状鱼鳞病目前有5个致病位点，除外（）。

- A. TGM1 基因
- B. ABCA12 基因
- C. NCIE2 基因
- D. ABDA12 基因
- E. 位于17p13.2p13.1

正确答案：D

25、单选 以下具有杀灭痤疮丙酸杆菌和溶解粉刺作用的外用药物是（）。

- A. 0.1%维A酸软膏
- B. 5%过氧化苯甲酸
- C. 2.5%硫化硒洗剂
- D. 2%水杨酸酞
- E. 红霉素软膏

正确答案：B

参考解析：过氧化苯甲酞外用于皮肤后可被还原而释出游离氧，后者能使痤疮丙酸杆菌等菌体蛋白氧化，菌数减少，继而也减少了游离脂肪酸，同时还具有广谱抗菌作用和角质剥脱作用。可配成霜剂、洗剂或凝胶剂，常用浓度为2.5%、5%或10%。不良反应有刺痛、皮肤干燥、发红等。

26、单选 患者，男性，39岁。确诊为寻常型银屑病12年，四肢多关节疼痛伴部分关节肿胀2个月。专科检查：束状发，躯干四肢散在斑疹、斑丘疹，伴银白色鳞屑。双侧肩关节、双侧髋关节压痛。腰椎多椎体间压痛：双侧腕关节和部分掌指关节肿胀畸形，伴压痛。部分指（趾）甲变形、变脆，甲下厚积鳞屑。为控制关节炎症状，最不常联合使用的药物是（）。

- A. 口服糖皮质激素
- B. 干扰素
- C. 口服维 A 酸类药物
- D. 甲氨蝶呤
- E. 环孢素

正确答案： B

27、单选 患者，女性，18 岁。面部、手背部皮疹 10 余年，不痛不痒，日晒后加重。查体：面部、手背部可见散在的米粒大的淡褐色的斑疹。组织病理符合上述临床诊断的是（）。

- A. 表皮基底层细胞表皮突中黑素含量轻度至中度增多
- B. 表皮角化过度
- C. 表皮黑素细胞增多
- D. 真皮上部血管周围嗜黑素细胞增多
- E. 真皮血管周淋巴细胞浸润

正确答案： A

28、单选 治疗孢子丝菌病首选（）。

- A. 利福平
- B. 阿昔洛韦
- C. 碘化钾
- D. 灰黄霉素
- E. 红霉素

正确答案： C

29、单选 患者，男性，10 岁。1 个月前有上呼吸道感染史，半个月前开始出现双侧下肢出血点、出血斑伴关节酸痛、腹痛，病程中无呕血、血常规提示 WBC $12 \times 10^9/L$ 、N82%、L19%、Hb115g/L，PLT 230×10^9 ，尿常规提示隐血++、RBC2~3/HP。结合病史，该患者的诊断为（）。

- A. 过敏性紫癜
- B. 特发性血小板减少性紫癜
- C. 变应性皮肤血管炎
- D. 持久隆起性红斑
- E. 荨麻疹性血管炎

正确答案： A

30、单选 男性，25 岁。上感发热 1 周后，躯体四肢出现广泛散在红色丘疹、斑丘疹，表面有银白色鳞屑，刮去鳞屑呈半透明薄膜，再刮去薄膜出现小血点，自觉瘙痒，其母亲有同类病史。此患者首先应考虑的诊断是（）。

- A. 湿疹
- B. 玫瑰糠疹
- C. 寻常型银屑病

D. 毛发红糠疹

E. 白色糠疹

正确答案：C

参考解析：上感后躯体四肢出现广泛散在红色丘疹、斑丘疹，表面有银白色鳞屑，刮去鳞屑呈半透明薄膜，再刮去薄膜出现小血点，自觉瘙痒，并有家族史，首先考虑是寻常型银屑病中的急性点滴状银屑病。

31、单选 损害与周围皮肤平起的局限性皮肤颜色损害（）。

A. 风团

B. 结节

C. 斑疹

D. 水疱

E. 囊肿

正确答案：C

32、单选 下列不是慢性单纯性苔藓皮损的好发部位的是（）。

A. 眼睑

B. 肘部

C. 颈侧

D. 腰骶

E. 手背

正确答案：E

参考解析：慢性单纯性苔藓皮损的好发部位为眼睑、肘部、颈侧、腰骶。

33、单选 早期梅毒检查可用（）。

A. 梅毒螺旋体直接检查

B. TPPA

C. RPR

D. 醋酸白试验

E. 毛滴虫检查

正确答案：A

34、单选 黄瘤病临床类型，较罕见的一型是（）。

A. 扁平黄瘤

B. 睑黄瘤

C. 腱黄瘤

D. 播散性黄瘤

E. 结节性黄瘤

正确答案：D

35、单选 男性，40岁。下肢静脉曲张多年，右小腿下三分之一处皮肤反复发生红斑、丘疱疹、糜烂、渗液、痒，已数年。考虑诊断为（）。

A. 干燥性湿疹

- B. 钱币形湿疹
- C. 外伤性湿疹
- D. 淤积性皮炎
- E. 接触性皮炎

正确答案：D

36、单选 疱疹样皮炎的水疱位于（）。

- A. 表皮内
- B. 表皮下
- C. 真皮浅层
- D. 真皮深层
- E. 皮下

正确答案：B

37、单选 患者，女性，40岁。面部皮肤肿胀，发硬2年。病程中伴四肢关节活动障碍。体检：面部轻度肿胀，皮肤发硬，不能捏起；张口受限；耳后、颈部，前胸部皮肤异色病样改变；双手、前臂、双足及小腿皮肤发硬、不能捏起；多个手指外侧缘有钙化。四肢活动受限，不能平举。如果该患者行ENA多肽抗体谱测定，最可能出现的阳性抗体为（）。

- A. SSA 抗体
- B. SSB 抗体
- C. dsDNA 抗体
- D. ssDNA 抗体
- E. Scl-70 抗体

正确答案：E

38、单选 下列有关层板状鱼鳞病说法错误的是（）。

- A. 男性患者多于女性
- B. 大部分呈常染色体隐性遗传
- C. 出生时即发病，并且终生患病
- D. 在儿童及成年期，皮损以全身泛发性鳞屑为特征
- E. 由于睑外翻可引起暴露性角膜炎

正确答案：A

参考解析：层板状鱼鳞病发病无性别差异。

39、单选 叶酸代谢拮抗剂是（）。

- A. 环磷酰胺
- B. 硫唑嘌呤
- C. 甲氨蝶呤
- D. 他克莫司
- E. 霉酚酸酯

正确答案：C

40、单选 下面关于毛囊角化症的说法，错误的是（）。

- A. 又叫 Darier 病
- B. 皮损特征在脂溢部位簇集油污样角化性丘疹
- C. 可伴有甲异常和黏膜损害
- D. 是毛囊性疾病
- E. 呈常染色体显性遗传

正确答案：D

41、单选 有关玫瑰糠疹的治疗，不正确的是（）。

- A. 抗组胺剂口服
- B. 硫代硫酸钠静推
- C. 氢化可的松外用
- D. 中波紫外线照射
- E. 皮质类固醇口服

正确答案：E

42、单选 真皮或深部组织破坏后新生结缔组织修复形成的损害（）。

- A. 糜烂
- B. 溃疡
- C. 瘢痕
- D. 裂隙
- E. 苔藓样变

正确答案：C

43、单选 以下关于猩红热临床主要特点的描述，不正确的是（）。

- A. 发热 1~2 天后出疹
- B. 皮肤皱褶处 Pastia 线
- C. 皮疹高度可凹性水肿
- D. 皮疹多分布于躯干部
- E. 有口周苍白圈

正确答案：C

参考解析：猩红热的皮疹不是高度可凹性水肿。

44、单选 红斑狼疮的病因和发病机制的说法不正确的是（）。

- A. 内分泌因素有关
- B. 免疫反应异常有关
- C. 环境因素有关
- D. 药物因素有关
- E. 与表观遗传学异常无关

正确答案：E

45、单选 过敏性紫癜表现为（）。

- A. 炎症性红斑

- B. 非炎症性红斑
- C. 出血斑
- D. 色素沉着斑
- E. 色素减退斑

正确答案：C

46、单选 一女性因发热，口服先锋霉素后全身发生散在的红斑，其上发生松弛性水疱，如烫伤样表现，黏膜也有大片坏死伴高热，最可能的诊断是（）。

- A. 大疱性表皮松解型药疹
- B. 剥脱性皮炎型药疹
- C. 麻疹样红斑型药疹
- D. 固定型药疹
- E. 湿疹型药疹

正确答案：A

参考解析：大疱性表皮松解型药疹为服用青霉素类药物后，全身发生散在的红斑，其上发生松弛性水疱，如烫伤样。

47、单选 头癣的首选治疗是（）。

- A. 综合治疗
- B. 剪发
- C. 外用抗真菌药
- D. 口服灰黄霉素
- E. 抗真菌药洗发

正确答案：D

参考解析：头癣应采取综合治疗。内服与外用相结合。内服药首选灰黄霉素，皮肤外用抗真菌药。患者尽可能把头发全部剪除。患者使用的物品应常煮沸消毒。服药后3周取患处头发进行真菌镜检。

48、单选 梅毒的确诊试验是（）。

- A. RPR
- B. TPPA
- C. WB
- D. HIV-Ab
- E. HSVELISA

正确答案：B

参考解析：梅毒的筛查试验是以非梅毒螺旋体为抗原来检测抗体，如RPR、VDRL等，确诊试验采用乳胶凝集试验（PA），如TPHA、TP-PA等。

49、单选 患儿，女性，10岁。双手指多发皮疹伴局部瘙痒、破溃就诊。查体见双手背、手指部弥漫性肿胀，手指处多发暗紫红色水肿性红斑、局部糜烂渗液。该患者既往于冬季有类似皮疹发作史。该病主要的发生原因为（）。

- A. 多汗

- B. 局部血液循环差
- C. 挤压
- D. 遗传
- E. 自主神经功能紊乱

正确答案：B

50、单选 患儿，男性，10岁。咽痛10天，四肢皮疹5天。查体：精神状况佳，T37.0℃。扁桃体I度肿大。四肢密集红色斑丘疹，其上附着厚层鳞屑。皮疹以双下肢为多，并见躯干散在分布少许红斑、丘疹。为鉴别诊断，最为有效简便的方法是（）。

- A. 皮肤划痕试验
- B. 点刺试验
- C. 斑贴试验
- D. Auspitz三联征试验
- E. 组织病理试验

正确答案：D

51、单选 免疫抑制剂通常可用于治疗（）。

- A. 多形红斑
- B. 寻常痤疮
- C. 皮炎
- D. 泛发性神经性皮炎
- E. 鹅口疮

正确答案：C

参考解析：皮炎为自身免疫性结缔组织病，可用免疫抑制剂。

52、单选 关于HLA的描述，错误的是（）。

- A. 通过分析亲代与子代的HLA表型，可以获知该家庭成员的HLA基因型
- B. HLA II类抗原是由 α 链与 β 链组成的
- C. 编码HLA I类抗原 α 链和 β 2-微球蛋白的基因位于不同的染色体上
- D. HLA完全相同的纯合子细胞罕见，一般可在近亲婚配的家庭中检出
- E. 血小板表面不表达HLA抗原

正确答案：E

53、单选 下列关于地图舌的说法不正确的是（）。

- A. 是一种浅表的、地图状的、慢性丝状乳头剥脱性炎症
- B. 本病多见于成人，以男性为多
- C. 发病与感染、神经营养障碍和遗传等相关，好发于身体虚弱者
- D. 好发于舌尖与舌的边缘、舌背，多无明显自觉症状，少部分患者可有刺痛烧灼感
- E. 皮损常连续不断出现，每次发作约持续3~4天，病程可持续数月至数年，有时可自然缓解

正确答案：B

54、单选 关于梅毒螺旋体错误的是（）。

- A. 梅毒螺旋体表面的黏多糖与其致病性有关
- B. 梅毒螺旋体对皮肤、主动脉、眼、胎盘、脐带等富含黏多糖的组织亲和力较高
- C. 梅毒螺旋体含有很多非特异性抗原
- D. 抗梅毒螺旋体抗体对机体有很好的保护作用
- E. 非特异性抗体在早期梅毒患者充分治疗后滴度可逐渐下降直至完全消失

正确答案：D

参考解析：抗梅毒螺旋体抗体对机体没有保护作用，在血中可长期甚至终生存在。

55、单选 假单胞菌病用 Wood 灯照射后呈（）。

- A. 珊瑚红色
- B. 黄白色
- C. 绿色
- D. 蓝白色
- E. 棕黄色

正确答案：C

参考解析：滤过紫外线检查（Wood 灯检查）是由高压汞灯作为发射光源，通过由含 9%镍氧化物的钡硅酸滤片发出 320~400nm 波长的光波。主要诊断用于色素异常性疾病、皮肤感染和卟啉病。如白癜风为明亮的蓝白色斑片、假单胞菌为绿色荧光、红癣为珊瑚红色荧光、痤疮为黄白色荧光。

56、单选 软下疳临床表现错误的是（）。

- A. 软下疳一般无明显前驱症状
- B. 生殖器以外的部位也可出现软下疳
- C. 女性患者损害较男性深，触痛明显
- D. 软下疳周围可出现多发卫星状溃疡
- E. 约有 30%~50%的患者可发生疼痛性腹股沟淋巴结炎

正确答案：C

参考解析：女性患者损害较男性浅，触痛不明显。

57、单选 患者，女性，25 岁。消瘦，双侧小腿伸侧面皮下疼痛性结节 2 周。不易破溃，站立或活动后症状加重，病程中伴有发热、肌痛和关节疼痛。血常规提示 WBC $12 \times 10^9/L$ 、N80%、L10%、Hb110g/L，PLT $210 \times 10^9/L$ ，尿常规正常，ESR35mm/h。针对此病最具有特征性的检查手段为（）。

- A. 血常规
- B. ENA 多肽抗体谱
- C. 24 小时尿蛋白定量
- D. 皮损组织病理检查

E. 血管彩超

正确答案：D

58、单选 患者，女性，58岁。主因外阴部皮疹伴剧烈瘙痒4年余，加重1个月就诊。查体：心肺腹未见异常。双侧小阴唇部浸润肥厚、皲裂，呈白色，以右侧小阴唇较明显。本病诊断较有意义的检查是（）。

- A. 组织病理检查
- B. 真菌镜检+培养
- C. 滴虫检查
- D. 醋酸白试验阴性
- E. 支原体检查

正确答案：A

59、单选 组织病理具有“倒塌的砖墙”这一特征性改变的疾病是（）。

- A. 寻常型天疱疮
- B. 大疱性类天疱疮
- C. 家族性慢性良性天疱疮
- D. 获得性大疱性表皮松解症
- E. 线状IgA大疱病

正确答案：C

60、单选 患者，女性，40岁。面部、上肢等部位散在分布暗红色的坚韧丘疹、结节，表面光滑、境界清楚，组织病理学示：真皮内上皮样细胞肉芽肿，可见上皮样细胞裸结节，无干酪样坏死。该患者诊断应首先考虑（）。

- A. 环状肉芽肿
- B. 异物肉芽肿
- C. 结节病
- D. 皮肤纤维瘤
- E. 麻风病

正确答案：C

61、单选 患儿，男性，10岁。自2岁开始反复出现四肢屈侧、颈前区皮疹伴有瘙痒，外用药物治疗后可缓解，病程中伴过敏性鼻炎及过敏性哮喘反复发作。查体：系统检查无异常。皮肤科专科检查见四肢关节屈侧、颈前区淡褐色浸润性斑块，轻度苔藓化，上覆少许干燥鳞屑。此类患者外周血常规中增高的是（）。

- A. 中性粒细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 单核细胞

正确答案：B

62、单选 囊肿性痤疮多见于（）。

- A. 青年男性
- B. 中年男性
- C. 青年女性
- D. 中年女性
- E. 老年男性

正确答案：A

63、单选 以下药物属于免疫抑制剂的是（）。

- A. 8-甲氧补骨脂素
- B. 氯喹
- C. 环磷酰胺
- D. 氨苯砞
- E. 维 A 酸

正确答案：C

参考解析：免疫抑制剂常用的有环磷酰胺、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、环孢素。

64、单选 黑素细胞位于（）。

- A. 基底层
- B. 棘层
- C. 颗粒层
- D. 透明层
- E. 角质层

正确答案：A

65、单选 作定量试验，用于观察梅毒疗效、复发及再感染的血清试验是（）。

- A. TPHA
- B. RPR
- C. HIV
- D. FTA-ABS
- E. TPPA

正确答案：B

参考解析：RPR 是非梅毒螺旋体抗原血清试验，为筛选试验，其定量试验用于观察疗效、判断复发及再感染的方法。

66、单选 粉剂适用于（）。

- A. 脓疱病
- B. 脓癣
- C. 寻常型银屑病
- D. 无渗出的褶烂
- E. 有渗出的急性皮炎

正确答案：D

参考解析：粉剂具有干燥、保护及散热作用，常用于急性或亚急性皮炎而无渗出。

67、单选 与血管发育异常或血管增生无关的疾病是（）。

- A. 鲜红斑痣
- B. 草莓状血管瘤
- C. 老年性血管瘤
- D. 血管角皮瘤
- E. 皮肤纤维瘤

正确答案：E

参考解析：鲜红斑痣、草莓状血管瘤、海绵状血管瘤均系因先天性血管发育畸形或血管内皮细胞增生而形成的良性肿瘤，其中鲜红斑痣和海绵状血管瘤属于先天性发育畸形，草莓状血管瘤为一种真性毛细血管内皮细胞增生瘤。血管角皮瘤为一组伴有角化过度的皮肤毛细血管腔的扩张，不伴有血管内皮细胞增生，部分患者与遗传有关。皮肤纤维瘤为真皮成纤维细胞和胶原纤维增生而形成的良性瘤，可能是一种皮肤反应性增生性炎症，一般无血管内皮细胞增生，也与血管发育异常无关。

68、单选 患者，男，35岁。阴茎破溃1周，疼痛不明显。近3个月内有数次不洁性交史。体格检查：冠状沟处见2个约1.5cm×0.8cm大小的溃疡，表面清洁，具有软骨样硬度，无触痛。实验室检查：血清RPR（-），TPPA（-）。该患者治疗上应采取的方法是（）。

- A. 头孢三嗪 1g，肌肉注射一次
- B. 大观霉素 2g，肌肉注射一次
- C. 阿奇霉素 1g，一次性顿服
- D. 长效青霉素 240万U，肌肉注射，每周1次，连续3次
- E. 抗生素软膏局部外用即可

正确答案：D

69、单选 女，4月龄。患儿出生后不久手足出现水疱，以关节和摩擦部位为著，摩擦后加重。患儿出生正常。母孕期无感染及服药史，父母非近亲结婚。家族中无类似疾病。体检：生长发育良好，生命体征正常，头颅及耳鼻检查无异常，颈无抵抗，心、肺、腹部检查无异常，口唇周围及手足皮肤可见大小不等透亮水疱，直径约1~2cm。该病透射电镜下皮肤松解发生于表皮基底细胞下部。该病属于遗传性大疱性表皮松解症（EB）的（）。

- A. 单纯型 EB
- B. 交界型 EB
- C. 半桥粒型 EB
- D. 常染色体显性遗传的 DEB
- E. 常染色体隐性遗传的 DEB

正确答案：A

70、单选 青年女性，下眼睑处见密集而不融合的呈皮肤色、淡黄色或褐黄色半球形或扁平丘疹，病理显示真皮浅层可见双层上皮细胞形成的囊腔样结构，似蝌蚪。最可能的疾病是（）。

- A. 圆柱瘤
- B. 毛母质瘤
- C. 顶泌汗腺腺瘤
- D. 汗管瘤
- E. 毛发上皮瘤

正确答案：D

参考解析：汗管瘤最常见于女性的眼睑处，呈密集而不融合的皮肤色、淡黄色或褐黄色半球形或扁平丘疹，病理显示真皮浅层可见双层上皮细胞形成的囊腔样结构，似蝌蚪。

71、单选 患者，男，40岁。已婚，健康检查发现血 RPR 阴性，TPPA 阳性。关于该患者下列说法不正确的是（）。

- A. 既往可能患有梅毒，现已治愈
- B. 不可能患有活动性梅毒
- C. 可能患有活动性梅毒
- D. 可能不患有梅毒
- E. 如不及时予以治疗可能出现神经梅毒

正确答案：B

72、单选 有关 Reiter 综合征，不正确的是（）。

- A. 是男性非淋菌性尿道炎的一种常见的并发症
- B. 除非淋菌性尿道炎外，还有关节炎和结膜炎
- C. 一般发生在尿道炎后 1 周左右
- D. 患者关节液中可分离到衣原体
- E. 患者关节液中分离到支原体

正确答案：C

参考解析：尿道炎、结膜炎和关节炎三联症可以同时出现，亦可以先后数月甚至数年才出现。

73、单选 下列关于黑毛舌的临床特征，描述不正确的是（）。

- A. 黑毛舌常发生在丝状乳头最稠密的人字沟前方
- B. 早期在舌中央的两侧出现两条长形的病灶，逐渐向前后蔓延，但不累及舌缘
- C. 多半发生于舌背的中央，愈近边缘时其染色愈深，愈近中央时染色愈浅
- D. 有时可见舌面变黑不长毛的情况，常见于长期使用抗生素而继发真菌生长者
- E. 舌面变黑不长毛的患者，除口苦或口干外，一般无自觉症状

正确答案：C

参考解析：

黑毛舌多半发生于舌背的中央，愈近中央时其染色愈深，愈近边缘时染色愈浅。

74、单选 瘙痒病（ ）。

- A. 溶液
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂或醑剂

正确答案：E

75、单选 过敏性紫癜的特征为（ ）。

- A. 发热、乏力
- B. 蛋白尿、血尿
- C. 可累及其他系统如关节、肾脏、肺等
- D. 非血小板减少性紫癜
- E. 发病前常有上呼吸道感染、低热、全身不适等前驱症状

正确答案：D

76、单选 肠病性肢端皮炎的皮损好发于（ ）。

- A. 曝光和摩擦受压部位
- B. 皮肤细嫩和褶皱部位
- C. 腔口周围
- D. 躯干
- E. 四肢

正确答案：C

77、单选 患者，女性，40岁。面部、上肢等部位散在分布暗红色的坚韧丘疹、结节，表面光滑、境界清楚，组织病理学示：真皮内上皮样细胞肉芽肿，可见上皮样细胞裸结节，无干酪样坏死。以下不是本病的临床特点的是（ ）。

- A. 主要发生于青少年和儿童
- B. 既可有皮肤受累，也可有系统表现
- C. 皮损可呈环状分布
- D. 可出现发热、肺门和纵隔淋巴结肿大等表现
- E. 可表现为红皮病

正确答案：A

78、单选 非淋菌性尿道炎的潜伏期一般是（ ）。

- A. 1周内
- B. 1~2周
- C. 1~3周
- D. 3~4周
- E. 4~5周

正确答案：C

79、单选 导致残毁性掌跖角化病的表型常伴耳聋的突变基因是（）。

- A. 连接蛋白 26
- B. 兜甲蛋白
- C. 角蛋白 1
- D. 角蛋白 9
- E. 角蛋白 14

正确答案：A

80、单选 着色性干皮病的遗传类型是（）。

- A. 性连锁隐性遗传
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. 性连锁显性遗传
- E. 多基因遗传

正确答案：C

81、单选 汗孔角化症分型中最常见的是（）。

- A. 经典斑块型
- B. 播散性浅表性光线型
- C. 掌跖播散型
- D. 线型
- E. 点状型

正确答案：B

82、单选 掌跖脓疱病与肠病性肢端皮炎的鉴别要点不包括（）。

- A. 累及四肢末端
- B. 皮疹为无菌性小脓疱
- C. 不累及腔口周围皮肤
- D. 无胃肠道症状
- E. 组织病理为表皮类单房性脓疱形成

正确答案：A

83、单选 调节上皮细胞的生成和分化的是（）。

- A. 维 A 酸
- B. 烟酰胺
- C. 伊曲康唑
- D. 氯喹
- E. 阿昔洛韦

正确答案：A

84、单选 患儿女，6个月。因周身出现条状花纹就诊。患儿出生7~8天后，四肢开始出现点滴状淡红色斑，部分红斑颜色逐渐加深呈褐色，部分红斑基础上出现绿豆至蚕豆大小水疱，水疱消退后留下色素沉着斑。患儿足月顺产，父母非近亲结婚，家族中无类似病史。体检：发育良好，系统检查未见异常。皮肤科情况：躯干、四肢及外阴见条状或不规则状或涡轮状光滑的紫色或褐色色素沉着斑，部分皮损呈疣状增生。组织病理示：基底层色素减退，细胞空泡化变性，真皮乳头层嗜黑细胞见大量黑素沉积。该病第三期需要与多种疾病相鉴别，不包括（）。

- A. 线状痣样色素沉着病
- B. 色素异常症
- C. Naegeliz 综合征
- D. 疣状软骨发育不良
- E. 旋涡状痣样色素沉着病

正确答案：B

85、单选 卡氏肺囊虫肺炎的治疗，首选药物是（）。

- A. 红霉素
- B. 四环素
- C. 青霉素
- D. 头孢菌素
- E. 复方新诺明

正确答案：E

86、单选 下列不属于银屑病临床分型的是（）。

- A. 寻常型
- B. 脓疱型
- C. 关节病型
- D. 斑块型
- E. 红皮病型

正确答案：D

参考解析：银屑病的临床分型为寻常型、脓疱型、关节病型和红皮病型。

87、单选 抑制鸟嘌呤核苷酸的经典合成途径的是（）。

- A. 环磷酰胺
- B. 硫唑嘌呤
- C. 甲氨蝶呤
- D. 他克莫司
- E. 霉酚酸酯

正确答案：E

88、单选 与汗管瘤鉴别的疾病不包括（）。

- A. 毛发上皮瘤

- B. 扁平疣
- C. 硬化性基底细胞上皮瘤
- D. 颜面播散性粟粒狼疮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738044107134006065>