

急诊急救专科护士模拟题与答案

1、中毒物质不明洗胃时应选用：（ ）

- A、2-4%碳酸氢钠
- B、过氧化氢
- C、温开水或等渗盐水
- D、高锰酸钾
- E、植物油

答案：C

2、有机磷农药中毒常可闻到的气味是

- A、烂苹果味
- B、大蒜味
- C、酒味
- D、杏仁味
- E、臭蛋味

答案：B

3、心电图上 I 和 aVL 导联出现急性心肌梗死的特异性改变，其梗死的部位是心脏的（ ）

- A、下壁
- B、前壁
- C、后壁
- D、高侧壁
- E、前间壁

答案：D

4、急性肺水肿的典型表现不包括哪个（ ）

- A、端坐呼吸
- B、双肺湿啰音
- C、下肢水肿
- D、呼吸频率可达 30-50 次/分
- E、咳粉红色泡沫痰

答案：C

5、呼吸机突然发生故障时，护士应采取的措施是（ ）

- A、立即将患者的人工气道与呼吸机脱离
- B、使用简易呼吸器连接氧源，为患者进行人工呼吸
- C、立即报告医生
- D、更换备用呼吸机

E、以上都是

答案：E

6、形成护理风险的原因从医院管理层面分析，不包括（）

A、患者多，护士缺编，超负荷工作

B、仪器设备不全，物品，药品准备不充分

C、抢救和留观患者不能及时收入院，增加了护士的工作量

D、护理队伍年轻化，技术力量薄弱

E、处理问题综合能力强

答案：E

7、下列严重创伤手术原则错误的是

A、缩短创伤至接受决定性手术的时间

B、延缓和阻止休克的发生发展

C、为减轻患者痛苦，手术务必一次完成

D、及时解除危及生命的原发病

答案：C

8、以下哪项不是心肺复苏定量评估指标（）

A、尽量减少中断

B、周围环境安全

C、避免过度通气

D、正确的按压频率和按压深度

E、胸廓完全回弹

答案：B

9、二期肝性脑病患者经常出现下列那种特异性表现

A、抽搐

B、昏迷

C、昏睡

D、扑翼样震颤

E、精神严重错乱

答案：D

10、患者王某，56岁，男性，因青光 急性发作住院治疗。术后第二天，护士小王来到病房向患者讲解术后眼球按摩的相关知识，在交谈中小王不恰当的沟通行为有（）

A、在交谈时让患者选择舒适的体位

B、当对方表现出明显的焦虑和担心时，给予语言安慰

C、在患者说话时，埋头看自己手里的资料

D、结束时留给患者一份书面材料

E、向患者的配合表示感谢

答案：C

11、工作应提前（ ）min 到岗，清点物品、药品数量及有效期，填写物品、药品交接本

A、5min

B、10min

C、15min

D、20min

E、30min

答案：B

12、下列不属于急性心力衰竭伴体（肺）循环淤血及容量负荷过重患者首选用药的是

A、呋塞米

B、甘露醇

C、托拉塞米

D、布美他尼

E、托伐普坦

答案：B

13、关于创伤性凝血病发病机制正确的是（ ）

A、凝血功能障碍与休克严重程度无明显量效

B、组织低灌注时，内皮细胞释放血栓调节蛋白减少

C、血栓调节蛋白抑制蛋白C的功能

D、血栓调节蛋白抑制V、VIII因子的功能

E、损伤程度严重但没有休克者大多表现有凝血病

答案：D

14、除颤注意事项中不包括：（ ）

A、除颤操作45秒完成，充电时不中断按压

B、放电时使电极粘着压住患者皮肤

C、放电时所有人员与患者无直接接触

D、检查除颤仪是否完好备用

E、病人及实施电击者未处于金属表面

答案：D

15、小儿惊厥，控制惊厥的首选药物是

A、水合氯醛

- B、冬眠灵
- C、苯巴比妥
- D、地西洋
- E、副醛

答案：D

16、关于创伤性凝血病防治，错误的是（ ）

- A、积极控制活动性出血，稳定后处理原发
- B、实施恰当的休克复苏措施
- C、注意体温检测，防治低体温
- D、早期积极补充凝血底物
- E、警惕继发的高凝状态和血栓形成

答案：A

17、关于高渗性脱水，说法不正确的是（ ）

- A、以丢失水分为主
- B、细胞内脱水严重
- C、Na⁺从细胞外向细胞内
- D、抗利尿激素增加
- E、尿比重增高

答案：C

18、下列不是全身强直—阵挛发作性癫痫持续状态临床表现的是（ ）

- A、突然尖叫一声，跌倒在地
- B、眼球向上凝视、瞳孔散大
- C、恶心、呕吐
- D、全身肌肉强直，上肢伸直或屈曲，手握拳，下肢伸直，头转向一侧或
- E、口吐白沫

答案：C

19、与急性肾小球肾炎预后无关的因素是（ ）

- A、老年
- B、持续高血压
- C、大量蛋白尿
- D、镜下血尿
- E、以上都是

答案：D

20、心肺复苏首先药物

- A、阿托品

- B、肾上腺素
- C、去甲肾上腺素
- D、碳酸氢钠
- E、异丙肾上腺素

答案：B

21、对于严重创伤患者手术次序说法错误的是

A、颅脑伴有其他脏器损伤：根据各器官挫伤轻重程度，按照先重后轻的原则进行处理

B、胸腹联合伤：同台分组行剖胸及剖腹探查术。多数情况下可先作胸腔闭式引流,再行剖腹探查术

C、腹部伤伴其它其他脏器伤：腹腔内实质性脏器及大血管伤，抗休克的同时积极进行剖腹手术，病情平稳后再依次处理其它其他部位损伤

D、骨折：为改善患者预后，无论开放性亦或是闭合性骨折，均应行急诊手术治疗。

答案：D

22、下列哪项不是心肌梗死并发症（）

- A、乳头肌功能失调
- B、心脏破裂
- C、左房粘液瘤
- D、栓塞
- E、心肌梗死后综合征

答案：C

23、预检、分诊点（处）应配物品描述正确的是

- A、体温计（枪）
- B、手卫生设施与用品
- C、个人防护用品
- D、消毒产品
- E、以上都是

答案：E

24、高血压危象患者的血压呈现（）

- A、血压高低不稳
- B、收缩压持续升高
- C、舒张压持续升高，脉压小
- D、收缩压、舒张压均持续升高
- E、以上都是

答案：D

25、有关急性脑血管病的病变部位，下列何者是不正确的

- A、脑血栓形成最易发生在大脑中动脉
- B、脑栓塞以大脑中动脉阻塞最常见
- C、脑出血的血管最多在豆纹动脉
- D、脑桥出血多由基底动脉的旁正中动脉破裂所致
- E、蛛网膜下腔出血以颅内动脉瘤最常见

答案：D

26、导泻药物首选

- A、硫酸镁
- B、硫酸钠
- C、蓖麻油
- D、液体石蜡
- E、聚二醇

答案：B

27、一般事件患者伤亡人数是否增加？

- A、不知道
- B、肯定增加
- C、有可能增加
- D、一般不增加
- E、不再增加

答案：E

28、创伤救治四项技术包括（）

- A、包扎
- B、止血
- C、固定
- D、搬运
- E、以上全对

答案：E

29、无外界刺激而自发地感到某部位有蚁行感称为

- A、感觉减退
- B、感觉倒错
- C、感觉分离
- D、感觉异常
- E、感觉过度

答案：D

30、哪项不是急救转运的搬抬方法？

- A、侧翻法
- B、拖拽法
- C、扶持法
- D、抱持法
- E、背负法

答案：B

31、异位妊娠最常见的着床部位

- A、子宫颈
- B、子宫基层
- C、输卵管
- D、卵巢
- E、腹腔

答案：C

32、用于一般的伤口出血

- A、指压法
- B、压迫包扎法
- C、填塞法
- D、止血带法
- E、直接止血法

答案：B

33、下列关于脑血管病叙述错误的是

- A、是导致人类死亡的三大病因之一
- B、分列城市和农村死亡病因的第一和第二位
- C、寒冷冬季发病率高，尤其是缺血性卒中
- D、男性卒中发病率明显高于女性
- E、种族与脑血管病发病率有关

答案：C

34、对于脑挫裂伤，下列描述正确的是（ ）

- A、脑实质内的挫裂伤，因脑组织的变形和剪应力造成
- B、脑实质内的损伤，以挫伤和点状出血为主
- C、脑表的挫裂伤，多在暴力打击部位与对冲部位
- D、脑表的挫裂伤，由于脑组织在颅腔内的滑动与碰撞造成
- E、以上都正确

答案：E

35、以下哪种病人不属于院前急救范畴？

- A、车祸
- B、摔伤
- C、尿潴留
- D、一氧化碳中毒
- E、电击伤

答案：C

36、哪种情况诊疗器械、器具和物品应进行消毒

- A、进入人体无菌组织
- B、器进入人体官
- C、进入腔隙
- D、接触人体破损黏膜
- E、接触完整皮肤

答案：E

37、单侧闭合性肾损伤病情较轻者需绝对卧床休息（ ）

- A、1~2个月
- B、3~6个月
- C、2~4周
- D、1~2周
- E、2~4个月

答案：C

38、双侧瞳孔散大多见于()

- A、阿托品中毒
- B、水化氯醛中毒
- C、脑出血
- D、吗啡药物中毒
- E、氯丙嗪类中毒

答案：A

39、对休克病人的输液护理，以下不正确的是

- A、接诊休克病人时，应立即做好输液输血准备
- B、选口径大的穿刺针输液
- C、可建立两条以上的静脉通道输液
- D、禁忌静脉切开输液和穿刺置管
- E、准确记录输注液体种类和数量，并每 24 小时总结一次液体出入量

答案：D

40、ARDS 的病理生理不正确的是

- A、肺微血管壁通透性增加
- B、肺内分流减少，从而导致缺氧和二氧化碳潴留
- C、通气血流比例失调
- D、肺间质水肿
- E、肺泡萎陷

答案：B

41、下列哪项是治疗哮喘最有效的药物（）

- A、茶碱类药物
- B、抗胆碱药物
- C、糖皮质激素
- D、 β_2 受体激动剂

答案：C

42、成人心肺复苏中，按压分数（CCF）至少（）是合理的

- A、>50%
- B、>60%
- C、>70%
- D、>40%
- E、>55%

答案：B

43、新生儿分娩后，Apgar 评分为 7 分，属于轻度窒息，下列说法不正确的是（）

- A、清理呼吸道
- B、保暖在辐射台上，应在 $30\sim 32^{\circ}\text{C}$
- C、采用托背法使其建立呼吸
- D、挤压新生儿腹部
- E、吸氧

答案：D

44、完全性右束支传导阻滞，最有特征性的心电图改变是（）

- A、QRS 时限 $\geq 0.12\text{s}$
- B、V1 导联呈 rsR' 型
- C、I、V5、V6 导联呈 qRS 型
- D、I、V5、V6 导联 S 波增宽并有切迹
- E、V1 导联 ST-T 与 QRS 主波方向相反

答案：B

45、通过小切口放血疗法鉴别动静脉危象，静脉危象时一般（）

- A、不出血
- B、出血活跃、呈暗紫色
- C、出新鲜血液
- D、呈苍白色
- E、指腹瘪陷

答案：B

46、小儿心肺复苏按压幅度至少为胸部前后径的

- A、1212122022年1月4日
- B、1212122022年1月3日
- C、1212122022年1月2日
- D、1212122022年3月5日

答案：B

47、地西洋给药会导致（）发生

- A、血氧饱和度升高
- B、呼吸抑制
- C、脑疝
- D、血压升高
- E、心率增快

答案：B

48、患者男，55岁。弯腰搬重物时出现下腹痛，无肛门排便排气2天。既往有多年便秘和腹痛史。查体：全腹胀，左下腹压痛明显，未扪及包块，肠鸣音亢进。直肠指诊阴性。钡剂灌肠只能进入200ml，钡柱尖端呈鸟嘴形。最可能的诊断是

- A、小肠扭转
- B、结肠肿瘤性梗阻
- C、乙状结肠扭转
- D、肠套叠
- E、肠系膜血管栓塞

答案：C

49、糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为

- A、昏迷
- B、皮肤粘膜干燥
- C、呼气有烂苹果味

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745013033322011110>