

---

# 内科学历年真题

## 目录

2015年.....	2
2016年.....	10
2017年.....	18
2018年.....	26
2019年.....	35

---

---

## 2015年

2015N59A男性，56岁，近1个月来反复出现发作性胸部压抑感，自咽喉部放射，持续10分钟左右自行缓解，既往高血压、糖尿病病史，吸烟35年。为明确诊断，不宜进行的检查是

- A.24小时动态心电图                      B.冠状动脉CT  
C.冠状动脉造影                              D.心电图活动平板负荷试验

2015N60A男性，47岁，因健康查体发现心房颤动而入院，平日无心悸感，既往体健，无高血压、糖尿病、甲亢病史。超声心动图检查心脏结构正常，化验血脂正常，对该患者的最佳处理方案是

- A.临床观察                                      B.口服 $\beta$ 受体拮抗剂  
C.射频消融术                                      D.口服阿司匹林

2015N61A男性，53岁，1个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解有高血压病史1年，最高血压达150/90mmHg，吸烟25年，查体：P88次/分，BP130/80mmHg，平卧位，颈静脉充盈，双肺间可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率108次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿（±），首先可排除的疾病是

- A.风湿性心瓣膜病                      B.扩张型心肌病                      C.冠心病                      D.心包积液

2015N62A我国高血压人群个体特点是

- A.盐敏感                                      B.高血糖                                      C.高血脂                                      D.高肾素

2015N63A女性，45岁，呼吸困难、胸痛1个月。胸部B超发现右侧中等量胸腔积液。化验：血性胸水，比重1.020，蛋白定量35g/L，WBC $680 \times 10^6$ /L，ADA25U/L，最可能的诊断是

- A.结核性胸腔积液                      B.癌性胸腔积液  
C.肺炎所致胸腔积液                      D.肺栓塞所致胸腔积液

2015N64A治疗支气管哮喘的缓解药物不包括A.

- 速效吸入的 $\beta_2$ 受体激动剂                      B.短效茶碱  
C.白三烯调节剂                                      D.全身用糖皮质激素

---

2015N65A在整个病理过程中没有肺泡壁和其他结构破坏的肺炎是

- A.肺炎链球菌肺炎                      B.肺炎克雷伯杆菌肺炎  
C.铜绿假单胞菌肺炎                    D.金黄色葡萄球菌肺炎

2015N66A上消化道出血患者粪隐血试验阳性，最少出血量是

- A.5ml                      B.20ml                      C.50ml

D.100ml 2015N67A在急性胰腺炎发病过程中

起关键作用的酶是

- A.淀粉酶                      B.弹力纤维酶                      C.胰蛋白酶                      D.激肽酶

2015N68A女性，20岁，误服有机磷农药半小时家人送来急诊。查体：神志不清，皮肤潮湿多汗，面部肌肉束颤动，瞳孔缩小，双肺布满湿啰音。该患者最可能的中毒程度是

- A.轻度                      B.中度                      C.重度                      D.不能确定

2015N69A下列患无症状细菌尿的病人中，不需要治疗的是

- A.学龄前儿童                      B.老年人                      C.妊娠妇女                      D.肾移植后

2015N70A男性，30岁，上呼吸道感染后3天出现颜面水肿。测血压145/95mmHg。化验尿蛋白(++), 沉渣镜检RBC满视野/HP，偶见颗粒管型；化验Hb100g/L，血Cr250 μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是

- A.血清IgA测定                      B.血清补体测定  
C.肾活检病理检查                      D.肾脏B超检查

2015N71A下列急性白血病患者白血病的细胞镜检时，无Auer小体的类型是A.

- 急性淋巴细胞白血病                      B.急性粒细胞白血病部分分化型  
C.急性早幼粒细胞白血病                      D.急性单核细胞白血病

2015N72A女性，23岁。头晕、乏力、低热、腰痛、恶心5天来诊，有肝炎病史1年。查体：T37.5℃，浅表淋巴结不大，巩膜轻度黄染，脾肋下3cm。化验尿色深，镜下未见红细胞，尿胆原(+)，尿胆红素(-)，血Tbil44.2 μmol/L，Dbil5.2 μmol/L。最可能的诊断是

- A.慢性肝炎急性发作                      B.胆囊炎  
C.急性胰腺炎                      D.溶血性贫血

2015N73A关于糖尿病视网膜病变，下列叙述不正确的是

---

A.当出现增殖性视网膜病变时常合并有糖尿病肾病B.

严格控制血糖有助于延缓视网膜病变的发生和发展C.

严格控制血压有助于延缓视网膜病变的发生和发展D.

当出现视网膜病变时，应尽早行激光治疗

2015N74A经肾脏排泄最少，可在轻中度肾功能不全情况下使用的磺脲类药物是

A.格列本脲            B.格列喹酮            C.格列吡嗪            D.格列美脲

2015N75A在下列表现中，符合皮炎特异性临床表现的是

A.腮腺肿大            B.上眼睑红肿            C.口、眼干            D.雷诺现象

2015N76A下列不属于类风湿关节炎诊断标准的是

A.晨僵            B.关节肿            C.关节畸形            D.类风湿结节

2015N91A男，72岁，因胸痛24h，诊断前壁心梗入院，常规接受药物治疗，入院后第4天，患者再次感心前区疼痛，持续约30min，查体心尖部内侧可闻及收缩中晚期高调短促附加音伴收缩晚期杂音，与呼吸运动无关，患者新出现的附加音最可能是

A.心包摩擦音            B.开瓣音            C.喀喇音            D.第四心音

2015N92A男，72岁，因胸痛24h，诊断前壁心梗入院，常规接受药物治疗，入院后第4天，患者再次感心前区疼痛，持续约30min，查体心尖部内侧可闻及收缩中晚期高调短促附加音伴收缩晚期杂音，与呼吸运动无关，出现该附加音最可能的原因是

A.心力衰竭            B.渗出性心包炎            C.二尖瓣脱垂            D.心室壁瘤

2015N93A女性，75岁，半年来稍活动心悸、气短，1个月来夜间不能平卧，双下肢水肿来院。5年前患前壁心梗，有高血压16年，糖尿病12年，查体：T37.3℃，P88次/分，BP135/60mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向左下扩大，心率120次/分，心律不整，A<sub>2</sub>=P<sub>2</sub>，脉短绌，腹壁厚，肝触诊不满意，双下肢凹陷性水肿（++）。目前选用的治疗药物，不恰当的是

A.洋地黄            B.噻嗪类            C.β受体拮抗剂            D.硝酸酯类

2015N94A女性，75岁，半年来稍活动心悸、气短，1个月来夜间不能平卧，双下肢水肿来院。5年前患前壁心梗，有高血压16年，糖尿病12年，查体：T37.3℃，P88次/分，BP135/60mmHg，半

---

卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向左下扩大，心率120次/分，心律不整， $A_2 = P_2$ ，脉短绌，腹壁厚，肝触诊不满意，双下肢凹陷性水肿（++）。针对患者心律不整应选用的药物是

- A.地高辛      B.普罗帕酮      C.胺碘酮      D.维拉帕米

2015N95A患者检验结果：血WBC $12.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞82%，ALT42U/L，血Cr $264 \mu mol/L$ ，TC4.21mmol/L，LDL-C2.96mmol/L，血K $^+ 4.98mmol/L$ ，Na $^+ 138mmol/L$ ，血糖6.5mmol/L。根据检验结果，该患者应调整的治疗药物中，不恰当的是

- A.增加ACEI      B.改用袢利尿剂      C.加用抗生素      D.增加他汀类制剂

2015N96A女性，45岁。干咳、活动后气短、乏力2个月。2年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部CT提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门纵隔淋巴结无肿大。患者最可能的诊断是

- A.肺结核      B.特发性肺纤维化  
C.结节病      D.结缔组织病相关肺间质病

2015N97A女性，45岁。干咳、活动后气短、乏力2个月。2年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部CT提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门纵隔淋巴结无肿大。对明确诊断意义最大的检查是

- A.肺功能检查      B.结核菌素试验  
C.自身抗体检查      D.支气管镜检查

唐氏解题法：

2015N98A女性，45岁。干咳、活动后气短、乏力2个月。2年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部CT提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门纵隔淋巴结无肿大。药物治疗总疗程一般不少于

- A.1个月      B.2个月      C.3个月      D.6个月

2015N99A男性，56岁。2年来消瘦、乏力，近5天来发热、嗜睡，1天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史20年。查体：T $37.5^{\circ}C$ ，P86次/分，R20次/分，BP120/80mmHg，神志

---

不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下4cm，移动性浊音阳性。

尿常规无异常，化验血Hb110g/L，WBC $3.4 \times 10^9$ /L，Plt $92 \times 10^9$ /L。该患者最可能的诊断是

- A.肺性脑病      B.肝性脑病      C.尿毒症昏迷      D.脑血管意外

2015N100A男性，56岁。2年来消瘦、乏力，近5天来发热、嗜睡，1天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史20年。查体：T $37.5^{\circ}\text{C}$ ，P86次/分，R20次/分，BP120/80mmHg，神志不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下4cm，移动性浊音阳性。尿常规无异常，化验血Hb110g/L，WBC $3.4 \times 10^9$ /L，Plt $92 \times 10^9$ /L。为明确诊断，首选的检查是

- A.肝肾功能      B.血气分析      C.头颅CT      D.血氨

2015N101A男性，56岁。2年来消瘦、乏力，近5天来发热、嗜睡，1天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史20年。查体：T $37.5^{\circ}\text{C}$ ，P86次/分，R20次/分，BP120/80mmHg，神志不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下4cm，移动性浊音阳性。尿常规无异常，化验血Hb110g/L，WBC $3.4 \times 10^9$ /L，Plt $92 \times 10^9$ /L。针对该患者的发病机制，应选择的治疗措施是

- A.降血氨药物如谷氨酸钾      B.纠正水、电解质紊乱  
C.机械通气      D.降颅压治疗

2015N102A55岁，间断水肿1年，加重半个月，伴气短、纳差2天入院。查体：BP150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿：蛋白（++++），尿糖（±），尿沉渣镜检RBC0~2/HP。B超双肾静脉主干有血栓。最可能的诊断是A.

- 糖尿病肾病      B.慢性肾小球肾炎急性发作  
C.高血压肾损害      D.肾病综合征

2015N103A男性，55岁，间断水肿1年，加重半个月，伴气短、纳差2天入院。查体：BP150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿：蛋白（++++），尿糖（±），尿沉渣镜检RBC0~2/HP。B超双肾静脉主干有血栓。肾穿刺检查，最可能的病理结果是A.

- 系膜毛细血管性肾炎      B.结节性肾小球硬化  
C.入球动脉玻璃样变性      D.膜性肾病

---

2015N104A男性, 55岁, 间断水肿1年, 加重半个月, 伴气短、纳差2天入院。查体: BP150/90mmHg, 心肺检查未见异常, 腹软, 肝脾肋下未触及, 双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿: 蛋白(++++) , 尿糖(±), 尿沉渣镜检RBC0~2/HP。B超双肾静脉主干有血栓。最主要的治疗用药是A.

利尿剂            B.糖皮质激素            C.ACEI            D.胰岛素

2015N105A女性, 25岁。无明显诱因月经量增多2个月, 出现牙龈出血2天入院, 既往体健。查体: 胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑, 浅表淋巴结不大, 牙龈少量渗血, 心肺腹检查未见明显异常。化验血: Hb100g/L, RBC $3.3 \times 10^{12}$ /L, WBC $8.2 \times 10^9$ /L, Plt $9 \times 10^9$ /L, 网织红细胞1%。为警惕颅内出血的危险, 查体中还应特别注意的检查是

A.关节肿胀            B.血肿            C.鼻出血            D.口腔血疱

2015N106A女性, 25岁。无明显诱因月经量增多2个月, 出现牙龈出血2天入院, 既往体健。查体: 胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑, 浅表淋巴结不大, 牙龈少量渗血, 心肺腹检查未见明显异常。化验血: Hb100g/L, RBC $3.3 \times 10^{12}$ /L, WBC $8.2 \times 10^9$ /L, Plt $9 \times 10^9$ /L, 网织红细胞1%。该患者最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血            B.Evans综合征  
C.特发性血小板减少性紫癜            D.弥散性血管内凝血

2015N107A女性, 25岁。无明显诱因月经量增多2个月, 出现牙龈出血2天入院, 既往体健。查体: 胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑, 浅表淋巴结不大, 牙龈少量渗血, 心肺腹检查未见明显异常。化验血: Hb100g/L, RBC $3.3 \times 10^{12}$ /L, WBC $8.2 \times 10^9$ /L, Plt $9 \times 10^9$ /L, 网织红细胞1%。为确定诊断, 首选的检查是

A.白细胞分类B.骨髓检查C.抗人球蛋白试验D.凝血功能

2015N108A女性, 72岁。6天前进食后出现腹泻, 呈稀水样, 每日7~8次, 伴恶心、呕吐, 当地医院给予输注葡萄糖等治疗后, 感口干加重、尿量增多。1天来反应迟钝, 淡漠, 既往有脑梗塞病史, 曾有血糖增高史。查体: BP90/50mmHg, 嗜睡状, 呼吸正常, 即刻查血糖35.3mmol/L。该患者最可能的诊断是

A.糖尿病酮症酸中毒            B.高血糖高渗状态

---

C.急性胃肠炎合并脱水                      D.水电解质紊乱

2015N109A女性，72岁。6天前进食后出现腹泻，呈稀水样，每日7~8次，伴恶心、呕吐，当地医院给予输注葡萄糖等治疗后，感口干加重、尿量增多。1天来反应迟钝，淡漠，既往有脑梗塞病史，曾有血糖增高史。查体：BP90/50mmHg，嗜睡状，呼吸正常，即刻查血糖35.3mmol/L。为明确该诊断作进一步检查，最有价值的项目是

A.血浆有效渗透压                      B.尿酮体  
C.血气分析                                D.血电解质

2015N110A女性，72岁。6天前进食后出现腹泻，呈稀水样，每日7~8次，伴恶心、呕吐，当地医院给予输注葡萄糖等治疗后，感口干加重、尿量增多。1天来反应迟钝，淡漠，既往有脑梗塞病史，曾有血糖增高史。查体：BP90/50mmHg，嗜睡状，呼吸正常，即刻查血糖35.3mmol/L。下列的治疗措施中不恰当的是

A.开始24小时补液量可达6000~10000ml  
B.静脉胰岛素输注速度一般为每公斤体重每小时0.1单位  
C.开始可先大量输入低渗盐水  
D.血压偏低，可先给予输血浆

2015N139B亚急性感染性心内膜炎一般不出现的临床表现是

A.贫血                      B.心瓣膜区杂音                      C.脾肿大                      D.环形红斑

2015N140B急性风湿热一般不出现的临床表现是

A.贫血                      B.心瓣膜区杂音                      C.脾肿大                      D.环形红斑

2015N141B对结核分枝杆菌A菌群作用最强的药物是

A.异烟肼                      B.利福平                      C.吡嗪酰胺                      D.乙胺丁醇

2015N142B对结核分枝杆菌B群作用最强的药物是

A.异烟肼                      B.利福平                      C.吡嗪酰胺                      D.乙胺丁醇

2015N143B消化性溃疡患者最常见的并发症是

A.穿孔                      B.出血                      C.幽门梗阻                      D.癌变

2015N144B十二指肠溃疡患者不易发生的并发症是

---

A.穿孔      B.出血      C.幽门梗阻      D.癌变

2015N169X对急性胸痛患者，鉴别急性心肌梗死与主动脉夹层有意义的临床表现有

A.疼痛持续时间      B.合并消化道症状  
C.心肌坏死标记物      D.主动脉瓣区杂音

2015N170X结核菌素试验阴性可见于

A.结核性脑膜炎      B.儿童结核  
C.癌症合并结核      D.营养不良合并结核

2015N171X根除胃幽门螺杆菌治疗时常用的药物包括

A.雷尼替丁      B.奥美拉唑      C.硫糖铝      D.克拉霉素

2015N172X下列属于尿毒症肾性骨营养不良的疾病有

A.纤维囊性骨炎      B.骨生成不良  
C.骨软化症      D.骨硬化症

2015N173X下列凝血因子中，如缺陷可引起APTT延长的有

A.纤维蛋白原      B.凝血酶原      C.凝血因子VII      D.凝血因子

X 2015N174X嗜铬细胞瘤的心血管系统临床表现有

A.间歇性高血压      B.持续性高血压  
C.直立性低血压      D.休克

---

---

## 2016年

2016N59A女性，32岁，患特发性肺动脉高压，可能出现的体征是

- A.心尖搏动呈抬举样                      B.心尖搏动向左侧移位  
C.心尖部可闻及收缩期杂音              D.心底部第二心音逆分裂

2016N60A男，60岁，因一年反复夜间阵发性呼吸困难，2个月心悸、气短、不能平卧、尿少、下肢水肿来院，三年前患广泛前壁心肌梗死。入院查体：T36.7℃，P67次/分，BP120/65mmHg，半卧位、颈静脉充盈、双肺底闻及湿啰音，心界扩大，心律不整，心率98次/分，心音强弱不等，肝肋下2cm，双下肢凹陷性水肿（++），该治疗不宜选用的药物

- A.洋地黄                                      B.华法林  
C.β受体拮抗剂                              D.血管紧张素转化酶抑制剂

2016N61A有关高血压急症治疗原则，不正确的是

- A. 使用静脉制剂快速降压  
B. 60分钟内降压幅度不超过25%  
C. 2~6小时内将血压降至正常水平  
D. 无临床症状及靶器官损害证据者，可采取口服降压治疗

2016N62A女性，36岁。因偶发心悸3天来诊。既往有“预激综合征”，无心动过速史。查体：P80次/分，BP110/70mmHg，双肺（-），心界不大，偶发早搏0~3次/分，心音正常。24小时动态心电图示早发房性期前收缩98次。该患者应首选的治疗方案是

- A.观察病情，暂不用药                      B.应用IC类抗心律失常药  
C.选用钙通道阻滞剂                        D.立即行射频消融术

2016N63A急性肺脓肿停用抗菌药物治疗的指征是

- A.体温正常                      B.痰恶臭味消失                      C.血白细胞正常                      D.胸片显示脓腔消失

---

2016N64A男性，66岁。进行性呼吸困难伴干咳1年，无吸烟史。查体：双下肺可闻及爆裂音，可见杵状指。胸部HRCT提示：双下肺蜂窝状改变。最可能的肺功能指标改变是

- A.FEV<sub>1</sub>/FVC减低      B.TLC减低      C.RV增高      D.DLco增高

2016N65A支气管哮喘急性发作首选治疗方法是

- A.静脉注射氨茶碱      B.雾化吸入异丙托溴胺  
C.雾化吸入沙丁胺醇      D.静脉使用糖皮质激素

2016N66A诊断胃食管反流病最准确的是

- A.食管吞钡X线检查      B.食管测压  
C.24h食管pH监测      D.胃镜

2016N67A临床上服用下列药物时，不影响对幽门螺杆菌病原检测的是

- A.奥美拉唑      B.枸橼酸铋钾      C.米索前列醇      D.呋喃唑酮

2016N68A男，40岁，5年来反复腹痛，腹泻，排便2~4次/日，加重一周，排黏液便，无脓血，便后缓解。查体：腹软，左下腹压痛。便常规RBC(-)，WBC(-)。该患者最可能的诊断是

- A.克罗恩      B.溃疡性结肠炎      C.细菌性痢疾      D.肠易激综合征

2016N69A急性肾小管坏死维持期出现的实验室异常是

- A.血尿素氮与肌酐的比值减低      B.血红蛋白中度以上减低  
C.血钾浓度减低      D.尿钠浓度减低

2016N70A男性，32岁，5天来眼睑及下肢水肿入院。6年前患病毒性乙型肝炎。查体：BP 140/82mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音阳性，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++++)，沉渣镜检RBC2~5/HP。血清白蛋白20g/L。对诊断和治疗最有意义的检查是

- A.24小时尿蛋白定量      B.肝功能和HBsAg检查  
C.血胆固醇测定      D.肾穿刺病理学检查

2016N71A下列外周血化验检查最有助于判断骨髓增生程度的是

- A.血红蛋白测定      B.红细胞计数      C.网织红细胞计数      D.红细胞比容测定

---

2016N72A男性，15岁，左膝外伤后关节肿胀、疼痛2天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者下列实验室检查中最有可能出现的异常是

- A.凝血酶原时间（PT）                      B.活化部分凝血酶时间（APTT）  
C.凝血酶时间（TT）                        D.血纤维蛋白原测定

2016N73A对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合征意义最小的检查是

- A.血糖测定                                    B.尿酮体检查  
C.血气分析检查                              D.血电解质检查

2016N74A男性，31岁，3个月来感全身乏力、手颤，体重下降7kg，4小时前起床时感双下肢不能活动，既往体健，查体：心率120次/分。血K<sup>+</sup>2.7mmol/L，Na<sup>+</sup>140.6mmol/L，Cl<sup>-</sup>105.1mmol/L，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>25.3mmol/L，患者最可能的诊断是

- A.家族性周期麻痹                            B.甲状腺毒症性周期性瘫痪  
C.肾小管酸中毒                              D.原发性醛固酮增多症2016N75A

首发累及近端指间关节，掌指关节和腕关节的风湿性疾病是A.类风湿关节炎

- B.骨关节炎  
C.强直性脊柱炎                              D.系统性红斑狼疮

2016N76A抗ENA抗体谱中不包括的抗体是

- A.抗RNP抗体                                B.抗SSB（La）抗体  
C.抗dsDNA抗体                              D.抗Sm抗体

2016N93A患者男，70岁，3个月前出现活动后胸闷头晕，晕厥，近1周上一层楼即感心前区疼痛，2小时前因再感胸痛伴短暂晕厥来院，既往有糖尿病12年，吸烟35年，查体：P82次/分，Bp100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺（-），心尖搏动抬举样，心界向左下移位，心律整，S<sub>1</sub>低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及3/6收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，A<sub>2</sub><P<sub>2</sub>，下肢不肿。本例最可能的诊断是

- A.肥厚型梗阻性心肌病                      B.主动脉瓣狭窄  
C.不稳定性心绞痛                            D.病态窦房结综合征

---

2016N94A患者男，70岁，3个月前出现活动后胸闷头晕，晕厥，近1周上一层楼即感心前区疼痛，2小时前因再感胸痛伴短暂晕厥来院，既往有糖尿病12年，吸烟35年，查体：P82次/分，Bp 100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺(-)，心尖搏动抬举样，心界向左下移位，心律整，S<sub>1</sub>低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及3/6收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，A<sub>2</sub><P<sub>2</sub>，下肢不肿。对明确诊断意义最大的无创性检查是

- A.常规体表心电图                      B.24小时动态心电图  
C.冠状动脉CT                            D.超声心动图

2016N95A患者男，70岁，3个月前出现活动后胸闷头晕，晕厥，近1周上一层楼即感心前区疼痛，2小时前因再感胸痛伴短暂晕厥来院，既往有糖尿病12年，吸烟35年，查体：P82次/分，Bp 100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺(-)，心尖搏动抬举样，心界向左下移位，心律整，S<sub>1</sub>低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及3/6收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，A<sub>2</sub><P<sub>2</sub>，下肢不肿。为缓解胸痛、头晕，最适宜的治疗是

- A.静脉注射硝酸酯制剂                B.应用β受体阻滞剂  
C.介入治疗                                D.心脏瓣膜置换术

2016N96A男性，75岁，反复咳嗽，咳痰，喘息30年，活动后气短2年，加重1周。既往高血压病史25年，吸烟史30年，平均1包/日，已戒烟2年，查体：R22次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干鸣音。双下肺可闻及少许湿性啰音。该患者最可能的诊断

- A.慢性阻塞性肺疾病                    B.支气管扩张症  
C.支气管哮喘                            D.慢性心衰

2016N97A男性，75岁，反复咳嗽，咳痰，喘息30年，活动后气短2年，加重1周。既往高血压病史25年，吸烟史30年，平均1包/日，已戒烟2年，查体：R22次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干鸣音。双下肺可闻及少许湿性啰音。下列检查对诊断意义最大

- A.胸部HRCT                      B.肺功能                      C.血气分析                      D.超声心动图

2016N98A男性，75岁，反复咳嗽，咳痰，喘息30年，活动后气短2年，加重1周。既往高血压病史25年，吸烟史30年，平均1包/日，已戒烟2年，查体：R22次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干鸣音。双下肺可闻及少许湿性啰音。应采取的措施

A.口服利尿剂 B.静脉应用糖皮质激素

C.吸入支气管舒张剂 D.口服祛痰药

2016N99A女性，26岁，腹胀、腹痛伴低热、盗汗3个月。查体：腹部移动性浊音（+），化验血HBsAg（+），腹水常规：比重 $>1.023$ ，蛋白 $38\text{g/L}$ ，WBC $610\times 10^6/\text{L}$ ，单核细胞百分比80%。该患者最可能的诊断是

A.肝硬化合并自发性腹膜炎 B.结核性腹膜炎

C.肝炎后肝硬化失代偿期 D.肝癌腹膜转移

2016N100A女性，26岁，腹胀、腹痛伴低热、盗汗3个月。查体：腹部移动性浊音（+），化验血HBsAg（+），腹水常规：比重 $>1.023$ ，蛋白 $38\text{g/L}$ ，WBC $610\times 10^6/\text{L}$ ，单核细胞百分比80%。下列检查结果支持上述诊断的是

A.腹水腺苷脱氨酶（ADA） $79.5\text{U/LB}$ .血清-腹水白蛋白梯度（SAAG） $12\text{g/LC}$ .腹

水病理检查见到癌细胞

D.腹水培养见到来自肠道的革兰阴性菌

2016N101A女性，26岁，腹胀、腹痛伴低热、盗汗3个月。查体：腹部移动性浊音（+），化验血HBsAg（+），腹水常规：比重 $>1.023$ ，蛋白 $38\text{g/L}$ ，WBC $610\times 10^6/\text{L}$ ，单核细胞百分比80%。该患者最宜选用的治疗是

A.对症治疗 B.广谱抗生素 C.抗结核 D.抗癌

2016N102A男，21岁，肉眼血尿伴少尿6天入院。2周前有咽痛、发热。既往体健。查体：BP  $156/95\text{mmHg}$ ，皮肤黏膜未见出血和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿常规，蛋白（++），沉渣RBC $50\sim 60/\text{HP}$ ，血肌酐 $156\ \mu\text{mol/L}$ ，尿素氮 $11\text{mmol/L}$ 。该患者最可能诊断A.

急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.IgA肾病

D.肾病综合征

2016N103A男，21岁，肉眼血尿伴少尿6天入院。2周前有咽痛、发热。既往体健。查体：BP  $156/95\text{mmHg}$ ，皮肤黏膜未见出血和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿常规，蛋白（++），沉渣RBC $50\sim 60/\text{HP}$ ，血肌酐 $156\ \mu\text{mol/L}$ ，尿素氮 $11\text{mmol/L}$ 。行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是

A.系膜增生性肾小球肾炎 B.微小病变性肾小球肾炎

C.毛细血管内增生性肾小球肾炎 D.新月体性肾小球肾炎

2016N104A男，21岁，肉眼血尿伴少尿6天入院。2周前有咽痛、发热。既往体健。查体：BP 156/95mmHg，皮肤黏膜未见出血和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿常规，蛋白（++），沉渣RBC50~60/HP，血肌酐 $156\mu\text{mol/L}$ ，尿素氮 $11\text{mmol/L}$ 。该患者目前不宜选用的治疗是

A.限制盐的摄入 B.利尿治疗  
C.降压治疗 D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗

2016N105A男性，35岁，牙龈出血，皮肤瘀斑及间断流鼻血10天入院。既往体健。化验血常规：Hb $64\text{g/L}$ ，WBC $10.5\times 10^9/\text{L}$ ，PLT $26\times 10^9/\text{L}$ 。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒POX染色强阳性的细胞，部分可见成堆Auer小体，计数此种细胞占65%。此患者最可能的诊断是

A.急性淋巴性白血病 B.急性早幼粒性白血病  
C.急性单核细胞性白血病 D.急性巨核细胞性白血病

2016N106A男性，35岁，牙龈出血，皮肤瘀斑及间断流鼻血10天入院。既往体健。化验血常规：Hb $64\text{g/L}$ ，WBC $10.5\times 10^9/\text{L}$ ，PLT $26\times 10^9/\text{L}$ 。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒POX染色强阳性的细胞，部分可见成堆Auer小体，计数此种细胞占65%。支持上述诊断的细胞免疫学表型是

A.CD10阳性，CD19阳性 B.CD13阳性，HLA-DR阳性  
C.CD13阳性，HLA-DR阴性 D.CD41阳性，CD61阳性

2016N107A男性，35岁，牙龈出血，皮肤瘀斑及间断流鼻血10天入院。既往体健。化验血常规：Hb $64\text{g/L}$ ，WBC $10.5\times 10^9/\text{L}$ ，PLT $26\times 10^9/\text{L}$ 。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒POX染色强阳性的细胞，部分可见成堆Auer小体，计数此种细胞占65%。此患者最易得的并发症

A.高尿酸性肾病 B.弥散性血管内凝血  
C.严重感染 D.中枢神经系统白血病

2016N108A男性，34岁，口渴，多尿，乏力2个月，1天前外出饮酒，饱餐后，上述症状加重伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚，急诊入院。既往有乙型肝炎病史。入院查体：BP $85/50\text{mmHg}$ ，神志恍惚，皮肤黏膜干燥，心率 $104\text{次/分}$ ，四肢发凉。该患者应首先考虑的诊断是

A.急性重症胰腺炎 B.急性食物中毒

---

C.糖尿病酮症酸中毒                      D.肝性脑病

2016N109A男性，34岁，口渴，多尿，乏力2个月，1天前外出饮酒，饱餐后，上述症状加重伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚，急诊入院。既往有乙型肝炎病史。入院查体：BP85/50mmHg，神志恍惚，皮肤黏膜干燥，心率104次/分，四肢发凉。为明确诊断，最主要的检查是

A.血淀粉酶                      B.血糖及尿酮体                      C.血氨                      D.血渗透压

2016N110A男性，34岁，口渴，多尿，乏力2个月，1天前外出饮酒，饱餐后，上述症状加重伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚，急诊入院。既往有乙型肝炎病史。入院查体：BP85/50mmHg，神志恍惚，皮肤黏膜干燥，心率104次/分，四肢发凉。该患者急诊应急处理正确的是

A.快速静脉输入生理盐水                      B.即刻使用去甲肾上腺素  
C.静脉输入葡萄糖                      D.静脉输入支链氨基酸

2016N139B女，70岁，冠心病患者，行6分钟步行实验结果为425米，该患者心功能分级为A.重度心功能不全                      B.中度心功能不全  
C.轻度心功能不全                      D.心功能正常

2016N140B男性，45岁，扩张性心肌病患者，行6分钟步行试验结果为145米，该患者的心功能为

A.重度心功能不全                      B.中度心功能不全  
C.轻度心功能不全                      D.心功能正常

2016N141B肺栓塞患者出现低氧血症最主要的机制

A.肺泡通气量下降                      B.弥散障碍  
C.通气/血流比例失调                      D.肺内分流

2016N142BCOPD患者出现低氧血症最主要的机制是

A.肺泡通气量下降                      B.弥散障碍  
C.通气/血流比例失调                      D.肺内分流

2016N143B在我国最易引起原发性肝癌的肝硬化类型是

A.病毒性肝硬化                      B.酒精性肝硬化  
C.淤血性肝硬化                      D.原发性胆汁性肝硬化

---

2016N144B肝脏明显缩小的肝硬化类型是

- A.病毒性肝炎后肝硬化                      B.酒精性肝硬化  
C.淤血性肝硬化                                D.原发性胆汁性肝硬化

2016N169X感染性心内膜炎接受人工瓣膜适应证有

- A.伴急性心肌梗死                            B.严重瓣膜致左心衰竭  
C.真菌性心内膜炎                            D.赘生物直径大于

10mm

2016N170XHIV/AIDS并发肺结核的特点

- A.结核菌素试验常阴性                      B.肺下叶病变多见  
C.容易出现空洞                                D.出现药物不良反应多见

2016N171X下列药物中毒中血液透析有效的是

- A.苯巴比妥                      B.茶碱                      C.水杨酸                      D.有机磷中毒

2016N172X下列属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有

- A.糖尿病肾病                                  B.肾淀粉样变性  
C.过敏性紫癜肾炎                              D.系统性红斑狼疮肾炎

2016N173X符合重型再生障碍性贫血血象诊断标准的有

- A. Hb < 90g/L  
B.网织红细胞 <  
15×10<sup>9</sup>/L  
C.中性粒细胞 <  
0.5×10<sup>9</sup>/L  
D.血小板 < 20×10<sup>9</sup>/L

2016N174XGraves眼病活动期的指标是

- A.眼球活动性疼痛                              B.突眼度  
C.复视    D.结膜充血



---

---

## 2017年

2017N43A医院获得性肺炎最常见的致病菌是

- A.革兰阳性杆菌
- B.革兰阴性杆菌
- C.革兰阳性球菌
- D.革兰阴性球菌

2017N44A男性，46岁，发热伴咳嗽、咳痰3天，右侧胸痛2天，既往“关节炎”病史，查体：T38.7℃，右下肺呼吸音减低，可闻及少许湿啰音，胸片提示右侧胸腔积液，胸水示：白细胞 $15,000 \times 10^6/L$ ，单核10%，pH6.9，LDH986U/L，ADA90U/L。胸腔积液最可能是

- A.结核性胸膜炎
- B.肺癌
- C.类风湿关节炎
- D.脓胸

2017N45A男性患者，72岁，慢性咳嗽、咳痰20年。活动后呼吸困难3年，加重1周。既往吸烟史50年。血气分析提示 $PO_2 50\text{mmHg}$ ， $PCO_2 68\text{mmHg}$ 。患者出现呼吸衰竭最主要的机制是

- A.通气/血流比例失调
- B.肺泡通气量下降
- C.弥散功能障碍
- D.肺内分流

2017N46A女，48岁，胸闷，咳嗽4个月，无发热。胸部CT提示双侧肺门、纵隔淋巴结肿大，伴双肺网格影及小结节影，双下肺少许蜂窝状改变。支气管镜检查提示支气管黏膜呈铺路石样改变，支气管肺泡灌洗液检查最可能的结果是

- A.中性粒细胞比例升高
- B.淋巴细胞比例升高且 $CD4^+/CD8^+$ 比值增高
- C.淋巴细胞比例升高且 $CD4^+/CD8^+$ 比值降低
- D.嗜酸性粒细胞比例升高

2017N47A下列关于血浆脑钠肽（BNP）叙述正确的是

- A.主要来源左心房
- B.左心室功能不全可明显增高
- C.增高可提示存在心肌损伤
- D.快速心房颤动时明显增高

---

2017N48A男，56岁，一个月3次夜间睡觉中因突发心前区疼痛而惊醒，伴出汗，咽部发紧，呼吸不畅，持续10分钟自行缓解，白天活动正常，既往发现血压升高1年，未治，吸烟20年。查体：P60/分，BP160/80 双肺正常，心率整，心音正常，双下肢不肿，首选降压治疗药物

- A.血管紧张素转换酶抑制剂                      B.血管紧张素 II 受体拮抗剂  
C.钙通道阻滞剂                                      D.β 受体拮抗剂

2017N49A男性，65岁。因心力衰竭2年来院。查体:口唇稍发绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿罗音，心界向两侧扩大，心律整，心率76次/分，双下肢凹陷性水肿（+）。心电图示窦性心律，完全性左束支传导阻滞，超声心动图示左心室扩大，室壁弥漫性运动减弱伴运动不协调，LVEF32%。该患者治疗的最佳方案是

- A.长期使用醛固酮受体拮抗剂                      B.联合使用正性肌力药及血管扩张药  
C.联合使用β受体阻滞剂和利尿剂                      D.CRT

2017N50A阿司匹林引起NSAID溃疡的最主要致溃疡机制是A.

- 抑制COX-1    B.抑制COX-2  
C.同时抑制COX-1和COX-2                                      D.局部作用

2017N51A原发性肝癌早期的转移方式主要是

- A.肝外血行转移                      B.淋巴转移                      C.种植转移                      D.肝内转移

2017N52A男性，53岁，肝硬化病史8年。5天来无明显原因出现腹胀，腹水迅速增加，脾脏进一步增大，体温正常。最可能发生的并发症是

- A.原发性肝细胞癌                                      B.原发性腹膜炎  
C.门静脉血栓形成                                      D.肝肾综合征

2017N53A男性，25岁，因肉眼血尿2天就诊，三天前有上呼吸道感染。既往体健。查体，血压BP 125/85mmHg。皮肤黏膜未见出血点和紫癜，心肺腹检查未见异常。化验尿常规蛋白++，沉渣镜检RBC满视野/HP，WBC0-3/HP，血常规Hb105g/L，WBC6.0~10<sup>9</sup>/L，PLT210×10<sup>9</sup>/L，血肌酐120umol/L。该患者可能诊断为

- A.急性肾小球肾炎                                      B.急进性肾小球肾炎  
C.IgA肾病    D.肾病综合征

---

2017N54A下列检查结果支持溶血性贫血的是

- A.尿中尿胆原排泄减少                      B.血清非结合胆红素减少  
C.血清结合珠蛋白减少                      D.血网织红细胞减少

2017N55A临床诊断 I 型糖尿病的主张依据是

- A.年轻人表现典型的三多一少症状      B.反复出现酮症  
C.胰岛素分泌曲线低平                      D.早期使用胰岛素

2017N56A下列药物属于治疗风湿病情的药物是

- A.阿司匹林              B.环孢素              C.醋酸泼尼松              D.塞来昔布

2017N70A女性，42岁。2个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率110次/分。血常规：Hb72g/L，MCV124fl，MCH40pg，MCHC330g/L，Ret1.0%，WBC $3.4 \times 10^9/L$ ，Plt $85 \times 10^9/L$ 。该患者可能的诊断是

- A.缺铁性贫血                                      B.巨幼细胞性贫血  
C.再生障碍性贫血                                D.溶血性贫血

2017N71A女性，42岁。2个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率110次/分。血常规：Hb72g/L，MCV124fl，MCH40pg，MCHC330g/L，Ret1.0%，WBC $3.4 \times 10^9/L$ ，Plt $85 \times 10^9/L$ 。该患者还有可能出现的症状有

- A.牛肉样舌              B.匙状甲              C.皮肤瘀斑              D.肝脾肿大

2017N72A女性，42岁。2个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率110次/分。血常规：Hb72g/L，MCV124fl，MCH40pg，MCHC330g/L，Ret1.0%，WBC $3.4 \times 10^9/L$ ，Plt $85 \times 10^9/L$ 。最可能支持该患者诊断的骨髓象是

- A.浆细胞增多              B.粒红倒置              C.核老浆幼              D.核幼浆老

2017N73A女性，45岁，术后卧床3天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA诊断为肺栓塞。查体：R24次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清， $P_2 > A_2$ ，左下肢肿胀。该患者最可能的血气分析结果

- A.PaO<sub>2</sub>降低，PaCO<sub>2</sub>降低                      B.PaO<sub>2</sub>降低，PaCO<sub>2</sub>升高  
C.PaO<sub>2</sub>正常，PaCO<sub>2</sub>降低                      D.PaO<sub>2</sub>正常，PaCO<sub>2</sub>升高

---

2017N74A女性，45岁，术后卧床3天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA诊断为肺栓塞。查体：R24次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清， $P_2 > A_2$ ，左下肢肿胀。下列情况，对决定患者是否采取溶栓治疗意义最大的是

- A.低氧血症程度
- B.血压与右心功能情况
- C.呼吸困难程度
- D.发病时间长短

2017N75A女性，45岁。术后卧床3天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA诊断为肺栓塞。查体：R24次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清， $P_2 > A_2$ ，左下肢肿胀。该患者抗凝治疗的疗程是

- A.3~6月
- B.大于6个月，少于12个月
- C.12~24个月
- D.终身接受抗凝治疗

2017N76A男性，46岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟25年。查体：T37.8、H104、R18、血压95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿啰音，心界向两侧扩大，心率齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下2（cm），下肢凹陷性水肿（++）。最有可能的诊断

- A.扩张型心肌病
- B.急性心肌炎
- C.心包积液
- D.心力衰竭

2017N77A男性，46岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟25年。查体：T37.8、H104、R18、血压95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿啰音，心界向两侧扩大，心率齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下2（cm），下肢凹陷性水肿（++）。为明确诊断，最有意义的检查是

- A.X线胸片
- B.心电图
- C.超声心动图
- D.心肌损伤标志物检测

2017N78A男性，46岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟25年。查体：T37.8、H104、R18、血压95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿啰音，心界向两侧扩大，心率齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下2（cm），下肢凹陷性水肿（++）。对该患者采取最关键的治疗措施是

- A.应用正性肌力药物
- B.应用静脉血管舒张剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747130104165006061>