

## 口服给药法作业习题

### 一、选择题

#### 单选题

1. 执行给药原则中，哪项是最重要的( )  
A. 遵医嘱给药      B. 给药途径要准确      C. 给药时间要准确      D. 注意用药不良反应      E. 给药中要经常观察疗效
2. 服磺胺药物需多饮水的目的是( )  
A. 避免损害造血系统      B. 减轻服药引起的恶心      C. 避免尿中析出结晶      D. 避免影响血液酸碱度      E. 增加药物疗效
3. 服用毛地黄制剂的病人（成人），心率每分钟少于多少次时不可使用( )  
A. 30 次 / 分钟      B. 40 次 / 分钟  
C. 50 次 / 分钟      D. 60 次 / 分钟  
E. 70 次 / 分钟
4. 护士发药时，下列哪项做法不符合要求( ...)  
A. 服铁剂药后需漱口      B. 危重病人及小儿应喂服      C. 服毛地黄前需测心率      D. 服安眠药应防成瘾      E. 遇病人有疑问时，应说服其服药
5. 剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是( )

- A. 药名用中、外文对照      B. 装密封瓶中保存  
C. 应加锁并认真交班  
D. 于阴凉处存放      E. 药物分类放置
6. 应避免与牙齿接触的药物是 (    )
- A. 止咳合剂      B. 棕色合剂  
C. 1%稀盐酸      D. 碳酸氢钠  
E. 颠茄合剂

### 多选题

1. 药物在保管时，药瓶的标签上应标明 (    )
- A.浓度      B.剂量      C.名称      D.不良反应  
E.禁忌证
2. 容易氧化和遇光变质药物保存时应 (    )
- A.远离明火处      B.装入有色瓶中      C.放阴凉处  
D.应放在冰箱内  
E.加盖密封
3. 应放入冰箱内保存的药物有 (    )
- A.地塞米松      B.破伤风抗毒素      C.胎盘球蛋白  
D.胰岛素      E.氢化可的松
4. 分发药物时应做到 (    )
- A.发给患者后离开      B.仔细查对患者与药物  
C.向病人解释眼药方法

D.病人不在，查对正确放床头柜上 E.危重病人帮助服药

## 二、问答题

(一) 三查七对一注意的内容是什么？

(二) 简述药疗的原则。

## 注射法作业习题

### 一、选择题

#### 单选题

1. 婴儿接种卡介苗正确的部位及方法  
( )

A. 前臂掌侧下段，皮内注射    B. 三角肌下缘，皮内注射  
C. 三角肌下缘，皮下注射    D. 三角肌，肌肉注射  
E. 股外侧，皮下注射

2. 臀大肌注射的连线定位法正确的一项是  
( )

A. 髂嵴和尾骨联线的外上 1 / 3 处    B. 髂嵴和尾骨联线的下 1 / 3 处  
C. 髂前上棘和尾骨联线的中 1 / 3 处    D. 髂前上棘和尾骨联线的下 1 / 3 处  
E. 髂前上棘和尾骨联线的外上 1/3 处

3. 为 2 岁以下婴幼儿作肌肉注射的不恰当

做法是（ ）

- A. 宜选用臀大肌
- B. 注射时固定肢体，以防断针
- C. 切勿把针梗全部刺入
- D. 需长期注射者，注射部位应交替更换
- E. 两种药物同时注射时，需注意配伍禁忌

4. 为某病员静脉推注高渗葡萄糖时有阻力，但无肿胀，抽之有回血，用局部热敷无效应考虑是（ ）

- A. 针头滑出血管外
- B. 针头部分阻塞
- C. 针头斜面紧贴血管壁
- D. 针头斜面一部分穿透下面血管壁
- E. 静脉痉挛

5. 股静脉的穿刺部位在（ ）

- A. 股动脉内侧
- B. 股动脉外侧
- C. 股神经内侧
- D. 股神经外侧
- E. 股神经和股动脉之间

6. 两岁以下的婴幼儿肌肉注射时最好选用（ ）

- A. 臀大肌
- B. 股外侧肌
- C. 臀中、小肌
- D. 前臂外侧
- E. 上臂三角肌

7. 下列哪项不符合无痛注射法（ ）

- A. 分散病人的注意力
- B. 使肌肉松弛
- C. 注射时做到“二快一慢”
- D. 注射刺激强的药浓针头要长

E. 先注射刺激性强的药物，后注射刺激性弱的药物

8. 有关皮内注射的论述，哪项是错误的（ ）

A. 部位是前臂掌侧 B. 消毒忌用碘酊

C. 进针角度为5度

D. 拔针时勿按压 E. 只用于药物过敏试验

9. 灭菌注射器及针头哪部分手可接触（ ）

A. 针尖 B. 活塞 C. 乳头 D. 针梗

E. 针栓

10. 各种注射的定位法哪项是对的（ ）

A. 臀大肌注射法→髂嵴和尾骨联线的外上1/3

B. 皮内（ID）→前臂掌侧上段

C. 皮下（H）→肩峰下2~3横指的三角肌处

D. 股静脉→股三角区外上方

E. 臀中肌注射法→髂前上棘外侧三横指处

### 多选题

1. 为小儿作肌肉注射应（ ）

A. 固定针梗部位 B. 防止针头脱出、药

- 液外流 C. 不可选择臀小肌注射  
D. 必要时可快进针、快射药 E. 可选择臀大肌注射
2. 静脉注射选择的血管应 ( )  
A. 较粗直 B. 靠关节处 C. 弹性好  
D. 靠静脉瓣处  
E. 无脂肪肌肉处
3. 肌肉注射部位应选择 ( )  
A. 肌肉较肥厚 B. 远离大神经  
C. 远离大血管  
D. 皮肤无发炎、化脓、硬结 E. 无皮肤病处
4. 皮下注射部位 ( )  
A. 上臂三角肌下缘 B. 上臂外侧 C. 腹部  
D. 后背 E. 大腿外侧方

## 二、问答题

- (一) 阐述注射原则.
- (二) 在静脉注射的过程中, 应注意哪些事项?
- (三) 静脉注射常见的失败原因有哪些
- (四) 2 岁以下婴幼儿为何不宜选臀大肌注射?

## 过敏试验作业习题

### 选择题

#### 单选题

1. 引起青霉素过敏反应的生物活性介质中，错误的是（ ）

A 组织胺 B 缓激肽 C 白三烯 D 5-羟色胺 E 多巴胺

2. 青霉素过敏性休克的临床表现中，不符的是（ ）

A. 呼吸道阻塞症状 B. 循环衰竭症状 C. 发热、关节疼痛症状

D. 中枢神经系统症状 E. 皮肤过敏症状

3. 青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是（ ）

A. 立即通知医生抢救 B. 静脉注射 0.1% 盐酸肾上腺素

C. 立即停药，平卧，皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素

D. 立即吸氧，行胸外心脏按摩

E. 静脉输液，给氢化考的松

4. 引起青霉素过敏性休克的抗体是（ ）

A. IgA B. IgM C. IgG D. IgE E. IgD

5. TAT 需重做皮试的时间是（ ）

A. 停药 1 天 B. 停药 3 天 C. 停药 7 天 D.

停药 14 天 E. 停药 20 天

6. 以下应做青霉素过敏试验的项目中哪项不符 ( )

A. 首次使用青霉素 B. 停止使用青霉素 24h, 需再用时

C. 停止使用青霉素三天后, 需再用时

D. 在青霉素使用过程中, 更换批号时

E. 在青霉素使用过程中, 转换医院后需再用时

7. 患者张某, 患股部脓肿, 需用青霉素治疗, 在做青霉素皮试时突然发生

了过敏性休克, 其原因是 ( )

A. 病人体内已有特异性抗体 B. 病人对青霉素耐受性差

C. 病人从未接触过青霉素 D. 青霉素剂量过大

E. 病人对青霉素分子过于敏感

8. 关于青霉素使用时的注意点, 哪项是错误的 ( )

A. 先作皮试, 阴性者方可注射 B. 皮试后护士须守候观察病人 15~20 分钟

C. 停用一周需再用时, 要重作皮试 D. 确为阳性, 要做阳性标记

E. 注射时应备盐酸肾上腺素

9. 过敏性休克出现中枢神经系统症状是由



于（ ）

- A. 肺水肿
- B. 有效循环血量锐减
- C. 脑组织缺氧
- D. 肾功能衰竭
- E. 毛细血管扩张，通透性增加

10. 青霉素过敏性休克，以下哪些临床表现不是因循环衰竭而引起（ ）

- A. 紫钳
- B. 血压下降
- C. 脉搏细弱
- D. 面色苍白、出冷汗
- E. 幻觉、谵妄

### 多选题

1. 使用青霉素引起血清病型反应的表现有（ ）

- A. 胸闷气短
- B. 脉细弱，血压下降
- C. 发热、关节肿疼
- D. 皮肤瘙痒、荨麻疹
- E. 淋巴结肿大、腹痛

2. 过敏性休克出现中枢神经系统症状的表现是（ ）

- A. 胸闷、气促
- B. 头晕、眼花
- C. 脉细弱，血压下降
- D. 意识丧失
- E. 面部及四肢麻木

3. 做过敏试验前应询问的内容是（ ）

- A. 用药史
- B. 过敏史
- C. 现病史

D. 家族史 E. 生活史

4. 抢救过敏性休克时，使用肾上腺素的目的是（ ）

A. 升高血压 B. 收缩血管，减低其通透性 C. 兴奋心肌，增加心输出量  
D. 松弛支气管平滑肌 E. 脱敏

5. 发生药物过敏性休克时，病人表现胸闷，气促伴濒死感是由于以下哪些原因引起（ ）

A. 脑缺氧 B. 循环衰竭 C. 喉水肿  
D. 心力衰竭 E. 肺水肿

## 二、问答题

（一）如何观察青霉素过敏试验阳性结果？

（二）青霉素过敏性休克有哪些临床表现？

（三）综合分析题

患者王三妹，体温  $39^{\circ}\text{C}$ ，诊断为化脓性扁桃腺炎。医嘱肌肉注射青霉素 80 万 u q6h，护士在做青霉素皮试后约 5 分钟，病人突然感到胸闷、气促，面色苍白，出冷汗，脉细弱，测血压 10.66/6.67kpa，呼之不应，请问王三妹是什么情况？如何急救？

。



## 口服给药法作业习题答案

### 一、选择题

#### 单选题

1. 执行给药原则中，哪项是最重要的  
( A )
  - A. 遵医嘱给药
  - B. 给药途径要准确
  - C. 给药时间要准确
  - D. 注意用药不良反应
  - E. 给药中要经常观察疗效

2. 服磺胺药物需多饮水的目的是  
( C )

- A. 避免损害造血系统
- B. 减轻服药引起的恶心
- C. 避免尿中析出结晶
- D. 避免影响血液酸碱度
- E. 增加药物疗效

3. 服用毛地黄制剂的病人（成人），心率每分钟少于多少次时不可使用( D )

- A. 30 次 / 分钟
- B. 40 次 / 分钟
- C. 50 次 / 分钟
- D. 60 次 / 分钟
- E. 70 次 / 分钟

4. 护士发药时，下列哪项做法不符合要求  
( E. ..)

- A. 服铁剂药后需漱口
- B. 危重病人及小儿应喂服
- C. 服毛地黄前需测心率
- D. 服安眠药应防成瘾
- E. 遇病人有疑问时，应说服其服药

5. 剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是  
( C )

- A. 药名用中、外文对照

- B. 装密封瓶中保存
  - C. 应加锁并认真交班
  - D. 于阴凉处存放
  - E. 药物分类放置
6. 应避免与牙齿接触的药物是 ( C )
- A. 止咳合剂
  - B. 棕色合剂
  - C. 1%稀盐酸
  - D. 碳酸氢钠
  - E. 颠茄合剂

### 多选题

1. 药物在保管时，药瓶的标签上应标明 ( ABC )
- A.浓度
  - B.剂量
  - C.名称
  - D.不良反应
  - E.禁忌证
2. 容易氧化和遇光变质药物保存时应 ( BCE )
- A.远离明火处
  - B.装入有色瓶中

C.放阴凉处

D.应放在冰箱内

E.加盖密封

3. 应放入冰箱内保存的药物有（ BCD ）

A.地塞米松

B.破伤风抗毒素

C.胎盘球蛋白

D.胰岛素

E.氢化可的松

4. 分发药物时应做到（ BCE ）

A.发给患者后离开

B.仔细查对患者与药物

C.向病人解释眼药方法

D.病人不在，查对正确放床头柜上

E.危重病人帮助服药

## 二、问答题

（一）三查七对一注意的内容是什么？

三查：操作前、操作中、操作后查。

七对：对床号、姓名、药名、浓度、剂量、方法、时间。

注意：注意用药后

（二）简述药疗的原则。

药疗的原则：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748014021141006033>