

急诊科诊疗指南考核试题题库

一、选择题

1.男，54岁。发作性胸痛3天，于劳累时发作，休息5分钟可缓解，每天发作3-4次，最近2小时内上述症状发作2次，每次持续20分钟。该病人最恰当的处理措施是（ ）[单选题] *

- A.门诊预约超声心动图检查
- B.立即收住院行心电图运动负荷试验
- C.门诊预约动态心电图
- D.立即收住院监测心电图和血钙蛋白✓

2.女性，20岁，胸痛气短半月。胸部透视显示左侧胸腔积液平第四肋间。在B超定位下行胸穿，送胸水常规检查：Rivalta 试验阳性，白细胞 $600 \times 10^6/L$ ，腺苷脱氨酶 $100U/L$ ，最可能的诊断是（ ）[单选题]

- A.癌性胸腔积液
- B.结核性胸腔积液✓
- C.化脓性胸腔积液
- D.丝虫病性胸水

3.男，20岁。发热，咯黄色脓痰4天。查体：T $39.2^{\circ}C$ ，右肺闻及湿罗音。胸部X线片示右肺下叶大片致密影。血 WBC $19 \times 10^9/L$ 给予抗生素治疗，2天后症状加重，出现胸痛并呼吸困难，右肺呼吸音明显降低，胸片显示右侧胸腔积液。最可能的诊断是（ ）[单选题] *

- A.肺炎合并肺脓肿
- B.肺炎合并肺炎旁胸腔积液✓
- C.结核性渗出性胸膜炎

D.肺癌合并胸腔积液

4.女,69岁。突发胸骨后压榨样疼痛6小时,持续不缓解。查体:BP:160/70mmHg,心率97次/分。

心电图示V1-V5导联ST段水平压低0.3-0.5mv。实验室检查:血清肌钙蛋白I增高。该病人不宜采取的治疗是() [单选题] *

A.静脉滴注硝酸甘油

B.皮下注射低分子肝素

C.嚼服阿司匹林

D.静脉滴注尿激酶✓

5.患者,男性,70岁。阵发性胸痛5年,发作时心尖部可闻及3/6收缩期吹风样杂音,症状缓解后消

失,最可能原因是() [单选题] *

A.二尖瓣腱索破裂

B.合并风湿性心脏瓣膜病

C.乳头肌功能不全✓

D.二尖瓣环扩张

6.男,56岁。2年间断出现活动时胸闷,休息后可缓解,近4个月无胸闷发作。查体:BP:120/80mmHg,

心率72次/分,心脏瓣膜区未闻及杂音。最有助于明确诊断的检查是() [单选题] *

A.心电图运动负荷试验✓

B.动态心电图

C.超声心动图

D.胸部X线片

7.男性,54岁。1年前日常活动后出现胸骨后疼痛,每日2-3次,近2个月发作次数增多,每日5-6

次,轻微活动也能触发,发作时心电图ST段呈一过性水平压低,应诊断为() [单选题] *

- A.稳定型心绞痛
- B.不稳定型心绞痛✓
- C.变异型心绞痛
- D.急性心肌梗死

8.男,50岁。劳累时胸痛2年,每于上3层楼梯时症状发作,含服硝酸甘油1-3分钟可缓解。既往高血压病史5年,糖尿病病史4年。可改善该病人预后的治疗措施是() [单选题] *

- A.长期口服他汀类药物✓
- B.长期口服营养心肌类药物
- C.冠状动脉支架植入术
- D.皮下注射低分子肝素

9.急性心肌梗死病人发病24小时内死亡的主要原因是() [单选题] *

- A.低血压
- B.心脏破裂
- C.心力衰竭
- D.心律失常✓

10.男,65岁。急性前壁心肌梗死3小时,既往高血压、糖尿病史,平时血压(140-150)/(70-80) mmHg。查体:BP:90/70mmHg,双肺呼吸音清,心率85次/分,律齐。该病人血压降低的最可能原因是() [单选题] *

- A.主动脉壁硬化
- B.大动脉弹性降低
- C.心脏每搏输出量降低✓
- D.外周阻力降低

11.男，68岁。近2年反复出现发作性心悸，伴头晕，黑朦。查体：BP:135/65mmHg，心率52次/分，律齐，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。动态心电图：窦性心率为主，平均心率56次/分，R-R长间歇35次，最长4.2秒伴房室交界性逸搏；房性期前收缩；短阵房性心动过速；一度房室传导阻滞。最能提示该病人为病态窦房结综合征诊断的动态心电图表现是（）[单选题]*

- A.一度房室传导阻滞
- B.房性期前收缩
- C.短阵房性心动过速
- D.R-R长间歇35次，最长4.2秒伴房室交界性逸搏✓

12.女，23岁。因心悸1月就诊。查体：血压120/80mmHg，心率85次/分，律不齐。心电图示：窦性心律，可见提前出现的P波，形态予窦性P波不同，P-R间期0.14秒，QRS波群形态正常。心悸最可能的原因是（）[单选题]*

- A.窦性心动过速
- B.心房颤动
- C.窦性心动过缓
- D.房性期前收缩✓

13.终止心房扑动最有效的方法是（）[单选题]*

- A.洋地黄化
- B.刺激迷走神经
- C.心房起搏
- D.直流电复律✓

14.男，54岁。突发心悸、气短和头晕。有陈旧性心肌梗死3年。查体：BP:80/60mmHg，双肺底可闻及湿啰音，心界左下扩大，心率196次/分，律齐。心电图示宽QRS波心动过速T波方向与QRS波群主

波方向相反，心律规则，间断可见窄 QRS 波。最恰当的处理措施为（ ）[单选题] *

- A. 普罗帕酮静脉注射
- B. 呋塞米静脉注射
- C. 直流电复律✓
- D. 毛花苷丙静脉注射

15. 女，76 岁。持续性心房颤动 2 年。有脑血栓和糖尿病病史。查体：BP:120/65mmHg, 心率 87 次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音。该病人最适宜的抗栓治疗措施是（ ）[单选题] *

- A. 口服氯吡格雷
- B. 静脉滴注肝素
- C. 口服阿司匹林
- D. 口服华法林✓

16. 男，59 岁。活动后气短半年，夜间憋醒 1 周。既往陈旧性心肌梗死 3 年。查体：血压 110/80mmHg, 双下肺可闻及少许湿性啰音，心率 98 次/分，心律齐。最有助于明确该病人气短原因的检查是（ ）[单选题]

- A. 胸部 X 线片
- B. 超声心动图✓
- C. 肺功能
- D. 动脉血气分析

17. 女，64 岁。突发气急 4 小时，伴咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。高血压病史 10 余年。查体：BP:190/110mmHg，心率 110 次/分，律齐，双肺可闻干性啰音及细湿啰音，治疗措施不正确的是（ ）

- A. 静脉推注呋塞米
- B. 静脉推注美托洛尔✓
- C. 静脉滴注硝普钠

D.静脉推注吗啡

18.男，68岁。活动后心悸气短4年。突发喘憋1小时来诊。高血压病史10年余，；平时血压波动于(30-150)/(70-90)mmHg，查体：BP:230/100mmHg，端坐位，双肺底可闻及少许湿啰音，心率114次/分。该病人最适合的治疗是() [单选题] *

A.口服硝苯地平

B.口服阿替洛尔

C.肌肉注射利血平

D.静脉注射硝普钠✓

19.心力衰竭合并快速心房颤动病人，控制心室率首选() [单选题] *

A.维拉帕米

B.美拉洛尔

C.伊布利特

D.毛花苷丙✓

20.下列临床情况最易引起急性左心衰竭的是() [单选题] *

A.频发室性期前收缩

B.二尖瓣腱索断裂✓

C.慢性持续性房颤

D.反复发作的肺栓塞

21.急性动脉粥样硬化性脑栓性脑梗死的治疗不包括() [单选题] *

A.血浆置换✓

B.抗血小板治疗

C.他汀类药物治疗

D.溶栓治疗

22.下列最容易出现脑膜刺激征的是 () [单选题] *

A.硬膜外出血

B.脑出血

C.脑梗死

D.蛛网膜下腔出血✓

23.脑梗死的病因中，最主要的是 () [单选题] *

A.动脉硬化✓

B.高血压

C.动脉壁炎症

D.血高凝状态

24.产伤性颅内出血最常见的类型是 () [单选题] *

A.脑室周围-脑室内出血

B.蛛网膜下腔出血

C.硬膜下出血✓

D.小脑出血

25.48岁,女,工人,晚饭后聊天时突然头昏头痛,呕吐一次来急诊。BP:23/14 kPa(170/105mmHg),

神志清,左鼻唇沟浅,左上肢肌力2级、痛觉消失,下肢正常,右侧正常。颈强。最可能的诊断是 ()

A.蛛网膜下腔出血

B.脑出血✓

C.脑梗塞

D.高血压脑病

26.严重胸腹联合损伤后，必须首先处理的是（ ）[单选题] *

- A.张力性气胸✓
- B.急性弥漫性腹膜炎
- C.粉碎性胸椎骨折
- D.粉碎性腰椎骨折

27.男，45岁。左腿车轮碾压伤2小时。查体：T37.2℃，P145次/分，R28次/分，BP89/55mmHg。

神情淡漠，面色苍白，口唇干燥，两肺呼吸音清，腹软，无压痛。左小腿中部开放性外伤，伤口近端在院外

已用止血带缚扎30分钟，伤口无明显渗血，足背动脉搏动弱。此时该病人处理措施中错误的是（ ）[单选题]

- A.中心静脉置管
- B.补充血容量
- C.做好术前准备，急诊手术
- D.放开止血带，以免远端肢体缺血✓

28.破伤风毒素应尽早注射才能有效，不能晚于伤后（ ）[单选题] *

- A.4小时内
- B.6小时内
- C.8小时内
- D.12小时内✓

29.关于创伤急救的原则，错误的是（ ）[单选题] *

- A.应优先处理致命伤
- B.对疑有脊椎骨折的伤员必须平卧硬板床
- C.昏迷病人应放置胃管防止误吸✓
- D.包扎伤口可减少污染、压迫止血

30.地震现场，一工人左腰及下肢被倒塌砖墙压住，震后6小时救出，4小时送抵医院。诉口渴，尿少，呈暗红色。检查：脉搏120次/分，血压95/75mmHg，左下肢明显肿胀皮肤有散在淤血斑及水疱，足背动脉搏动较健侧弱，趾端凉，无骨折征象。静脉输液易首选（ ）[单选题] *

- A.全血
- B.血浆
- C.右旋糖酐
- D.等渗盐水+1.25%碳酸氢钠溶液✓

31.下列哪种止血方法可引起急性肾功能衰竭（ ）[单选题] *

- A.指压法
- B.加垫屈肢法
- C.止血带法✓
- D.直接止血法

32.前臂动脉损伤出血应压迫（ ）[单选题] *

- A.肱动脉✓
- B.锁骨下动脉
- C.颈动脉
- D.枕动脉

33.没有血压计的事故现场，诊断休克依据下面哪项不是（ ）[单选题] *

- A.体温✓
- B.脉搏
- C.毛细血管再充盈试验
- D.意识状态

34.创伤性休克病人到达急诊室后，下列哪项首选（ ）[单选题] *

- A.立即行 X 线、B 超检查，明确伤情
- B.建立静脉通路，补充血容量✓
- C.剖腹探查，了解有无腹腔脏器的损伤
- D.应用血管活性药物

35.男性，30 岁。从三楼跌下左腹部损伤，左 6、7、8 肋骨骨折，脾破裂，肠破裂。入院时精神紧张，T38.5℃，面色苍白，肢端冰冷，脉搏细数，脉率 110 次/分，血压 85/60mmHg，尿量减少。首先考虑的治疗措施为（ ）[单选题] *

- A.使用缩血管药
- B.立即剖腹探查
- C.迅速补充血容量✓
- D.大剂量使用抗生素

36.男性，50 岁。车祸 6 小时入院，神志淡漠，四肢冰冷，血压 70/50mmHg，诊断为（ ）[单选题] *

- A.轻度低血容量性休克
- B.中度低血容量性休克✓
- C.重度低血容量性休克
- D.重度感染性休克

37.休克病人应采取的理想体位是（ ）[单选题] *

- A.平卧位
- B.头和躯干抬高 20° ~ 30°，下肢抬高 15° ~ 20°✓
- C.头和躯干抬高 10° ~ 20°，下肢抬高 20° ~ 30°
- D.头和躯干抬高 10° ~ 20°，下肢抬高 10° ~ 20°

38.男, 51 岁。进食质硬食物后呕鲜血 500ml。查体: BP70/48mmHg, 胸前区可见蜘蛛痣, 肝脏肋下未触及, 脾脏肋下 3cm。目前应立即采取的措施是 () [单选题] *

- A.手术治疗
- B.液体复苏, 抗休克治疗✓
- C.内镜治疗
- D.静脉注射 H₂ 受体拮抗剂

39.男孩, 4 岁。发热、头痛、皮疹 12 小时, 频繁抽搐、昏迷 2 小时。查体: 全身可见大量瘀点瘀斑, 双下肢右部分融合成片, 血压测不出, 右侧瞳孔散大, 对光反射消失。下列处理不正确的是 () [单选题] *

- A.吸氧及心电监护
- B.瘀点涂片检菌
- C.立刻腰椎穿刺做脑脊液常规检查✓
- D.20%甘露醇立即静脉滴注

40.严重脑外伤昏迷, 术后仍昏迷者应 () [单选题] *

- A.待病人完全清醒后, 采取侧卧头低位下拔管
- B.先置入喉镜, 明视下慢慢拔
- C.充分供氧, 待喉肌松弛后再拔管
- D.气管造口后再拔管✓

41.昏迷病人不宜使用 () [单选题] *

- A.直肠温度
- B.鼻咽温度
- C.食管温度
- D.口腔温度✓

42.颅内压增高的昏迷病人，出现上呼吸道梗阻时应采取的措施是（ ）[单选题] *

- A.吸氧
- B.胃肠减压
- C.翻身、拍背、吸痰
- D.气管内插管✓

43.其他降压药物无效的高血压危象孕妇可选用（ ）[单选题] *

- A.尼莫地平
- B.硝普钠✓
- C.甲基多巴
- D.拉贝洛尔

44.肾上腺嗜铬细胞瘤伴发的高血压危象最好选用（ ）[单选题] *

- A.酚妥拉明✓
- B.多巴胺
- C.间羟胺
- D.普萘洛尔

45.张某，66岁。既往患“慢性心力衰竭”。近日因严重头痛、头晕恶心、呕吐而入院。体检：高血压190/100mmHg，诊断为“高血压危象”。应首选下列何药治疗（ ）[单选题] *

- A.可乐定
- B.派唑嗪
- C.硝苯地平
- D.硝普钠✓

46.女，45岁。间断发作心悸、大汗、手抖6个月余。发作时伴饥饿感，无黑朦、眩晕等。查体：血压

140/90mmHg，睑结膜无苍白。心率 68 次/分，律齐。发作时测血糖与平素无明显变化。心悸反复发作最可能的病因是 () [单选题] *

- A. 贫血
- B. 甲状腺功能亢进症 ✓
- C. 低血糖症
- D. 急性心肌炎

47. 男，37 岁。多食、易饥，大便次数增多、体重下降 3 个月，发作性软瘫 1 天。查体：P110 次/分，BP150/60mmHg，体型中等，匀称，皮肤潮湿。血钾 3.0mmol/L。病人血钾降低的原因是 () [单选题] *

- A. 腹泻排钾增多
- B. 钾摄入不足
- C. 尿钾排出增多
- D. 细胞内外钾分布异常 ✓

48. 女，28 岁。结节性甲状腺肿 10 年，近半年出现怕热，多汗。T₃、T₄ 值高于正常值近 1 倍。妊娠 4 个月，有哮喘史。最适合的治疗方法是 () [单选题] *

- A. 甲硫咪唑 ✓
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 甲状腺大部切除术
- D. 普萘洛尔治疗

49. 男性 28 岁，心悸、怕热、多汗、消瘦、易饿 4 个月。甲状腺，弥漫性 I 度肿大。血 TSH 降低，T₃ 和 T₄ 增高，诊断为甲亢。甲硫咪唑 30mg/d，20 天后中性粒细胞计数 $1.3 \times 10^9/L$ 。甲状腺功能亢进的下一步治疗宜选 () [单选题] *

- A. 甲硫咪唑与升白细胞药合用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755020143134011102>