



宁夏口腔病理科模拟题 2021 年 (36)  
(总分 84.99, 做题时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1.

患者男, 27 岁。因伤致面中部损伤, 昏迷半小时。除面中部开放性骨折表现以外, 有血及脑脊液自鼻、耳流出。现神志清楚, 逆行性遗忘, 神经系统检查未见异常。病理反射阴性。若患者烦躁不安, 使用的药物中禁忌的是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

地西洋

B

苯巴比妥钠

C

咪达唑仑

D

吗啡

E

安痛定

2.

深部脓肿的特征性表现是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

发热

B

波动感

C

局部淋巴结肿大

D

凹陷性水肿

E

白细胞总数增高, 中性粒细胞比例上升

3.

患者女, 26 岁。因牙源性感染导致颊间隙脓肿形成, 拟进行切开引流, 方法是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

颊部下颌前庭沟之上水平切口

B

腮腺导管口下垂直切口

C

颊部上颌前庭沟之下水平切口

D

下颌前庭沟之上垂直切口

E

上颌前庭沟之下垂直切口

4.

口底囊肿囊肿内充满白色豆腐渣样物质，镜下见角化覆层鳞状上皮衬里，囊壁内含有皮肤附属器。最可能的病理诊断是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

表皮样囊肿

B

皮样囊肿

C

畸胎样囊肿

D

口底囊肿

E

蛤蟆肿

5.

患者男，76岁。右舌根癌，其颈淋巴结转移的常见部位为

SSS\_SINGLE\_SEL

A

对侧下颌下淋巴结

B

左侧颈深上淋巴结

C

左侧颈深中淋巴结

D

右侧下颌下淋巴结或颈深淋巴结

E

右侧下颌下淋巴结或颈浅淋巴结

6.

纵式或横式外翻缝合的选择根据是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

术者的习惯

B

创缘血供方向

C

创口区域皮纹方向

D

创口内翻倾向的严重程度

E

创口周围是否存在重要的解剖结构

7.

以下关于手术切口的叙述中，哪项是错误的

SSS\_SINGLE\_SEL

A

切口应尽量与术区内重要解剖结构的行径相平行

B

切口应选择在较隐蔽部位和天然皱褶处

C

切口方向尽量与皮纹方向一致

D

活检手术的切口力求与再次手术的切口一致

E

肿瘤手术宜使用电刀，而整复手术宜使用光刀

8.

上颌结节阻滞麻醉容易发生的并发症是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

注射区疼痛和水肿

B

恶心、呕吐

C

暂时性面瘫

D

注射针折断

E

血肿

9.

关于颞下颌关节强直造成的咬合错乱，不正确的是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

面下 1 / 3 垂直距离变短

B

下颌牙弓变宽

C

下颌磨牙舌向倾斜

D

下颌前牙唇侧倾斜

E

发生于成年者，咬合错乱不明显

10.

以下关于下颌下腺涎石多见的原因，哪项是错误的

SSS\_SINGLE\_SEL

A

下颌下腺导管弯曲而长，涎液流动缓慢

B

导管口大，位于口底

C

下颌下腺分泌的涎液含黏液量较腮腺为低

D

下颌下腺涎液浓而黏稠

E

下颌下腺涎液较腮腺涎液更偏碱性

11.

患者女，54 岁。口眼干燥多年，双侧腮腺弥漫性肿大，Schirmer 试验 < 5mm，不宜采用的治疗方法是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

\*\*\*甲基纤维素滴眼

B

经常用液体湿润口腔

C

积极防治龋病

D

中医药治疗

E

切除腮腺，解除自身抗原

12.

需要劈冠以解除邻牙阻力的阻生牙类型为

SSS\_SINGLE\_SEL

- A  
垂直阻生
- B  
近中阻生
- C  
远中阻生
- D  
颊向阻生
- E  
舌向阻生

13.

以下关于涡轮钻拔牙法特点的叙述中，哪项是错误的

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
振动小
- B  
创伤较大
- C  
手术视野清楚
- D  
手术时间短
- E  
术后并发症少

14.

患者男，25岁。左下颌智牙反复冠周炎检查见该牙垂直位，大部牙冠被牙龈覆盖，咬合面较下颌第二磨牙颈部略低，分析其拔除阻力主要是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
邻牙阻力
- B  
牙根部骨阻力
- C  
牙冠部骨阻力
- D  
软组织阻力
- E  
外斜线处骨阻力

15.

患者女，35岁。颌面外伤伴昏迷，经现场紧急处理后，准备转送医院进一步治疗。运送时患者正确的体位是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
俯卧位
- B  
侧卧位
- C  
仰卧位
- D  
半卧位
- E  
随意体位

16.

患者女性，24岁，因车祸造成面部外伤。X线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线横过鼻背、眶部，经颧骨上方到达翼突。正确的诊断是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
LeFort II型骨折
- B  
鼻骨骨折
- C  
LeFort I型骨折
- D  
颧弓骨折
- E  
LeFort III型骨折

17.

新生儿颌骨骨髓炎属于

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
特异性感染
- B  
牙源性化脓性颌骨骨髓炎
- C  
血源性化脓性颌骨骨髓炎
- D  
牙源性非化脓性颌骨骨髓炎

E

物理性非化脓性颌骨骨髓炎

18.

根尖片投照的分角技术是指

SSS\_SINGLE\_SEL

A

X 线与被检查牙齿的长轴垂直

B

X 线与胶片垂直

C

X 线与被检查牙齿的长轴及胶片之间的分角线垂直

D

X 线与被检查牙齿的长轴和胶片之间的分角线平行

E

X 线与咬合平面平行

19.

以下不宜行组织活检术的恶性肿瘤为

SSS\_SINGLE\_SEL

A

舌癌

B

唇癌

C

恶性淋巴瘤

D

恶性黑色素瘤

E

肉瘤

20.

患者女，49 岁。因左下牙疼痛 2 个月，下唇麻木 3 周就诊。检查见：左下唇较对侧感觉迟钝，松动 II 度，无龋坏。全景片示左下颌体区见一 2cm×3cm 的边界不清的密度减低区，牙根有吸收。根据以上临床表现，最可能的诊断是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

下颌骨骨髓炎

B

成釉细胞瘤

C

角化囊肿

D  
含牙囊肿

E  
中央性颌骨癌

21.  
换药的主要目的

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
清洗伤口

B  
常规要求

C  
检查和促进创口正常愈合

D  
使敷料保持整洁

E  
患者要求

22.  
正常人每日唾液总量为 1000~1500ml，其中腮腺和下颌下腺的分泌量占

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
75%

B  
80%

C  
85%

D  
90%

E  
95%

23.  
局麻过程中，为了预防医源性感染，以下措施中哪项可以除外

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
注射点擦干后，用 2%碘酊消毒

B  
使用一次性注射器

C



避免注射针头被污染

D

使用无菌的局麻药液

E

术前 3 天大剂量应用抗生素

24.

纤维化慢性下颌下腺炎的治疗方法是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

硬化剂治疗

B

导管结扎术

C

药物治疗

D

摘除涎石

E

下颌下腺摘除

25.

患者女，35 岁。左下颌下腺炎长期反复发作，双合诊左口底区可触及一硬结，为明确是否有结石，最正确的检查是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

拍牙片

B

B 超检查

C

CT 检查

D

MRI 检查

E

拍下颌咬合片

26.

拔牙后出血是指拔牙后多长时间仍明显出血

SSS\_SINGLE\_SEL

A

30 分钟

B

45 分钟

C  
60 分钟

D  
90 分钟

E  
120 分钟

27.

患者男，50 岁。拔除下颌第一磨牙后，新鲜血液充盈牙槽窝，但不能淹没牙根间隔。正确的处理是

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
缝合拔牙创

B  
咬除根间隔

C  
碘仿纱布覆盖

D  
明胶海绵覆盖

E  
任其吸收

28.

患者女，30 岁。右下智牙舌向远中倾斜，牙冠完全萌出，此牙的拔除方法宜采用

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
冲击法拔除

B  
劈开，分根拔除

C  
用涡轮钻拔除

D  
用牙挺向远中挺出

E  
翻瓣、去骨拔除

29.

不属于新生儿骨髓炎的病因的是

SSS\_SINGLE\_SEL

A  
产道感染

B  
脐带感染

C  
母亲患化脓性乳腺炎

D  
泪囊感染

E  
医源性感染

30.

下列 X 线透过度最弱的是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

釉质

B

牙本质

C

牙骨质

D

牙髓

E

牙槽骨

31.

患者男，28 岁。诊断为下颌成釉细胞瘤，其穿刺液可能为

SSS\_SINGLE\_SEL

A

黄褐色液体，可有胆固醇结晶

B

血性液体不凝固

C

黄色清亮液体

D

蛋清样液体

E

乳白色豆渣样物

32.

患者男，34 岁。下颌前份唇侧牙龈出现黑色斑块状肿物半年余。其黑色斑块渐扩大，遂出现双侧下颌下淋巴结肿大。最不宜采用的检查是

SSS\_SINGLE\_SEL

- A  
切取活检
- B  
冷冻活检
- C  
CT 检查
- D  
MRI 检查
- E  
PET 检查

33.

气管切开的部位多在

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
第 1 气管软骨环
- B  
第 1~3 气管软骨环
- C  
第 2~4 气管软骨环
- D  
第 3~5 气管软骨环
- E  
低于第 5 气管软骨环

34.

预防颞下颌关节紊乱病的措施中，错误的是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
保持乐观情绪
- B  
注意关节保护
- C  
纠正不良咀嚼习惯
- D  
多食质硬食物
- E  
避免长时间大张口

35.

对于腮腺区肿物不宜进行的检查是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

细针吸取细胞学检查

B

CT 或 MRI

C

唾液腺造影

D

切取活检术

E

B 超

36.

患者女，30 岁。左腭部肿块 2 年，渐增大，表面部分呈浅蓝色，触诊为实性，无结节，压迫无退缩，无症状。最可能的诊断是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

海绵状血管瘤

B

黏液囊肿

C

黏膜表皮样癌

D

多形性腺瘤

E

炎症

37.

下列哪种患者拔牙后易引起感染

SSS\_SINGLE\_SEL

A

血友病

B

高血压

C

糖尿病

D

心绞痛

E

肝炎

38.

患者女，56岁。拔除右上后牙后伤口愈合良好，无明显炎症。半个月后常感伤口疼痛不适，尤其触碰伤口颊侧时有明显疼痛，X线片检查无异常，常见的原因是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
伤口内有残根
- B  
伤口内有肉芽
- C  
干槽症
- D  
骨尖
- E  
神经损伤

39.

患者女，29岁。右下智牙反复肿痛，临床检查见智牙仅露出1/4远中冠，高于第二磨牙颈部但未高出平面。X线片示近中冠完全骨埋伏，且低于第二磨牙根尖，牙根全部位于下颌支内，此患者的诊断是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
II类近中低位阻生
- B  
II类近中中位阻生
- C  
III类近中低位阻生
- D  
III类近中中位阻生
- E  
埋伏牙

40.

颌面部创伤患者伴发休克时，处理原则中错误的是

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A  
保持伤员安静，保暖
- B  
禁止随意搬动
- C  
使用吗啡类药物

D

迅速采取有效的止血措施

E

补液和维持血压在正常水平

41.

患者男，40岁。24小时前颊部外伤，全层组织缺损约3.5cm×4cm。清创后适合的缝合方式是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

严密缝合口腔黏膜

B

严密缝合颊部皮肤

C

黏膜、肌、皮肤逐层缝合

D

定向拉拢缝合

E

将皮肤与黏膜缝合

42.

患者女，33岁。上颌前部被硬物撞击，经X线片检查证实为上颌前部的牙槽突骨折伴牙龈撕裂伤。该患者不必进行的处理是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

缝合牙龈创口

B

局麻下将牙槽突及牙复位

C

单颌结扎固定

D

有早接触时调磨对颌牙

E

颌间结扎

43.

一患者拔下颌牙后出现渐进性张口受限，下颌下淋巴结肿大，除下颌升支后缘稍丰满，有压痛外，其他没有明显体征。最可能的诊断是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

下颌下间隙感染

B

翼下颌间隙感染

C

咽旁间隙感染

D

咬肌间隙感染

E

舌下间隙感染

44.

舍格伦综合征的影像学表现是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

扩张呈腊肠状

B

腺体形态正常，体积明显增大

C

导管系统表现为排列扭曲、紊乱和粗细不均

D

导管系统完整，造影剂自腺体部外漏

E

主导管边缘不整齐，呈羽毛状，大量末梢导管点状扩张

45.

患者女，30岁。左上颈部肿物1年，有反复消长史，感冒时易增大，触诊囊性感明显，穿刺液为透明、淡黄色水样清亮液体。该患者最有可能的诊断是

SSS\_SINGLE\_SEL

A

舌下腺囊肿口外型

B

甲状舌管囊肿

C

下颌下腺囊肿

D

第二鳃裂囊肿

E

囊性水瘤

46.

碘酊作为口腔内消毒剂的浓度应是

SSS\_SINGLE\_SEL

A



\*\*%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/755143340342012010>