

识与技能真题精选附答案

单选题（共 题）

1、与成人相比，2 岁以下小儿对酸不稳定、弱碱性药物的吸收增加，其机制是

- A.胃排空快
- B.胃酸分泌少
- C.体液及细胞外液容量大
- D.肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- E.婴幼儿肾小球滤过率、肾小管排泌能力和肾血流量迅速增加

【答案】 B

2、（2016 年真题）贫血患者常出现（ ）。

- A.血红蛋白减少
- B.中性粒细胞增多
- C.嗜酸性粒细胞增多
- D.血小板计数增多
- E.淋巴细胞增多

【答案】 A

3、患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性

- A.肺结核
- B.支气管炎
- C.支气管哮喘
- D.社区获得性肺炎
- E.医院获得性肺炎

【答案】 D

4、贫血患者常出现

- A.血红蛋白减少
- B.中性粒细胞增多
- C.嗜酸性粒细胞增多
- D.血小板增多
- E.淋巴细胞增多

【答案】 A

5、（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A.氨氯地平片
- B.曲美他嗪片
- C.阿司匹林肠溶片

E. 辛伐他汀片

【答案】 D

6、可引起驾驶员嗜睡的药物是

A. 东莨菪碱

B. 抗过敏药

C. 阿米洛利

D. 双嘧达莫

E. 口服避孕药

【答案】 B

7、患者，女，45岁，既往有扩张型心肌病，近1年出现劳累性呼吸困难，1天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

A. 肾上腺素

B. 阿托品

C. 普萘洛尔

D. 维拉帕米

E. 奎尼丁

【答案】 B

8、服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，

螺内酯

B.缬沙坦

C.氢氯噻嗪

D.硝苯地平

E.普萘洛尔

【答案】 C

9、某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U 支的青霉素钠产品，每支所需的装量是（ ）

A.2.088mg

B.1.33mg

C.1.33g

D.0.48g

E.0.48mg

【答案】 D

10、使用前应用原药进行皮试的药物是

A.左氧氟沙星片

B.阿奇霉素片

C.注射用阿莫西林

D.注射用头孢曲松钠

E.阿米卡星注射液

【答案】

11、“头孢”的药名词干缩写是

A.cef-

B.-oxacin

C.-bactam

D.-triptyline

E.-vastatin

【答案】 A

12、依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

A.沙丁胺醇

B.苯海拉明

C.氟伏沙明

D.奥利司他

E.水合氯醛

【答案】 A

13、以下所述 处方调配规范四查 中，不正确的是

A.查处方

B.查药品

C.查适应证

D.查配伍禁忌

E.查用药合理性

【答案】

14、痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A. 别嘌醇
- B. 泼尼松
- C. 苯溴马隆
- D. 秋水仙碱
- E. 阿司匹林

【答案】 C

15、治疗胃食管反流病，莫沙必利的正确服药时间是

- A. 早餐前 30min
- B. 三餐前 30min
- C. 餐后、睡前
- D. 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- E. 每天任意固定时间

【答案】 B

16、氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（ ）

- A. 青霉胺
- B. 乙酰胺
- C. 纳洛酮
- D. 维生素 K1
- E. 硫酸阿托品

【答案】

17、阿司匹林可能引起

- A.尿肌酐
- B.尿酮体
- C.尿血红蛋白
- D.尿沉渣结晶
- E.尿液 pH值降低

【答案】 C

18、能够影响叶酸利用障碍的药物有

- A.甲氨蝶呤
- B.二甲双胍
- C.秋水仙碱
- D.苯乙双胍
- E.对氨基水杨酸

【答案】 A

19、因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症药物为（ ）

- A.艾司唑仑
- B.佐匹克隆
- C.雷美尔通
- D.米氮平
- E.唑吡坦和帕罗西汀联用

【答案】

20、贫血常出现

- A. 血红蛋白减少
- B. 中性粒细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 血小板计数增高
- E. 淋巴细胞增多

【答案】 A

21、患者，女，37岁，因小腹胀痛2月余、加重5天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A. 克林霉素
- B. 氧氟沙星
- C. 阿奇霉素
- D. 多西环素
- E. 阿莫西林

【答案】

22、《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准
收载的处方属于

- A. 急诊处方?
- B. 普通处方?
- C. 法定处方?
- D. 医师处方?
- E. 协定处方?

【答案】 C

23、减轻不良反应（白天毒性弱）的是

- A. 利尿药
- B. 抗忧郁药
- C. 阿苯达唑
- D. 氨基糖苷类
- E. 肾上腺皮质激素类

【答案】 D

24、可引起尿胆红素阳性的是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 病毒性肝炎
- C. 肺结核
- D. 肾小球肾炎

【答案】 B

25、烟酸类

A.吉非贝齐

B.阿昔莫司

C.考来烯胺

D.辛伐他汀

E.多潘立酮

【答案】 B

26、以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

A.维胺酯

B.阿达帕林

C.异维A酸

D.过氧苯甲酰

E.葡萄糖酸锌

【答案】 D

27、表现为“牛肉样舌”的疾病为

A.缺铁性贫血

B.巨幼红细胞贫血

C.再生障碍性贫血

D.白血病

【答案】 B

28、患者，男，72岁，因腰痛无法起床1天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经X线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A.老年性骨质疏松症
- B.长期服用抗癫痫药
- C.长期服用糖皮质激素
- D.维生素D中毒
- E.甲状腺功能亢进症

【答案】 A

29、麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

- A.临床诊断
- B.患者姓名、性别
- C.患者身份证明编号
- D.药品名称、剂型、规格、数量
- E.医院名称、就诊科室和就诊日期

【答案】 C

30、能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞

- B. 萘甲唑林滴鼻液
- C. 孟鲁司特钠片
- D. 泼尼松片
- E. 曲安奈德鼻喷雾剂

【答案】 B

31、易造成人体严重脱水、肾衰竭

- A. 蛋白同化激素
- B. 精神刺激剂
- C. 利尿剂
- D. β 受体阻断剂
- E. 肽激素类

【答案】 C

32、（2016年真题）下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是（ ）。

- A. 青霉素 G
- B. 头孢呋辛
- C. 华法林
- D. 地西洋
- E. 氨苄西林

【答案】 D

- A. 诊断痛风
- B. 诊断黄疸
- C. 诊断贫血
- D. 诊断心肌梗死
- E. 诊断急性胰腺炎

【答案】 D

34、（2018 年真题）过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用（ ）

- A. 色甘酸钠滴眼液
- B. 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C. 玻璃酸钠滴眼液
- D. 氧氟沙星滴眼液
- E. 碘苷滴眼液

【答案】 A

35、下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A. 西咪替丁片
- B. 莫沙必利片
- C. 双氯芬酸钠片
- D. 伊马替尼片
- E. 双歧杆菌三联活菌胶囊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756004032230010124>