

助理医师考试临床助理(习题卷156)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]长期大量应用糖皮质激素可引起哪种不良反应

- A) 高血钾
- B) 低血压
- C) 低血糖
- D) 高血钙
- E) 水钠潴留

2. [单选题]男，35岁。呕血并黑便3小时。既往有十二指肠溃疡病史5年。目前不宜选择的检查是（ ）。

- A) 凝血功能
- B) 肝功能检查
- C) 胃镜
- D) 腹部B超
- E) 上消化道X线钡剂造影

3. [单选题]血管壁玻璃样变多见于

- A) 中型动脉
- B) 大静脉
- C) 细动脉
- D) 大动脉
- E) 小静脉

4. [单选题]男性，20岁，8小时前左侧腹被木棍击伤，腹痛渐加重，伴恶心、呕吐，伤后无大小便。查体：强迫体位，腹式呼吸减弱，全腹肌紧张、压痛、反跳痛，以左脐旁为著。移动性浊音(+)，肠鸣音消失，心率110次/分，血压110/70mmHg，体温38.5℃，WBC 15×10^9

9

/L。下列哪项处理不是必需的

- A) 密切观察病情变化
- B) 留置尿管
- C) 开放静脉
- D) 尽快输全血
- E) 胃肠减压

5. [单选题]疑为苯丙酮尿症的儿童初筛应做

- A) Guthrie细菌生长抑制试验
- B) 血清苯丙氨酸浓度测定
- C) 尿三氯化铁试验
- D) 尿甲苯胺蓝试验
- E) 苯丙氨酸耐量试验

6. [单选题]有关中心性发绀的论述错误的是

- A) 血中还原血红蛋白增多
- B) 典型表现为口唇发绀
- C) SaO₂

2

往往有显著的下降

- D) 重症休克时可以出现
- E) 严重的肺部病变是重要的病因之一

7. [单选题]男，53岁，2个月来间歇性无痛性全程血尿，近3天来加重伴有血块，B型超声双肾正常，膀胱内有1.5?cm×2.0?cm×1.0?cm新生物，有蒂。为明确诊断最重要的检查方法是

- A) 尿常规
- B) CT
- C) 膀胱镜检
- D) 静脉尿路造影
- E) 尿脱落细胞检查

8. [单选题]对氨基糖苷类不敏感的细菌是

- A) 金黄色葡萄球菌
- B) 各种厌氧菌
- C) 铜绿假单胞菌
- D) 肠杆菌
- E) G-球菌

9. [单选题]下列哪种组织学类型的肺癌最常见

- A) 腺癌
- B) 鳞状细胞癌
- C) 小细胞癌
- D) 大细胞癌
- E) 肺瘢痕癌

10. [单选题]下列关于休克的叙述，哪项是正确的？

- A) 通常在迅速失血超过全身总血量的10%时即出现休克
- B) 失血性休克时，应首先快速输入10%~50%葡萄糖溶液，继之大量输血
- C) 损伤性休克不属于低血容量性休克
- D) 感染性休克多是革兰阴性杆菌所释放的内毒素引起的内毒素性休克
- E) 感染性休克的治疗原则是首先控制感染

11. [单选题]孕妇尿妊娠试验，开始出现阳性反应，最早是在受精后的

- A) 5天
- B) 6天
- C) 7天
- D) 8天
- E) 以上都不是

12. [单选题]唐氏综合征最常见的标准型染色体核型是（ ）。

- A) 46, XX (或XY), -21, +t (21q21q)
- B) 46, XX (或XY), -22, +t (21q21q)
- C) 46, XX (或XY), -14, +t (14q21q)
- D) 47, XX (或XY), +21

E) 46, XX (或XY) / 47, XX (或XY), +21

13. [单选题]急性尿潴留的治疗, 以下哪项是错误的

- A) 留置导尿
- B) 耻骨上膀胱穿刺抽吸尿液
- C) 耻骨上膀胱穿刺造瘘
- D) 应用利尿药
- E) 耻骨上膀胱切开造瘘

14. [单选题]孕妇血容量增加达高峰的时间是

- A) 孕20~28周
- B) 孕28~30周
- C) 孕32~34周
- D) 孕36~38周
- E) 孕12~19周

15. [单选题]肺炎球菌的主要致病作用在于

- A) 荚膜对组织的侵袭力
- B) 产生毒素
- C) 产生溶血素
- D) 产生杀白细胞素
- E) 产生组织坏死物质

16. [单选题]食物热力作用最高的

- A) 脂肪
- B) 糖类
- C) 蛋白质
- D) 纤维素
- E) 肉类

17. [单选题]患者女性, 32岁, 泛酸、烧心半年余, 胃镜检查诊断为反流性食管炎, 经质子泵抑制剂和促动力剂治疗3个月后症状缓解, 对于其随后的维持治疗, 目前首先推荐

- A) 不需要维持治疗
- B) 质子泵抑制剂
- C) H₂

2

受体拮抗剂

- D) 促动力药
- E) 制酸剂

18. [单选题]2: 3: 1含钠液下列哪项是错误的

- A) 5%葡萄糖3份
- B) 1.4%碳酸氢钠1份
- C) 1.87%乳酸钠1份
- D) 1.2%氯化钾1份
- E) 0.9%氯化钠2份

19. [单选题]患者女性, 35岁, 反复出现黏液脓血便3年, 近一周来上述症状再发, 伴有腹痛、里急后重、低热、乏力和膝关节痛。体检: 轻度贫血貌, 双小腿前侧可见结节性红斑, 腹软, 左下腹有压痛, 未触及包块, 肠鸣音活跃。化验: 便常规有大量脓细胞和红细胞, 血沉30mm/h。要确定诊断, 首选的检查是

- A) 腹部B超
- B) 下消化道造影
- C) 钡剂灌肠
- D) 纤维结肠镜
- E) 腹部CT

20. [单选题]肺的静态顺应性越大，表示

- A) 肺的弹性阻力大，肺扩张程度小
- B) 肺的弹性阻力小，肺扩张程度小
- C) 肺的非弹性阻力大，肺扩张程度大
- D) 肺的弹性阻力小，肺扩张程度大
- E) 肺的非弹性阻力与肺扩张程度无变化

21. [单选题]下列哪一项不是评价公共卫生监测系统的指标

- A) 敏感性
- B) 特异度
- C) 代表性
- D) 简便性
- E) 阳性预测值

22. [单选题]克罗恩病手术治疗的适应证为

- A) 完全性肠梗阻
- B) 瘘管与脓肿形成
- C) 急性穿孔
- D) 大出血
- E) 以上全正确

23. [单选题]对风湿性心脏病最具有诊断意义的病变是

- A) 心肌变性、坏死
- B) 纤维蛋白性心外膜炎
- C) 心瓣膜赘生物
- D) 风湿小体
- E) 心肌间质炎细胞浸润

24. [单选题]男性，55岁，因急性心肌梗死收治入院，突然出现心尖部收缩期杂音，无震颤，心衰症状明显加重，最可能的原因是

- A) 室间隔穿孔
- B) 合并感染性心内膜炎
- C) 心率增快
- D) 左心室扩大引起二尖瓣关闭不全
- E) 乳头肌功能失调或断裂

25. [单选题]慢性肾小球肾炎患者，尿蛋白

- A) 120/70mmHg以下
- B) 125/75mmHg以下
- C) 130/80mmHg以下
- D) 140/90mmHg以下
- E) 140/85mmHg以下

26. [单选题]慢性胃炎的特异症状是

- A) 进食后中上腹疼痛

- B) 饥饿时上腹痛
- C) 呕吐苦水
- D) 反复上消化道出血
- E) 以上都不是

27. [单选题] 14个月男婴，因腹泻3天就诊，大便每日10余次，量中，蛋花汤样。大便常规：少量白细胞。紧急应给的治疗为

- A) 1: 1液20ml / kg，静脉推注
- B) 3: 2: 1液180ml / kg，静脉滴注
- C) 3: 1液150ml / kg，静脉滴注
- D) 2: 1等张含钠液20ml / kg，静脉推注
- E) 1. 4%NaHCO

3

50ml / kg，静脉推注

28. [单选题] 患儿9个月，因间断腹泻2个月，面色苍白1个月住院。足月顺产，母乳喂养，按时添加辅食。体检：皮肤黏膜苍白，头发稀黄，颜面稍显浮肿，肝脾轻度肿大，Hb80g / L，红细胞数 2.2×10

12

/L，网织红细胞正常，骨髓象出现巨核细胞，胞核发育落后于胞浆。便常规：未见异常，潜血阴性。该患儿致病的主要原因是

- A) 喂养不当
- B) 丢失过多
- C) 慢性腹泻
- D) 溶血
- E) 生长发育快，需要增多

29. [单选题] 决定骨盆入口平面大小的主要径线是

- A) 粗隆间径
- B) 髌棘间径
- C) 髌嵴间径
- D) 坐骨棘间径
- E) 入口前后径

30. [单选题] 男，57岁。干咳1个月。胸部CT示左肺门肿块，左主支气管狭窄，纵隔及左肺门淋巴结肿大。支气管镜活检病理示“小细胞肺癌”。该患者应首选的治疗措施是（ ）。

- A) 靶向治疗
- B) 放疗
- C) 化疗
- D) 放疗+手术
- E) 手术

31. [单选题] 恐惧与焦虑的区别在于

- A) 有无躯体焦虑
- B) 有无精神焦虑
- C) 有无具体害怕的对象或情境
- D) 有无惊恐发作
- E) 有无回避行为

32. [单选题] 患者女性，45岁。停经42天开始阴道流血持续2周，基础体温单相，首选的措施是

- A) 大量孕激素止血

- B) 大量雌激素止血
- C) 诊刮+病理
- D) 止血敏
- E) 促排卵

33. [单选题]患者男, 35岁。主诉"舌感异常"到医院就诊, 确诊为舌癌, 入院治疗。医生认为病灶尚未转移, 及早切除病灶是最佳治疗方法。医生把治疗意见告知家属, 希望她们做患者工作, 向患者说明"病灶只是溃疡, 因为是恶性的, 所以必须切除舌的1/3"。患者本人坚决反对手术。医生为了挽救病人生命, 遂向病人解释"不是切掉舌, 而是烧灼舌的溃疡部分", 使患者同意了手术, 术中切掉了舌的1/3, 术后患者出现语言障碍, 咀嚼、味觉功能减退。患者认为医生欺骗并坑害了自己, 遂上告法院, 要求赔偿。本案例病人上告法院, 最主要的理由是

- A) 医生手术的动机与目的不相符, 导致病人术后生活受到严重影响
- B) 医生切除1/3舌部虽是本手术的指征, 但侵犯了病人的合法权益
- C) 医生手术的动机与手段超出了病人当时的理解力和心理承受能力
- D) 医生当时用"只是烧灼舌的溃疡部分"的虚假解释骗取病人的同意
- E) 医生没有向病人说明手术后可能出现的后遗症, 病人思想准备不够

34. [单选题]足月儿血压平均为

- A) 60/50mmHg
- B) 70/40mmHg
- C) 60/40mmHg
- D) 80/60mmHg
- E) 70/50mmHg

35. [单选题]利福平

- A) 可引起外周神经炎
- B) 可引起视神经炎
- C) 对动物有致畸形作用
- D) 可引起耳鸣, 耳聋
- E) 可引起关节疼痛

36. [单选题]对肺炎所致的缺氧进行无创通气, 采用

- A) 高压氧疗
- B) 呼气末正压给氧
- C) 无控制给氧
- D) 持续低流量给氧
- E) 鼻导管持续高浓度给氧

37. [单选题]5岁男, 水肿7天, 体检有高度水肿, 血压120/75mmHg, 尿蛋白(+++), 24小时尿蛋白定量2500mg, 尿沉渣RBC 2~3/HP, BUN 5.4mmol/L。最可能的诊断是

- A) 急性肾炎
- B) 慢性肾炎
- C) 肾病综合征
- D) 肾炎性肾病
- E) 迁延性肾炎

38. [单选题]24岁风湿性心脏病孕妇, 妊娠20周末做产前检查及孕产期保健咨询, 目前心功能II级, 她询问关于容易发生心衰的危险时期, 以下回答哪项正确

- A) 妊娠32~34周、分娩期和产后最初3日内
- B) 妊娠28周以后
- C) 妊娠36周以后
- D) 产后最初1周内

E) 哺乳期

39. [单选题] 羟基脲的抗肿瘤作用机制是

- A) 抑制二氢叶酸还原酶
- B) 阻止嘧啶核苷酸生成
- C) 阻止嘌呤核苷酸生成
- D) 抑制核苷酸还原酶
- E) 抑制DNA多聚酶

40. [单选题] 可授予非限制使用级抗菌药物处方权的医生，不包括

- A) 乡村医生
- B) 在乡、民族乡、镇的医疗机构独立从事一般执业活动的执业助理医师
- C) 在村医疗机构独立从事一般执业活动的执业助理医师
- D) 具有初级专业技术职务任职资格的医师
- E) 中级以上专业技术职务任职资格

41. [单选题] 女，40岁。患乳腺癌进行化疗。因血小板计数低下进行血小板输注，当开始输注15分钟后，患者出现寒战、体温39℃，血压80 / 40mmHg。此时应首先考虑的输血不良反应是（ ）。

- A) 输血相关移植物抗宿主病
- B) 非溶血性发热性输血反应
- C) 细菌污染反应
- D) 循环超负荷
- E) 过敏反应

42. [单选题] 突发性公共卫生事件不包括

- A) 严重的暴乱造成群众的伤亡事件
- B) 严重影响公众健康的事件
- C) 重大传染病疫情
- D) 群体性不明原因疾病
- E) 重大食物或职业中毒

43. [单选题] 男性，28岁，近1个月因劳累出现乏力、盗汗、纳差，无咳嗽、发热等。今天突然大咯血来急诊就诊。禁忌进行的检查是

- A) 心电图
- B) 支气管碘油造影
- C) 胸部平片
- D) 胸部CT
- E) 外周血象

44. [单选题] 每日咳1000ml以上的浆液泡沫样痰时，应考虑存在

- A) 慢性支气管炎
- B) 急性肺水肿
- C) 急性呼吸道感染
- D) 肺纤维化
- E) 弥漫性肺泡癌

45. [单选题] 血栓闭塞性脉管炎的治疗

- A) 高位结扎及剥脱术
- B) 旁路转流术
- C) 切开取栓术
- D) 全皮下切除植皮术

E) 大网膜移植术

46. [单选题] 小儿易患气管异物的原因是

- A) 耳咽管较宽，短而呈水平
- B) 右支气管粗、短
- C) 婴儿胸廓呈桶状
- D) 肺含血量多，含气量少，易感染
- E) 以上均是

47. [单选题] 行为主义的诞生是在

- A) 1912年
- B) 1914年
- C) 1910年
- D) 1913年
- E) 1911年

48. [单选题] 法洛四联症的常见并发症为

- A) 肺炎
- B) 心力衰竭
- C) 脑栓塞
- D) 脑血栓
- E) 急性肺水肿

49. [单选题] 闭经患者用孕激素治疗后出现撤药性阴道流血，表示（ ）。

- A) 子宫内膜呈萎缩型
- B) 子宫内膜有结核病灶
- C) 体内缺乏雌激素
- D) 子宫内膜对雌激素不起反应
- E) 子宫内膜已受雌激素影响

50. [单选题] 肺癌最常见的转移部位是

- A) 胃
- B) 肾
- C) 脾
- D) 脑
- E) 肠

51. [单选题] 在下列医德情感的描述中，错误的是

- A) 医德情感包括同情感、责任感和事业感
- B) 同情感是医务人员最起码的道德情感
- C) 责任感生理成分较多，具有冲动性
- D) 事业感是责任感的升华，是高层次的道德情感
- E) 医德情感是建立在医学科学基础上的急病人所急、痛病人所痛

52. [单选题] 疱疹性咽峡炎的特征性临床表现是（ ）。

- A) 高热惊厥
- B) 咽喉痛
- C) 呕吐
- D) 四肢痛
- E) 颈腹痛

53. [单选题] 男性，30岁，转移性右下腹痛10小时，并恶心，呕吐，吐物为胃内容物，量少并发热，体温约38.2° C，脉搏98次/分，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张，血WBC为 $1.2 \times 10^{10}/L$ ，中性90%，尿常规WBC 8~10/HP，红细胞2~3/HP。该患者手术后最常出现的并发症为
- A) 肠粘连梗阻
 - B) 肠痿
 - C) 腹腔残余脓肿
 - D) 腹腔出血
 - E) 切口感染
54. [单选题] 在队列研究中，估计某因素与某疾病关联强度的指标是
- A) 总人群中该病的发病率
 - B) 暴露人群中该病的发病率
 - C) 总人群中可疑危险因素的暴露率
 - D) OR
 - E) RR
55. [单选题] 某地调查20岁男大学生100名，身高标准差为4.09cm，体重标准差为4.10kg，比较两者变异程度
- A) 由于两者变异程度差别很小，不能确定何者更大
 - B) 由于单位不同，两者标准差不能直接比较
 - C) 身高变异程度大
 - D) 两者变异程度相同
 - E) 体重变异程度大
56. [单选题] 稳定型心绞痛一般治疗的描述中错误的是
- A) 健康饮食
 - B) 做大量的运动
 - C) 控制体重
 - D) 保持心情舒畅
 - E) 戒烟
57. [单选题] 内源性凝血途径的始动因子是
- A) 因子VII
 - B) 因子II
 - C) 因子X
 - D) 因子III
 - E) 因子XII
58. [单选题] 女孩，15岁。左小腿近端持续性疼痛3个月，夜间加重。查体左小腿近端局部肿胀、皮温增高。X线片示左胫骨上段日光射线样改变。最可能的诊断是（ ）。
- A) 骨结核
 - B) 骨囊肿
 - C) 骨髓炎
 - D) 骨肉瘤
 - E) 骨软骨瘤
59. [单选题] II型呼吸衰竭根据以下何种分类
- A) 病理生理
 - B) 病因
 - C) 起病缓急
 - D) 按血气分析结果
 - E) 是否代偿

60. [单选题]下列对阈值的叙述，错误的是

- A) 组织兴奋性与阈值成反比关系
- B) 阈值即阈电位
- C) 是指能引起组织产生动作电位的最小刺激强度
- D) 是判断组织兴奋性高低的指标之一
- E) 是指能引起组织兴奋的最小刺激强度

61. [单选题]慢性阻塞性肺疾病的主要特征是

- A) 气流阻塞
- B) 胸片示肺野透亮度增加
- C) 桶状胸
- D) 大气道阻塞
- E) 双肺哮鸣音

62. [单选题]下列哪项不是胎盘剥离征象

- A) 子宫底升高且硬
- B) 阴道少量出血
- C) 外露脐带延长
- D) 压耻骨联合上方，脐带不回缩
- E) 宫底升高且软

63. [单选题]45岁女性，放置带尾丝的宫内避孕器10年，平时月经规律，近半年月经量增多，最近两周白带特别多，灰白色稀水样，伴有异臭味就诊，外阴无瘙痒。最可能的诊断是

- A) 子宫内膜炎
- B) 急性宫颈炎
- C) 沙眼衣原体感染
- D) 细菌性阴道病
- E) 淋球菌感染

64. [单选题]卵巢表面的组织为

- A) 卵巢白膜
- B) 卵巢皮质
- C) 结缔组织
- D) 生发上皮
- E) 腹膜

65. [单选题]hCG妊娠期间分泌量达高峰的时期是（ ）。

- A) 妊娠4~6周
- B) 妊娠8~10周
- C) 妊娠12~14周
- D) 妊娠16~18周
- E) 妊娠20~24周

66. [单选题]男，22岁。1个月来出现全身水肿，乏力。查体：血压110 / 75mmHg，尿蛋白(+++)，定量4.0g / 24h，血浆白蛋白28g / L，血脂升高。考虑最可能的临床诊断是

- A) 急性肾小球肾炎
- B) 肾病综合征
- C) 慢性肾小球肾炎
- D) 遗传性肾炎
- E) 功能性蛋白尿

67. [单选题]心脏收缩力增强时，静脉回心血量增加的主要原因是

- A) 收缩期房内压增高
- B) 舒张期室内压低
- C) 动脉血压升高
- D) 收缩期室内压高
- E) 静脉压增高

68. [单选题]可引起急性出血性结膜炎的病毒是

- A) 轮状病毒
- B) 新肠道病毒70型
- C) 脊髓灰质炎病毒
- D) 柯萨奇病毒
- E) 埃可病毒

69. [单选题]下列哪项不是引起炎性渗出的因素

- A) 毛细血管内流体静压升高
- B) 血浆胶体渗透压升高
- C) 组织胶体渗透压升高
- D) 血浆胶体渗透压降低
- E) 毛细血管壁通透性升高

70. [单选题]脑梗死

- A) 梗死灶锥体形
- B) 梗死灶节段状
- C) 梗死灶发生液化
- D) 梗死灶发生出血
- E) 梗死灶地图形

71. [单选题]用碘而康刷手时，下列哪项是正确的

- A) 肥皂水擦洗5分钟，清水冲洗
- B) 用无菌纱布擦干后，穿手术衣和戴手套
- C) 用浸透0.5%碘而康的纱布擦手和前臂一遍
- D) 肥皂水擦洗双手至肘上5cm
- E) 清水冲净后，无需擦干

72. [单选题]新生儿溶血病中，最常见的是

- A) RhD溶血病
- B) RhE溶血病
- C) 其他Rh溶血病
- D) ABO溶血病
- E) G-6-PD缺乏症

73. [单选题]胎头衔接是指

- A) 枕骨进入骨盆入口平面，胎头最低点到达坐骨棘水平
- B) 枕颈径进入骨盆入口平面，胎头最低点接近坐骨棘水平
- C) 双顶径进入骨盆入口平面，胎头最低点接近或达到坐骨棘水平
- D) 双顶径到达坐骨棘平面
- E) 双顶径到达坐骨结节平面

74. [单选题]患者女，60岁，慢性乙型病毒性肝炎15年，近来腹胀来诊。检查超声提示肝硬化、脾大。患者脾大的原因

是

- A) 肝静脉压力升高
- B) 肝动脉压力升高
- C) 门静脉压力升高
- D) 腹壁静脉曲张
- E) 淋巴回流障碍

75. [单选题]能扩张小动脉，小静脉，作用强大而短暂，可用于治疗慢性心功不全急性发作的扩血管药是

- A) 硝酸甘油
- B) 肼屈嗪
- C) 硝普钠
- D) 硝苯地平
- E) 哌唑嗪

76. [单选题]48岁妇女，G5P3，10年前输卵管结扎术，已绝经2年，阴道血性分泌物增多有臭味，并偶有性交后出血半年。为明确诊断，下列辅助检查方法哪项最可靠

- A) 宫颈脱落细胞检查
- B) 阴道分泌物细菌培养
- C) 阴道镜检查及活检
- D) B超检查子宫附件
- E) 分段诊刮病理检查

77. [单选题]初产妇，规律宫缩5小时，宫口开3cm，行人工破膜后9小时宫口9cm

- A) 活跃期延长
- B) 活跃期停滞
- C) 胎头下降延缓
- D) 第二产程停滞
- E) 第二产程延长

78. [单选题]一婴儿发热、咳嗽、气喘，胸透见双肺下叶散在边界不清的点状阴影，最可能是患

- A) 干酪性肺炎
- B) 大叶性肺炎
- C) 肺转移瘤
- D) 间质性肺炎
- E) 小叶性肺炎

79. [单选题]女性，33岁。间断腹痛、排黏液脓血便半年，加重1周。为明确诊断，最重要的检查是（ ）。

- A) 结肠镜
- B) 腹部X线片
- C) 腹部B超
- D) 腹部血管造影
- E) 腹部CT

80. [单选题]男，63岁。突发腹痛，停止排气排便1天，既往曾因十二指肠溃疡行胃大部切除术。查体：T 37.8℃，P 100次/分，BP 100 / 80mmHg，全腹压痛，反跳痛（+），立即做腹部X线平片检查见多发气液平面。诊断性腹腔穿刺抽出血性液体，该患者下一步首选的处理是（ ）。

- A) 立即肛管排气
- B) 快速补液、扩容
- C) 立即手术探查
- D) 全消化道X线钡剂造影
- E) 严密观察病情12小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756020043204010134>