

2023 年院内儿科专科护士试题及答案

一. 单选题

1. 21 世纪护理人员的主要任务中，正确的是

- A. 护理人员成为初级卫生保健的主要力量
- B. 护士是提供健康教育的主要指导者
- C. 护士成为医生和其他卫生保健人员平等的合作者
- D. 以上都是
- E. 以上均不对

2 . 领导者是指明方向的人，也是 和承担领导责任的人。

- A. 行使领导权力
- B. 制定管理目标
- C. 实施权力影响力
- D. 履行领导职责
- E. 以上都是

3 . 书写护理个案时资料收集要

- A. 有逻辑
- B. 要准确
- C. 有特色
- D. 有循证
- E. 以上都是

4 . 护理个案书写的研究思路包括

- A. 提出问题
- B. 问题论证
- C. 解决问题

D.评价效果

E.以上都是

5. 世界上第一所护士学校创办于哪一年 ()

A. 1860 年

B. 1870 年

C. 1836 年

D.1875 年

E.1876 年

6 . 国家卫健委护理质控中心建立儿科护理敏感质量指标中, 属于新增加的儿科指标是 ()

A.非计划拔管

B.院内压力性损伤现患率

C.住院患儿 24 小时平均护理时数

D.新生儿尿布皮炎发生率, (票)

E.跌倒

7 . 年龄较小婴幼儿压力性损伤的好发部位?

A.枕部 (山确答案)

8 . 舐尾部

C.肩胛部

D.脚外踝

E.以上都是

8 .对肺炎链球菌引起的脑膜炎或其他细菌性脑膜炎的所有儿童（），初始经验治疗应使用○

A.万古霉素联合头孢曲松（

B.青霉素

C.红霉素

D.氟康1/8

E.以上都是

9 .下述情况不是抗菌药物应用指征的是○

A.支原体感染

B.螺旋体感染

C.病毒性感染

D.真菌感染

E.以上都是

10 .下列药物可引起“双硫仑样反应”的是○

A.头孢哌酮

B.万古霉素

C.阿奇霉素

D.阿莫西林

E.以上都是

11.0-

6岁儿童健康管理包括新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、○○

A.高危儿管理

B.营养性疾病管理

C.健康问题处理

D.健康教育

E.以上都是

12. 辅食添加的原则是每次只添加一种新食物，由少到多、（）、由细到粗，循序渐进。

A.由稀到稠

B.由颗粒状到固体状

C.由软到硬

D.由粮谷类到瘦肉类

E.以上都是

13. 儿童神经心理发育的生理基础是

A.营养的充足；

B.神经系统的生长发育；

C.体格的生长；

D.运动

E.以上都是

14. 新生儿发生抽搐，最优选的检查方法是

A.头颅摄片

B.头颅增强 CT

C.头颅超声

D.头颅 MRI.

E.以上都是

15 . 急腹症除外消化道穿孔首选的检测方法

- A.腹部超声
- B.腹部 CT
- C.腹部 DR
- D.ROCMRI
- E.以上都是

16 . 心电图上 U 波明显增高临床上见于 Oo

- A.高血钾
- B.高血钙
- C.低血钙
- D.低血钾
- E.以上都是

17 . 关于采血部位，下列哪一条叙述是错误的？ O

- A.在输液的同侧采血，可引起血液浓缩； 「
- B.在原有输液针头采血，可引起血液稀释；
- C.再细血管上采血，容易发生凝血；
- D.在血肿上采血，容易引起溶血；
- E.以上都是

18.WHO 三阶梯治疗癌痛的原则，下列说法不正确的是 O

- A.按阶梯给药
- B.痛时给药
- C.按时给药
- D.个体化给药
- E.以上都是

19 .手足口病的适宜饮食是 ○

- A.流质，半流质饮食
- B.普通饮食
- C.低盐低脂
- D.不洁饮食
- E.坚硬饮食

20 .营养治疗的五阶梯中，最基础的是 ○

- A.饮食+营养教育
- B.饮食+口服营养补充
- C.EN
- D.EN÷PN
- ETPN

21.忽视住院患儿的营养问题，会导致以下哪种情况发生？ ○

- A.免疫功能下降
- B.手术伤口愈合延迟
- C.住院天数、费用增加
- D.对患儿的生长发育尤其是神经系统发育构成远期不良影响
- E.以上都是

22. 下列哪项不是渗出与外渗的相关因素 ○

- A.PIVC 留置时间大于 2 小时； C
- B.同一部位多次穿刺
- C. 留置在静脉内的导管长度小于 2/3
- D.通过 P1.VC 输注造影剂；
- E.以上都是

23 .新生儿 P1.CC 置入过深可引起 ()

- A.心包积液
- B.胸腔积液
- C.静脉炎
- D.血栓
- E.以上都是

24 .手卫生的指征是 O

- A.接触患者前
- B.清洁/无菌操作前
- C.接触患者后
- D.接触患者血液、体液后
- E.以上都对(正确答案)

25 .医院感染暴发是指: O

- A.指在医疗机构或其科室的患者中, 短时间内发生 3 例以上同种同源感染病例的现象。
(正确答案)
- B.指在医疗机构或其科室的患者中, 短时间内出现 3 例以上临床症候群相识、怀疑有共同感染源的感染病例
- C.3 例以上怀疑有共同感染源或感染途径的感染病例现象。
指在医疗机构或其科室的患者中, 短时间内发生 2 例以上同种同源感染病例的现象
- 以上都是

26.镜下血尿是指尿液外观颜色正常, 显微镜检示 RBC>/HPF

- A.3 个
- B.10 个
- C.30 个
- D.100 个
- E.130 个

27. 股静脉置管者下肢弯曲最好不要超过（）度

A.30

B.90

C.0.45

D.60

E.65

28 .动静脉内瘘的禁忌症中预期患者生命短于○个月

A.3

B.5

C.6

D.4

E.7

29 .肌力分为 0~5 级，以下属于 2 级肌力的是。○

A.无肌纤维活动，完全瘫痪

B.有肌肉活动，无关节运动，无肢体移动

C.可以抵抗重力，但不能抵抗阻力。

D.有关节运动，但不能抵抗重力，可平移，不能离开床面

E.以上都是

30 .以下属于病理反射的是○

A.克氏征

B.布氏征

C.霍夫曼征

D.跖反射

E.以上都是

31.1 岁婴儿头围 O

A.44cm

B.45cm

C.46cm

D.47cm

E 以上都对

32. 婴儿痉挛症药物治疗首选 O

A.强的松、

B.地西洋、

C 促肾上腺皮质激素、

D.维生素 VB6

E.以上都是

33 .生酮饮食是由()、低碳水化合物和适当蛋白质构成的一种食物组合

A 高脂肪<<)

B.维生素

C.低糖

D.高纤维素

E.以上都是

34 .动脉导管未闭在新生儿期常常仅听到收缩期杂音是由于 O

A.主、肺动脉压力差在收缩期不显著

B.主、肺动脉压力差在舒张期不显著一)

C.主、肺动脉间压无力差

D.肺动脉与肺静脉之间压力差不显著

E.二尖瓣相对关闭不全

35 .皮肤黏膜淋巴结综合征患儿急性期的护理措施不妥的是 ○

A.注意休息，适当活动

B.观察病情

C.给予清淡的高热量、高维生素、高蛋白质的流质或半流质饮食

D.促进皮肤恢复正常功能

E.注意观察药物的疗效和不良反应

36 .川崎病的皮肤护理措施正确的是 ○

A.每天用刷子擦洗皮肤

B.衣被质地无严格要求

C.评估皮肤病损情况

D.对半脱的痂皮不必处理

E.有痛痒时，可用手轻微挠

37 .下列哪项不是川崎病的主要症状 ○

A.持续发热 1~2 周

B.两眼球结膜充血

C.急性期四肢末端呈实性肿胀

D.口腔黏膜弥漫性发红

E.尿糖增高

38. 皮肤黏膜淋巴结综合征患儿，为降低冠状动脉病变的发生率，可早期使用（）

A.丙种球蛋白（

B.阿司匹林

C.双嘧达莫

- D.糖皮质激素
- E.环磷酰胺
- 39.护理川崎病患儿时，不妥的是○
- A.监测体温，观察热型
- B.勤剪指甲，防止抓伤
- C.对半脱的痂皮应及时撕脱
- D.口唇干裂时可涂护唇油
- E.给予高热量、高维生素、高蛋白的流质或半流质饮食
- 40.咳嗽变异性哮喘正确诊断的依据是○
- A.咳嗽反复发作时间>2周
- B.抗生素治疗有效
- C.支气管扩张剂能缓解（卜响处父）
- D.无家族过敏史
- E.中性粒细胞增高
- 41 .护士鼓励患者记哮喘日记，其监测内容不包括○
- A.吸氧时间及次数
- B.症状发作程度
- C.所应用的药物
- D.每日症状发作次数
- E.上次住院时间（
- 42 .消除支气管哮喘气道炎症最有效的药物是○
- A.糖皮质激素 I
- B.抗生素
- C.抗组织胺药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756235005031010045>