

2023 年江西省普通高校专科升本科大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、幽门梗阻的患者，因长期呕吐常易发生的异常变化是【】

- (A) 高钾高氯性酸中毒
- (B) 低钾高氯性碱中毒
- (C) 高钾高氯性碱中毒
- (D) 高钾低氯性碱中毒
- (E) 低钾低氯性碱中毒

2、不含消化酶的消化液是()

- (A) 胰液
- (B) 胃液
- (C) 胆汁
- (D) 肠液

3、男，60岁。餐后突感上腹痛、大汗1小时。查体：腹肌紧张，压痛、反跳痛(+)，肝浊音界消失。此时应首选的检查是()

- (A) 立位腹平片
- (B) 血、尿淀粉酶
- (C) 腹部B超
- (D) 心电图

4、某心悸患者查体所见：脉率89次/分，心率113次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是()

- (A) 房性期前收缩
- (B) 室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

5、出现血容量不足的症状时，提示在短时期内体液丧失至少达体重的百分数是【】

(A) 5%

(B) 3%

(C) 10%

(D) 15%

(E) 20%

6、迅速失血可导致休克，出血量至少超过全身总血量的比例是()

(A)20%

(B)30%

(C)40%

(D)50%

7、下列属于躯干骨的是【】

(A) 锁骨

(B) 胸骨

(C) 肩胛骨

(D) 舌骨

(E) 髌骨

8、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（）

(A)5-羟色胺

(B)肾上腺素

(C)P 物质

(D)乙酰胆碱

(E)去甲肾上腺素

9、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是 ( )

(A)上腹部压痛阳性

(B)柏油便

(C)呕吐咖啡样物质

(D)听诊肠鸣音活跃

(E)可出现头晕、心悸

10、提高心肌传导性的因素是 ( )

(A)静息电位减小

(B)钠电流被阻断

(C)钠通道数量减少

(D)动作电位除极化速度增大

(E)阈电位水平抬高

11、有关测量血压的叙述，正确的选项是【】

(A)听诊器胸件置于袖袋下

(B)血压计置于肘关节水平

(C)袖袋充气至日常血压水平放气

(D)取两次测得血压的高值

(E)检查前需休息 5 分钟以上

12、下列监测值中不正确的是 ( )

(A)CVP 的正常值为 5~12cmH<sub>2</sub>O

- (B)心排血量的正常值为 4~6L/min
- (C)PCWP 的正常值为 6~15cmH<sub>2</sub>O
- (D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L
- (E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

13、不属于中耳的结构是 ( )

- (A)前庭
- (B)乳突小房
- (C)鼓室
- (D)乳突窦
- (E)咽鼓管

14、右锁骨中线与右肋弓交点稍下方的是 【】

- (A) 胆囊管的体表投影
- (B) 胆囊颈的体表投影
- (C) 胆囊底的体表投影
- (D) 胆囊体的体表投影
- (E) 幽门的体表投影

15、污染伤口是指 ( )

- (A)有细菌存在，但尚未发生感染的伤口
- (B)有细菌存在，并已发生感染的伤口
- (C)局部红肿并有分泌物的伤口
- (D)腹股沟疝手术切口
- (E)已化脓的伤口

16、舌的味觉障碍可能受损的神经是 【】

- (A) 面神经
- (B) 三叉神经
- (C) 迷走神经
- (D) 舌下神经
- (E) 副神经

17、调节产热活动最重要的体液因素是()

- (A) 甲状腺激素
- (B) 甲状旁腺激素
- (C) 胰岛素
- (D) 生长激素

18、呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是 ( )

- (A) 呼气末
- (B) 呼气中期
- (C) 吸气初
- (D) 吸气中期
- (E) 吸气末

19、某胸痛患者的心电图示：II、III、aVF 导联 ST 段抬高，T 波倒置，病理 Q 波形成。

最可能的诊断是 ( )

- (A) 肥厚型梗阻性心肌病
- (B) 急性心包炎
- (C) 急性心肌梗死
- (D) 变异型心绞痛
- (E) 急性肺栓塞

20、根据烧伤早期补液的原则，第一个 8 小时内，应该输入第一天总液体量的【】

(A) 1 / 6

(B) 1 / 3

(C) 1 / 4

(D) 1 / 5

(E) 1 / 2

21、舌前 2/3 味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是（）

(A)动眼神经

(B)面神经

(C)三叉神经

(D)上颌神经

(E)舌下神经

22、男，50 岁。间断反酸，规律性剑突下疼痛 2 年，排柏油样便 2 天。最可能的诊断是

【】

(A) 急性糜烂出血性胃炎

(B) 胃癌伴消化道出血

(C) 消化性溃疡并出血

(D) 贲门黏膜撕裂综合征

(E) 食管静脉曲张破裂出血

23、男，45 岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延 3 小时就诊。查体：T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是（）

(A)急性胃穿孔

(B)急性胃肠炎

(C)急性肠梗阻

(D)急性胰腺炎

(E)急性胆管炎

24、男，70岁。有慢性支气管炎病史30年。受凉后突发气促、烦躁3天。查体：口唇发绀，呼吸36次/分，脉率100次/分，双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是()

(A)心电图

(B)血常规

(C)血气分析

(D)肺功能

25、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

(A)尿素

(B)氨基酸

(C)大分子蛋白质

(D)葡萄糖

(E)电解质

26、不受动眼神经支配的眼肌是（）

(A)下直肌

(B)上睑提肌

(C)上直肌

(D)内直肌

(E)外直肌

27、有关输尿管的正确描述是（）

(A)属于腹膜间位器官

(B)属于腹膜内位器官

(C)开口于膀胱尖

(D)第二狭窄位于跨过髂血管处

(E)可分为腹段和盆段两部分

28、引起肝浊音界消失最常见的原因是【】

(A) 胃肠穿孔

(B) 肺气肿

(C) 间位结肠

(D) 肠梗阻

(E) 内脏转位

29、通常情况下，术后胃肠减压拔管的指征是（）

(A)肛门排气后

(B)无肠鸣音

(C)肠鸣音存在

(D)术后3天

(E)患者要求拔除

30、激素经血液循环被运行后作用于靶细胞的作用方式是（）

(A)远距分泌

(B)内在分泌

(C)自分泌

(D)旁分泌

(E)神经分泌

31、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

- (A)球蛋白
- (B)纤维蛋白原
- (C)清蛋白
- (D)透明质酸
- (E)电解质

32、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

- (A)结核性腹膜炎
- (B)化脓性腹膜炎
- (C)肝硬化腹水
- (D)恶性腹水
- (E)自发性细菌性腹膜炎

33、肺气肿患者可能出现的体征是（）

- (A)双侧肋间隙变窄
- (B)肝上界下移
- (C)心界向两侧扩大
- (D)双肺语音震颤增强
- (E)肺部叩诊呈鼓音

34、胸外心脏按压时，正确的按压部位是（）

- (A)胸骨中、上1/3交界处
- (B)胸骨左缘第3肋间
- (C)胸骨左缘第4肋间
- (D)左锁骨中线第4肋间

(E)胸骨中、下 1/3 交界处

35、下列描述中属于症状的是()

(A)脾大

(B)心脏杂音

(C)肺部啰音

(D)心悸

36、第 2 掌骨间隙背面(虎口区)的皮肤出现感觉障碍可能损伤的神经是()

(A)肌皮神

(B)桡神经

(C)尺神经

(D)正中神经

37、冠状动脉的起始部位是()

(A)左心室

(B)主动脉弓

(C)胸主动脉

(D)升主动脉

38、正常时激活膀胱壁牵张感受器的膀胱内尿量最小范围是 ( )

(A)200~300mL

(B)800~900mL

(C)600~700mL

(D)400~500mL

(E)1000~1100mL

39、三尖瓣所在的位置是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757006165150006055>