


儿童常见腹泻的概述

腹泻是儿童常见的一种消化系统疾病, 可因细菌、病毒、寄生虫或食物中毒等多种原因引起。儿童腹泻表现会因病因不同而有所不同, 症状可从轻微腹痛到严重脱水不等。及时发现、正确诊断并制定适当的治疗措施对儿童健康至关重要。

侃a by 侃侃



腹泻的主要原因

细菌感染

常见的细菌性腹泻包括沙门氏菌、志贺菌和耶尔森菌等引起的肠胃炎。这些细菌会破坏肠道黏膜,导致水分和电解质流失。

寄生虫感染

如肠道寄生虫如阿米巴、克ryptosporidium和蟑螂等可引起慢性腹泻。这类腹泻常会持续数周甚至数月。

病毒感染

诸如轮状病毒、诺如病毒等常见肠道病毒会感染肠黏膜细胞,引起急性腹泻。症状包括腹痛、呕吐和腹泻。

食物中毒

食用受污染的食物或水可能导致细菌毒素中毒,引起急性肠胃炎并造成腹泻。

细菌性腹泻



病原细菌

常见的细菌性腹泻病原包括沙门氏菌、志贺菌和耶尔森菌等。这些细菌通过破坏肠道黏膜,引起水分和电解质的大量流失。



临床表现

细菌性腹泻多表现为急性发作的腹痛、水样腹泻、恶心呕吐等症状。严重时可出现脱水、电解质紊乱等并发症。



诊断检查

需通过细菌培养等实验室检查明确病原菌种。同时还可进行粪便常规、粪便潜血等辅助检查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757036060056006112>